

@
Q49
K2
U. 14-16



New York
State College of Agriculture
At Cornell University
Ithaca, N. Y.

Library



VERHANDLUNGEN
DES
NATURWISSENSCHAFTLICHEN
VEREINS
IN
KARLSRUHE.

FÜNFZEHNTER BAND.

1901—1902.

KARLSRUHE.
DRUCK DER G. BRAUN'SCHEN HOFBUCHDRUCKEREI.

1902.

Printed in Germany

INHALT.

Jahresbericht.

	Seite
Besuch und Uebersicht der Sitzungen	VII
Ehrungen	VII
Rechnungsführung	VIII
Büchersammlung und Tauschverkehr	VIII
Vorstand	XVI
Bewegung unter den Mitgliedern	XVI
Mitglieder-Verzeichniss	XVII

Sitzungsberichte.

564. Sitzung am 24. Mai 1901.	
<i>Brauer</i> : Die Einrichtungen des mechanischen Laboratoriums der Technischen Hochschule	1*
565. Sitzung am 7. Juni 1901.	
<i>Nüsslin</i> : Ueber Geweihe	1*
566. Sitzung am 28. Juni 1901.	
<i>Futterer</i> : Die Verhandlungen der internationalen seismologischen Conferenz in Strassburg am 11.—13. April 1901	3*
567. Sitzung am 13. Juli 1901.	
<i>Rupp</i> : Ueber Wein und das neue Weingesetz	4*
568. Sitzung am 25. Oktober 1901.	
<i>Vorsitzender</i> : Glückwunsch an die Naturhistorische Gesellschaft in Nürnberg, die Société Nationale des Sciences Naturelles et <i>Mathématiques</i> in Cherbourg und an Prof. Hittorf in Münster. Mittheilung über die Neuauftellung der Büchersammlung	6*
<i>Engler</i> : Autoxydation und Selbstentzündung	6*

IV

569. Sitzung am 8. November 1901.

Vorsitzender: Mittheilung über eine Stiftung an den Verein. . .

May: Erasmus Darwin

570. Sitzung am 22. November 1901.

Lehmann: Elektrische Entladungen, Elektronen, Kathoden- und Kanalstrahlen

571. Sitzung am 6. Dezember 1901.

Schultheiss: Neues über das Hagelschiessen

Reichmann: Die Erdbeben in Baden im Jahre 1901

572. Sitzung am 20. Dezember 1901.

Wilser: Rasse und Gesundheit

573. Sitzung am 10. Januar 1902.

Heinroth: Land und Leute im Bismarckarchipel

574. Sitzung am 17. Januar 1902.

Haber: Der textile Flachdruck

575. Sitzung am 7. Februar 1902.

Leutz: Ueber Erdbeben-Messapparate

576. Sitzung am 21. Februar 1902.

Kronstein: Natürliche und künstliche Harze

577. Sitzung am 7. März 1902.

Braun: Ueber sein System der drahtlosen Telegraphie

578. Sitzung am 14. März 1902.

Mie: Ueber die Elektrolyse der Luft

579. Sitzung am 2. Mai 1902.

Vorsitzender: Mittheilung über die Festschrift aus Anlass des 50-jährigen Regierungsjubiläums Sr. Königl. Hoheit des Grossherzogs

Muth: Das Problem der Befruchtung

580. Sitzung am 16. Mai 1902.

Mitglieder-Hauptversammlung.

Vorsitzender: Dankschreiben Sr. Königl. Hoheit des Grossherzogs; Uebereichung des Diploms als Ehrenmitglied an den bisherigen Schriftführer Hofrath Meidinger

Schriftführer: Jahresbericht; Neuwahl eines Schriftführers

Futterer: Die jüngsten Vorgänge auf den kleinen Antillen und ihre allgemeine Bedeutung

Rehbock: Das Vorkommen von Guttapercha in den deutschen Kolonien

Abhandlungen.

	Seite
auer: Franz Grashof (mit dessen Bildniss)	1
Weiermacher: Heinrich Hertz , biographische Skizze mit dessen Bildniss und 2 Lichtdrucktafeln	19
hmann: Der dunkle Kathodenraum (mit 7 Abbildungen im Texte) .	33
igler: Das Petroleum des Rheinthaies (mit 1 Lichtdrucktafel und 2 Abbildungen im Texte)	89
sy: Erasmus Darwin	117
ttler: Bericht über die Verhandlungen der ersten internationalen seismologischen Konferenz in Strassburg am 11.—13. April 1901	139
üer, L.: Rasse und Gesundheit	153
Diskussion über letzteren Vortrag	171

Jahresbericht.

Im Berichtsjahr haben 17 Sitzungen, die im Mittel von 53 Personen besucht waren, stattgefunden. Als Versammlungslokal hat in der kälteren Jahreszeit, wie bisher, der „kleine Saal“ im Gebäude der Gesellschaft Museum, in der wärmeren der Wirthschaftssaal des Gartengebäudes gedient. Drei Vorträge sind in Hörsälen der Technischen Hochschule, je einer in der Aula, sowie im grossen Saal des Museums abgehalten worden. Von den 18 gehaltenen Vorträgen entfallen je vier auf Chemie und Geologie, drei auf Physik, je zwei auf Anthropologie und Zoologie, je einer auf Mechanik, Geschichte und Meteorologie.

Ehrungen. Der Verein hat der Naturhistorischen Gesellschaft in Nürnberg zur Feier ihres 100jährigen Bestehens und der Société Nationale des Sciences Naturelles et Mathématiques in Cherbourg zu ihrem 50jährigen Stiftungsfest seine Glückwünsche zum Ausdruck gebracht (568. Sitzung). Herrn Prof. Hittorf in Münster, der am 12. Januar 1902 sein 50jähriges Professoren-Jubiläum feierte, ist eine Glückwunschadresse zugesandt worden (568. Sitzung). Sr. Königlichen Hoheit dem Grossherzog, der am 26. April 1902 sein 50jähriges Regierungsjubiläum feierte, widmete der Verein eine Festschrift; ihr Inhalt hat aus den im Nachstehenden zum Abdruck gebrachten Abhandlungen der Herren Brauer, Schleiermacher, Lehmann, Engler und May bestanden. Dem bisherigen Schriftführer, Herrn Hofrath Dr. Meidinger, ist aus Anlass seines Rücktrittes von diesem Amte, das er volle 33 Jahre geführt hat, das Diplom als Ehrenmitglied überreicht worden (580. Sitzung).

VIII

Rechnungsführung.**A. Kassenstand im Berichtsjahre 1901—1902.****Einnahmen.**

1. Kassenrest von 1900/01 . . .	M.	37,54	
2. Beiträge von 188 Mitgliedern zu je 5 M.	"	940,00	
3. Zinsen aus Werthpapieren . . .	"	1 128,50	
4. Stiftung (s. 563. Sitzung) . . .	"	16 000,00	
5. Verkauf von Drucksachen . . .	"	22,50	
			M. 18 128,54

Ausgaben.

1. Rückzahlung der Schuld an die Badische Bank	M.	447,70	
2. Dienerschaft, Abschriften, Porto .	"	457,86	
3. Steuern	"	26,76	
4. Lokalmiethe	"	66,00	
5. Drucksachen	"	1 248,14	
6. Conto-Corrent-Zinsen	"	3,56	
7. Neueinrichtung der Büchersamm- lung	"	179,20	
8. Angekaufte Papiere	"	13 122,10	
			" 15 551,32
Kassenrest am 16. Mai 1902	M.	2 577,22	

B. Vermögensstand.

Werthpapiere	M.	32 242,86	
Kassenrest	"	2 577,22	
			M. 34 820,08
Vermögensstand im Vorjahre	"	18 832,70	
somit Vermehrung	M.	15 987,38	

Die **Büchersammlung** ist im Laufe des Sommers 1901 aus der Landesgewerbehalle, wo sie in Folge von Platzmangel nicht länger verbleiben konnte, nach der Technischen Hochschule verbracht und dort in einem grossen Zimmer, das in dankenswerther Weise von der Grossh. Regierung überlassen worden ist, aufgestellt worden. Auf Ansuchen sind die meisten der dabei ent-

deckten Lücken in den Reihen der Veröffentlichungen in bereitwilligster Weise von den Behörden, Instituten und Vereinen, mit denen der Naturwissenschaftliche Verein in Tauschverkehr steht, ausgefüllt worden. Es sei auch an dieser Stelle nochmals der verbindlichste Dank dafür zum Ausdruck gebracht.

Während des Berichtsjahres 1901/1902 sind dem Verein die nachstehenden Druckschriften zugegangen:

A. Von Behörden, Instituten und Vereinen.

- Bamberg.** Naturforschende Gesellschaft. 18. Bericht. Bamberg 1901.
- Basel.** Naturforschende Gesellschaft. Verhandlungen Band 13, Heft 3. Basel 1902. — Burckhard, Zur Erinnerung an Tycho Brahe, 1546—1601. Anhang zum 13. Band.
- Bautzen.** Naturwissenschaftliche Gesellschaft. Sitzungsberichte und Abhandlungen. 1898—1901. Bautzen 1902.
- Bergen's Museum.** Aarsberetning for 1901. Bergen 1902. — Aarbog 1901. 1. hefte. Bergen 1901; 1901. Bergen 1902. — Meeresfauna von Bergen, Heft I. Bergen 1901. — An account of crustacea of Norway. Vol. IV, Part. 1—6.
- Berlin.** Botanischer Verein. Verhandlungen. 28. Jahrg. 1886. Berlin 1887.
- Deutsche Geologische Gesellschaft. Zeitschrift. 52. Band, 4. Heft; 53. Band, 1.—3. Heft.
- Bern.** Naturforschende Gesellschaft. Mittheilungen aus dem Jahre 1900. Bern 1901.
- Bonn.** Naturhistorischer Verein. Verhandlungen. 57. Jahrg. 2. Hälfte. Bonn 1900.
- Niederrheinische Gesellschaft für Natur- und Heilkunde. Sitzungsberichte 1900, 2. Hälfte. Bonn 1900.
- Boston.** American Academy of Arts and Sciences. Proceedings Vol. 36, No. 24—29; Vol. 37, No. 1—5.
- Braunschweig.** Verein für Naturwissenschaften. 12. Jahresbericht für die Vereinsjahre 1899/1900 und 1900/1901. Braunschweig 1902.
- Bremen.** Naturwissenschaftlicher Verein. Verhandlungen. 17. Band, 1. Heft. Bremen 1901. — Beiträge zur nordwestdeutschen Volks- und Landeskunde. 3. Hefte. Bremen 1901.

- Brünn.** Naturforschender Verein. Verhandlungen 39. Band. Brünn 1901. — 19. Bericht der meteorologischen Kommission. Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen im Jahre 1899. Brünn 1901.
- Brüssel.** Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-arts. Bulletin de la classe des sciences 1899. Bruxelles 1899; 1900. Bruxelles 1900. — Annuaire 1887. Bruxelles 1887; 1900. Br. 1900; 1901. Br. 1901.
- Société Entomologique de Belgique. Annales et mémoires. 45. tome. Bruxelles 1901. — Mémoires. VIII. Bruxelles 1901.
- Société Malacologique. Bulletin des séances. Année 1900. Bruxelles 1901.
- Budapest.** Königl. Ungar. Naturwissenschaftliche Gesellschaft. Mathematische und naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn. 14. Band 1895—1896. Berlin u. Budapest 1898; 15. Band 1897. B. u. B. 1899; 16. Band 1898. B. u. B. 1899. — Aquila. Zeitschrift für Ornithologie. 5. Jahrg. No. 1—4; 6. Jahrg. No. 1—4.
- Chapel Hill.** Elisha Mitchell Scientific Society. Journal 1901. 17. year. Part. I.
- Cherbourg.** Société Nationale des Sciences Naturelles et Mathématiques. Mémoires. Tome 31. Paris 1898—1900.
- Christiania.** K. Universität. Den Norske Nordhavs Expedition. 1876—1878. 28. Zoologi. Mollusca III. Christiania 1901.
- Columbus, Ohio.** State University. 31. Annual. Report of the Board of Trustees for the year ending June 30, 1901. Parts I, II. Columbus 1901.
- Chur.** Naturforschende Gesellschaft Graubündens. 44. Band 1900/1901. Chur 1901.
- Colmar.** Naturhistorische Gesellschaft. Mittheilungen. 5. Band. Jahre 1899 u. 1900. Colmar 1900.
- Cordoba.** Academia Nacional de Ciencias. Boletín. Tomo 16. entrega 2a, 3a, 4a.
- Danzig.** Naturforschende Gesellschaft. Schriften. 10. Band, 2. u. 3. Heft. Danzig 1901.
- Dresden.** Naturwissenschaftliche Gesellschaft Isis. Sitzungsberichte und Abhandlungen. Jahrg. 1900, Juli bis Dez.;

- Jahrg. 1901, Jan. bis Juni; Jahrg. 1871, April bis Juni;
 Jahrg. 1872, April bis Sept.; Jahrg. 1878, Jan. bis Juli;
 Jahrg. 1883, Jan. bis Juni, Jahrg. 1889, Jan. bis Juni.
- Dresden. Flora. Gesellschaft für Botanik und Gartenbau. Sitzungs-
 berichte und Abhandlungen. 4. Jahrg. 1899—1900. Dresden
 1900; 5. Jahrg. 1900—1901. Dresden 1901.
- Dürkheim. Naturwissenschaftlicher Verein Pollichia. Mitthei-
 lungen. 58. Jahrg. 1901. No. 14/15. Dürkheim 1901.
- Elberfeld. Naturwissenschaftlicher Verein. Jahresbericht 4. Heft.
 2. autogr. Aufl. Elberfeld 1902.
- Emden. Naturforschende Gesellschaft. 58. Jahresbericht für
 1872; 59. Jahresber. für 1873; 60. Jahresber. für 1874;
 85. Jahresber. für 1899/1901. Emden 1901.
- Erlangen. Physiologisch-medicinische Societät. Sitzungsberichte.
 32. Heft. 1900. Erlangen 1901; 23. Heft. 1891; 26. Heft.
 1894.
- Frankfurt a. M. Physikalischer Verein. Jahresbericht für
 1899—1900. Frankfurt a. M. 1901; Jahresber. 1876—1877.
 Fr. a. M. 1878; Jahresber. 1877—1878. Fr. a. M. 1879.
 — Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft. Bericht 1901.
- Frankfurt a. O. Naturwissenschaftlicher Verein Helios. 18. Band.
 Berlin 1901.
- Freiburg i. B. Naturforschende Gesellschaft. Berichte über die
 Verhandlungen. 11. Band, 3. Heft. Freiburg i. B. 1901;
 12. Band. Fr. 1902.
- Giessen. Oberhess. Gesellschaft für Natur- und Heilkunde.
 30. Bericht. Giessen 1895.
- Graz. Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark. Mitthei-
 lungen. Jahrgang 1900. Graz 1901.
- Greifswald. Geographische Gesellschaft. 7. Jahresbericht 1898
 bis 1900. Greifswald 1900. -- Excursion nach Ost-Schleswig-
 Holstein und der Insel Sylt am 5.—10. Juni 1900. Greifs-
 wald 1900.
- Halle. Naturforschende Gesellschaft. Jahresbericht und Mit-
 gliederliste 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900.
 — Bericht über die Sitzungen im Jahre 1892. Halle 1892.
 — Verein für Naturkunde. Mittheilungen. 1901. Halle 1901.
 — Kais. Leop.-Karol.-Akademie der Naturforscher. Leopoldina.
 Heft 37, No. 5—11; Heft 38, No. 1 u. 2.

- Hamburg. Naturwissenschaftlicher Verein. Verhandlungen. 8. Heft. Hamburg 1901; 9. Heft. Hamburg 1902. — Abhandlungen aus dem Gebiete der Naturwissenschaften. 16. Band. 2. Hälfte. Hamburg 1901.
- Hamilton Association. Journal and Proceedings. No. 17. Hamilton 1901.
- Hannover. Naturhistorische Gesellschaft. 48. u. 49. Jahresbericht über die Geschäftsjahre 1897/98 und 1898/99. Hamburg 1900.
- Heidelberg. Grossh. Sternwarte, Astrometrische Abtheilung. Mittheilungen I. Karlsruhe 1901.
- Helsingfors. Societas pro Fauna et Flora Fennica. Meddelanden 1900—1901. Helsingfors 1901. — Acta Societatis. Vol. 20. Helsingfors 1900—1901.
- Innsbruck. Naturwissenschaftlich-medicinischer Verein. Berichte. 26. Jahrgang. 1900/01. Innsbruck 1901.
- Karlsruhe. Centralbureau für Meteorologie und Hydrographie. Jahresbericht für 1900. — Ergebnisse der Hochwasserverhältnisse im deutschen Rheingebiet. 6. Heft: Das Maingebiet. Berlin 1901.
- Königsberg. K. Physik.-Oekonomische Gesellschaft. Berichte. 42. Jahrgang. 1901. Königsberg 1901.
- Lawrence (Kansas). University. Quarterly. April 1901 (Vol. 11, No. 6). — Bulletin. Vol. 10, No. 3.
- Landshut. Botanischer Verein. 16. Bericht über die Vereinsjahre 1898—1900. Landshut 1901.
- Lausanne. Société des sciences naturelles. Bulletin. Vol. 29, No. 111. Lausanne 1893. Vol. 37, No. 140—142. Lausanne 1901.
- Leipa. Nordböhm. Excursionsclub. Mittheilungen. 24. Jahrg., 2.—4. Heft; 25. Jahrg., 1. Heft.
- Leipzig. Museum für Völkerkunde. 25., 26. Bericht, 1897, 1898; 28. Bericht, 1900.
— Jablonowsky'sche Gesellschaft. Jahresbericht 1899. Leipzig 1901.
- Lüneburg. Naturwissenschaftlicher Verein. Jahreshefte. 15. 1899—1901. Lüneburg 1901. — Zur Erinnerung an das 50jährige Bestehen des Naturw. Vereins, 1851—1901. Lüneburg 1901.

- Luxemburg. Société de Botanique: Recueil de mémoires et des travaux. No. XIV, 1897—98. Luxembourg 1899.
 — Institut de L., Section des Sciences Naturelles. Publications. Tome 26. Luxembourg 1901.
- Madison. Wisconsin Academy of Sciences, Arts and Letters. Transactions Vol. XIII, Part. I, 1900. Madison 1901.
- Magdeburg. Naturwissenschaftlicher Verein. 12. Jahresbericht 1881. Magdeburg 1882. — Jahresbericht u. Abhandlungen 1898—1900. Magdeburg 1900.
- Marseille. Faculté des Sciences. Annales. Tome XI, Fasc. 1—9.
- Mexico. Observatorio Astronómico Nacional de Tacubaya. Anuario 1902. Año 22. Mexico 1901. — Boletín No. 7.
- Milwaukee. Wisconsin Natural History Society. Bulletin. Vol. I, No. 4; Vol. II, No. 1.
- Missoula. University of Montana. Bulletin No. 3: Silloway. Summer birds of Flathead Lake 1901.
- Montevideo. Museo Nacional. Anales, Tomo III, Entrega 20, 21; Tomo IV, Entrega 19, 22.
- München. K. Akademie der Wissenschaften, Mathem.-Phys. Klasse. Sitzungsberichte 1901, Heft 2 u. 3.
 — Ornithologischer Verein. 2. Jahresbericht für 1899 und 1900. München 1901.
- Nancy. Société des Sciences. Bulletin. Tome I, Fasc. 6; Tome II, Fasc. 1, 2.
- Neuchâtel. Société des Sciences Naturelles. Bulletin. Tome 27, Année 1898—1899. Nancy 1899.
- New-York. American Museum of Natural History. Annual report for the year 1900. — Bulletin. Vol. XI, Part. IV; Vol. XIV; Vol. XV, Part. I.
- Offenbach. Verein für Naturkunde. 37.—42. Bericht. Offenbach 1901.
- Osnabrück. Naturwissenschaftlicher Verein. 14. Jahresbericht für die Jahre 1899 und 1900. Osnabrück 1901.
- Ottawa. Geological Survey of Canada. Annual Report Vol. XI, 1898. Ottawa 1900. — Catalogue of Canadian Birds. Part. I. Ottawa 1900. — General-Index to the Reports of Progress 1863 to 1884. Ottawa 1900.
- Pará. Museu Paraense de Historia Natural. Boletín Vol. III. Pará 1901.

- Philadelphia. Academy of Natural Sciences. Proceedings 1900, Part. III. Philadelphia 1901.
- Pisa. Società Toscana di Scienze Naturali. Atti Vol. XII, S. 169—266; Vol. XIII, 1—8.
- Prag. Naturhistorischer Verein Lotos. Sitzungsberichte. Jahrgang 1900. 20. Band. Prag 1900.
- K. Gesellschaft der Wissenschaften. Sitzungsberichte 1879, 1880, 1881, 1901. — Matiegka, Bericht über die Untersuchung der Gebeine Tycho Brahe's. Prag 1901. — Studnička, Prager Tychoniana. Prag 1901. — Studnička, Bericht über die astrologischen Studien des Reformators der beobachtenden Astronomie Tycho Brahe. Prag 1901. — Jahresbericht für das Jahr 1901. Prag 1902.
- Regensburg. Naturwissenschaftlicher Verein. Berichte. 2., 5., 6., 8. Heft.
- Reichenberg. Verein der Naturfreunde. Mittheilungen. 32 Jahrgang. Reichenberg 1901.
- Roma. R. Accademia dei Lincei. Atti. Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali. Vol. 10, Fasc. 9—12; Vol. 11, Fasc. 1—7. — Atti. Classe di scienze morali, storiche e filologiche. Vol. 9. — Atti. Rendiconto dell' adunanza solenne del 2. Giugno 1901. Roma 1901.
- R. Comitato Geologico. Bollettino. Anno 1901, No. 1, 2, 3.
- St. Gallen. Naturwissenschaftliche Gesellschaft. Bericht über die Thätigkeit 1888/89, 1889/90, 1890/91, 1891/92, 1892/93, 1893/94, 1897/98, 1899/1900.
- St. Louis. Academy of Sciences. Transactions Vol. 10, No. 9—11 Vol. 11, No. 1—5.
- Sion. Société Murithienne. Bulletin. Fasc. 27 et 28, Année 1898 et 1899. Sion 1900; Fasc. 1900 et 1901. Bex 1901.
- Stockholm. Entomologiska Tidskrift. Årgang 21, 1900, Hef 1—4; Årgang 22, 1901, Hef 1—4.
- Stuttgart. Verein für Naturkunde. Jahreshefte. 57. Jahrgang Stuttgart 1901.
- Württemb. Kommission für Landesgeschichte. Vierteljahrshefte für Landesgeschichte. 10. Jahrgang. 1901. Hef 1—4 Stuttgart 1901.
- Sydney. Australian Museum. Records. Vol. IV, No. 1—5. — Report of Trustees for the year 1900.

- Sydney. R. Society of New South Wales. Journal and Proceedings. Vol. 34. Sydney 1901.
- Australian Association of the Advancement of Sciences. Report of the eighth meeting 1900. Melbourne 1901.
- Tiflis. Physikalisches Observatorium. Meteorologische Beobachtungen im Jahre 1898. Tiflis 1901.
- Tokio. Zoological Society. Annotationes Zoologicae Japonenses. Vol. III, Partes II, III, IV; Vol. IV, Partes I, II.
- Ulm. Verein für Mathematik und Naturwissenschaften. Jahreshefte, 2., 3., 6., 10. Jahrgang. Ulm 1889, 1890, 1893 u. 1901.
- Washington. American Academy of Arts and Sciences. Proceedings. Vol. 36, No. 16—23. — Memoirs. Vol. VIII. Washington 1898.
- Smithsonian Institution. Annual report of the board of regents for the year 1899. Washington 1901; desgl. 1899. Wash. 1901; 1900. Wash. 1901.
- U. S. Department of Agriculture. Yearbook 1900. Washington 1901. — North American Fauna. No. 20, 21. Wash. 1901.
- Wien. Akademie der Wissenschaften. Anzeiger. Jahrgang 1901, No. 18—27; Jahrgang 1902, No. 1—9.
- Geologische Reichsanstalt. Verhandlungen. Jahrgang 1901, No. 3—18; 1902, No. 1—4. — Jahrbuch. Jahrgang 1900. 50. Band, 3. u. 4. Heft; Jahrgang 1901. 51. Band, 1 u. 2. Heft.
- Naturhistorisches Hofmuseum. Annalen. Band 15, No. 3 u. 4. Wien 1900; Band 16, No. 1 u. 2. Wien 1901.
- Wiesbaden. Verein für Naturkunde. Jahrbücher. Jahrgang 54. Wiesbaden 1901.
- Würzburg. Physikalisch-medicinische Gesellschaft. Sitzungsberichte. 1900. No. 1—5.
- Zürich. Naturhistorische Gesellschaft. Vierteljahrsschrift. 45. Jahrgang. 1900, 3. und 4. Heft. Zürich 1901; 46. Jahrgang. 1.—4. Heft. Zürich 1901. — Neujahtsblatt. 103. u. 104. Stück.
- Zwickau. Verein für Naturkunde. Jahresbericht. 1899. Zwickau 1901.

B. Von Privaten.

Arnold. Die Gleichstrommaschine. Theorie, Konstruktion, rechnung, Untersuchung und Arbeitsweise derselben. I. Ba Theorie. Berlin 1902.

Neupert, K. Mechanik des Himmels und der Moleküle. I. Bau eines Weltsystems aus dem Aether mit Beweis der richtigkeit der kopernikanischen Anschauungen, sowie Beweis der zusammengesetzten Struktur der chemischen Elemente. Bamberg.

Vorstand.

Der Vorstand hat im Berichtsjahre aus den Herren

1. Geheimerath Prof. Dr. Engler, als Vorsitzenden,
2. Hofrath Prof. Dr. Lehmann, als Stellvertreter Vorsitzenden,
3. Hofrath Prof. Dr. Meidinger, als Schriftführer,
4. O. Bartning, als Kassier,
5. Geheimerath Dr. Battlehner,
6. Geheimerath Oberbaudirektor Honsell,
7. Direktor P. Treutlein

bestanden.

Die Geschäfte des Redakteurs der Vereinsverhandlungen des Bibliothekars hat Prof. Dr. Schultheiss besorgt.

Bewegung unter den Mitgliedern.

Neu eingetreten sind die Herren Baurath Freiherr v. B Prof. Dr. Ludw. Bauer, Fabrikdirektor Beeg in Durlach, Dr. J. Behrens auf Augustenberg bei Grötzingen, Prof. Dr. Assistent Dr. J. Brode, Laboratoriumsvorstand Dr. P. Eitner, Ingenieur Eppenich, Assistent Dr. Frankenstein, Assistent Glaser, Chemiker Dr. F. Glaser, Dr. F. Heinsheimer, Lehrpraktikant Horn, Oberamtmann Jacob, Chemiker Dr. Kaufmann, Hauptlehrer Kneucker, Buchdruckereibesitzer Dr. A. Knittel, Lehrer Künkel in Ettlingen, Privatdozent Dr. Muth, prakt. Dr. Neumann, Fabrikdirektor Platz, Prof. Dr. Schur, Privatdozent Dr. Schwarzmann, Assistent Dr. Sieveking, k. preuss. Geol. Dr. Wiegers in Berlin.

Ausgetreten aus dem Verein sind, zum Theil in Folge von Wegzug die Herren Lehramtspraktikant Dienger, Assistent Dr. Glaser, Prof. Dr. Mie, Geh. Hofrath Nessler, Geh. Hofrath Dr. Schell.

Durch den Tod verlor der Verein: Inspektor Schell.

Der Verein hat am Schlusse des Berichtsjahres 204 Mitglieder gezählt, 19 mehr als im Vorjahre.

Mitglieder-Verzeichniss.

a. Ehrenmitglieder.

Die Herren:

Meidinger, Professor Dr., Hofrath in Karlsruhe (1901).
 Moritz, Dr. A., Staatsrath in Dorpat (1864).
 Struve, O. von, Russ. Wirkl. Geheimerath in Karlsruhe (1895).
 Trautschold, Dr. H. von, Russ. Wirkl. Staatsrath in Karlsruhe (1900).

b. Korrespondirendes Mitglied.

Herr R. Temple, Schriftsteller in Buda-Pest.

*c. Mitglieder.**

Allers, H., Zahntechniker (1899).
 Ammon, Otto, Privatier (1883).
 Arnold, E., Hofrath, Professor der Elektrotechnik an der Technischen Hochschule (1895).
 Babo, Freiherr von, Baurath (1902).
 Bartning, O., Rentner (1882).
 Battlehner, Dr. F., Geheimerath (1866).
 Battlehner, Dr. Th., Oberarzt am städt. Krankenhaus (1898).
 Bauer, Dr. Ludwig, Professor am Realgymnasium (1902).
 Beeg, H., Fabrikdirektor in Durlach (1902).
 Behm, O., Mechaniker (1889).
 Behrens, Prof. Dr. J., Vorstand der landw. Versuchsanstalt in Augustenberg bei Grötzingen (1902).
 Benckiser, Dr. A., Hofrath, prakt. Arzt (1890).
 Benckiser, Dr. W., Oberamtsrichter (1899).
 Benoit, G. von, Professor des Maschinenbaues (1902).

* Die beigelegten Zahlen bedeuten das Jahr der Aufnahme.

XVIII

- Berberich, Dr. A., prakt. Arzt (1897).
Blankenhorn, Prof. Dr. A. (1869).
Böhm, Dr. F., Ministerialrath (1899).
Bongartz, Dr. A., prakt. Arzt (1896).
Brauer, E., Hofrath, Professor der theoretischen Maschinenlehre an der Technischen Hochschule (1893).
Brian, Dr. E., Medizinalrath (1895).
Brode, Dr. J., Assistent an der Technischen Hochschule (1901).
Buch, H., Oberlandesgerichtsrath (1899).
Bürgin, J., Obergemeter an der Technischen Hochschule (1894).
Buhl, Dr. H., Fabrikant in Ettlingen (1899).
Bunte, Dr. H., Geh. Hofrath, Professor der chemischen Technologie an der Technischen Hochschule (1888).
Carl, Dr., Bezirksthierarzt (1901).
Cathiau, Dr. Th., Rektor der Gewerbeschule (1876).
Clauss, Dr. H. W., prakt. Arzt (1898).
Cramer, H., Lehramtspraktikant (1896).
Delisle, R., Oberingenieur a. D. (1886).
Dieckhoff, Dr. E., a. o. Professor der Chemie an der Technischen Hochschule (1880).
Dittrich, Dr. Th., Privatier (1897).
Doederlein, G., Oberingenieur (1899).
Döll, G., Medizinal-Assessor (1875).
Dörr, J., Professor an der Realschule (1895).
Doll, Dr. K., prakt. Arzt (1890).
Dolletschek, Ed., Kaufmann (1877).
Drach, A., Oberbaurath und Professor an der Technischen Hochschule (1881).
Durler, J., Professor am Gymnasium (1899).
Edelsheim, W., Freiherr von, Obersthofmeister, Excellenz (1867).
Eichhorn, Dr. F., Assistent für Forstwissenschaft an der Technischen Hochschule (1900).
Eitel, Dr. K. H., Apotheker (1897).
Eitner, Dr. P., Laboratoriumsvorstand an der chemisch-technischen Prüfungs- und Versuchsanstalt (1901).
Engler, Dr. K., Geheimerath, Professor der Chemie an der Technischen Hochschule (1876).
Eppenich, E., Civilingenieur (1902).

- Frankenstein, Dr. W., Assistent an der Technischen Hochschule (1901).
- Fischbach, Dr. E., prakt. Arzt (1895).
- Fischer, Otto, Hoflieferant (1900).
- Föhlisch, Dr. E., Fabrikinspektor (1900).
- Futterer, Dr. K., Professor der Mineralogie und Geologie an der Technischen Hochschule (1895).
- Gelpke, Dr. Th., Augenarzt (1892).
- Gernet, K., General-Oberarzt a. D. (1875).
- Glaser, Dr. F., Chemiker (1901).
- Glockner, B., Geheimerath, Direktor der Steuerrichtung (1878).
- Goedecker, E., Ingenieur (1899).
- Goffin, L., Direktor der Maschinenbaugesellschaft (1879).
- Gräbener, L., Hofgartendirektor (1880).
- Gräfenhan, Dr. P., Professor am Kadettenkorps (1897).
- Grashof, R., Professor am Gymnasium (1895).
- Gutmann, Dr. K., prakt. Arzt (1894).
- Gutsch, Dr. L., Medizinalrath, Spezialarzt für Chirurgie (1895).
- Haass, R., Prof., Laboratoriumsvorstand an der chemisch-technischen Versuchsanstalt (1875).
- Haber, Dr. F., a. o. Professor der Chemie an der Technischen Hochschule (1896).
- Hafner, Fr., Regierungsrath (1886).
- Haid, Dr. M., Geh. Hofrath, Professor der Geodäsie an der Technischen Hochschule (1882).
- Hart, J., Geheimerath, Professor des Maschinenbaues an der Technischen Hochschule (1870).
- Hassenkamp, K., Rentner (1875).
- Hauser, Dr. W., Obermedizinalrath (1898).
- Hausrath, Dr. H., a. o. Professor der Forstwissenschaft an der Technischen Hochschule (1897).
- Heinsheimer, Dr. F. (1902).
- Heintze, Dr., Legationsrath (1900).
- Helbing, Dr. P., prakt. Arzt (1896).
- Hemberger, J., Hofbaudirektor a. D. (1880).
- Henning, Th., Kommerzienrath (1896).
- Hess, Geh. Oberpostrath und Oberpostdirektor a. D. (1901).
- Hildebrandt, M., Geh. Oberfinanzrath (1881).
- Hilger, Dr. K., Kustos am Naturalienkabinet (1892).

- Hoffmann, Dr. H., prakt. Arzt (1881).
 Hoffmann, K., Major a. D. (1897).
 Holzmann, A., Professor an der Oberrealschule (1893).
 Homburger, Dr. Th., prakt. Arzt (1898).
 Honsell, M., Geheimerath, Direktor des Wasser- und Strassenbau
 Professor des Wasserbaues an der Techn. Hochschule (189).
 Horn, R., Lehramtspraktikant (1901).
 Hübler, A., Professor am Realgymnasium (1895).
 Jabukowski, Kandidat der Chemie (1901).
 Jacob, H., Oberamtmann (1901).
 Jahraus, W., Buchhändler (1899).
 Jourdan, Dr. J., prakt. Arzt (1894).
 Jschler, O., Lehramtspraktikant (1900).
 Kaiser, Dr. F., Medizinalrath (1889).
 Kamm, Dr. K., Amtmann in Pforzheim.
 Karle, M., Professor am Gymnasium (1897).
 Kast, Dr. H., a. o. Professor der Chemie an der Technisch
 Hochschule (1883).
 Kaufmann, Dr. A., Chemiker (1902).
 Keller, K., Geh. Hofrath, Professor des Maschinenbaues an d
 Technischen Hochschule (1869).
 Klein, Dr. L., Professor der Botanik an der Technisch
 Hochschule (1895).
 Klein, L., Kaufmann (1897).
 Kneucker, A., Hauptlehrer (1902).
 Knittel, Dr. A., Buchdruckereibesitzer (1902).
 Knittel, Dr. R., Buchhändler (1895).
 Kohlhepp, Fr., Bezirksthierarzt (1886).
 Kölmel, Prof. Dr., in Baden.
 Kors, A. van der, Bankdirektor (1890).
 Kressmann, A. Th., Major a. D. (1875).
 Kronstein, Dr. A., Chemiker (1896).
 Krumm, Dr. F., Spezialarzt für Chirurgie (1897).
 Künkel, K., Reallehrer in Ettlingen (1902).
 Küster, E., Generalleutnant z. D. (1895).
 Kux, Dr. H., Chemiker (1899).
 Lang, Dr. A., Professor am Realgymnasium (1897).
 Le Blanc, Dr. M., Professor der physikalischen Chemie un
 Elektrochemie an der Technischen Hochschule (1901).

- Lehmann, Dr. O., Hofrath, Professor der Physik an der Technischen Hochschule (1890).
- Lmebke, Dr. E., prakt. Arzt (1894).
- Leutz, F., Hofrath, Seminardirektor (1872).
- Leutz, H., Professor am Realgymnasium (1895).
- Levinger, Dr. F., prakt. Arzt (1895).
- Lorenz, W., Kommerzienrath (1879).
- Lüders, P., Ingenieur in Berlin (1895).
- Maier, E., Geh. Hofrath, Augenarzt (1871).
- Marschalck, K. von, Major a. D. (1896).
- Martin, Al., Kaufmann (1897).
- Massinger, R., Professor an der Oberrealschule (1894).
- May, Dr. W., Privatdozent für Zoologie und Assistent an der Technischen Hochschule (1899).
- Meess, Ad., Stadtrath (1899).
- Meidinger, Dr. H., Hofrath, Vorstand der Grossh. Landesgewerbehalle und Professor der technischen Physik an der Technischen Hochschule (1865). (Ehrenmitglied 1901.)
- Migula, Dr. W., a. o. Professor der Botanik und naturwissenschaftlichen Hygiene an der Technischen Hochschule (1891).
- Millas, K. de, Ingenieur (1893).
- Molitor, Dr. E., prakt. Arzt (1894).
- Müller, Dr. Eberh., Chemiker (1900).
- Müller, Dr. L., Medizinalrath (1896).
- Müller, Dr. U., a. o. Professor der Forstwissenschaft an der Technischen Hochschule (1893).
- Muth, Dr., Privatdocent der Botanik an der Technischen Hochschule; Augustenberg bei Grötzingen (1902).
- Näher, R., Betriebsinspektor (1893).
- Neumann, Dr. M., prakt. Arzt (1901).
- Netz, F., prakt. Arzt (1893).
- Nüsslein, Dr. J., Assistenzarzt (1900).
- Nüsslin, Dr. O., Hofrath, Professor der Zoologie an der Technischen Hochschule (1878).
- Oechelhäuser, Dr. A. von, Hofrath, Professor der Kunstgeschichte an der Technischen Hochschule (1898).
- Paull, Dr. H., prakt. Arzt (1898).

- Pfeil, Dr., Assistent am mineralogischen Institut der Technischen Hochschule (1901).
- Platz, H., Fabrikdirektor (1902).
- Reck, K. von, Freiherr, Geheimerath und Kammerherr (1869).
- Rehbock, Th., Professor des Wasserbaues an der Technischen Hochschule (1900).
- Reichard, Fr., Direktor des städtischen Gas- und Wasserwerkes (1892).
- Reichmann, M., Lehramtspraktikant (1901).
- Resch, Dr. A., prakt. Arzt (1888).
- Riffel, Dr. A., prakt. Arzt, a. o. Professor für Hygiene an der Technischen Hochschule (1876).
- Risse, Dr. H., prakt. Arzt (1899).
- Röder von Diersburg, Oberstleutnant z. D. u. Kammerherr (1901).
- Rosenberg, Dr. M., prakt. Arzt (1898).
- Roth, Dr. K., prakt. Arzt (1897).
- Rupp, G., Professor, Laboratoriumsvorstand an der Grossh. Lebensmittelprüfungsstation (1899).
- Sachs, W., Geh. Oberfinanzrath (1885)
- Schaaff, E., Privatier (1899).
- Schellenberg, R., Finanzrath (1899)
- Scheurer, K., Hofmechaniker und Optiker (1877).
- Schleiermacher, Dr. A., Professor der theoretischen Physik an der Technischen Hochschule (1881).
- Schmidt, Fr., Professor der wissenschaftlichen Photographie an der Technischen Hochschule (1892).
- Scholl, Dr. Rol., a. o. Professor der Chemie an der Technischen Hochschule (1896).
- Schröder, Dr. E., Hofrath, Professor der Mathematik an der Technischen Hochschule (1876).
- Schröder, L., Lehrer am Kadettenkorps (1895).
- Schultheiss, Professor Dr., Grossh. Meteorolog (1886).
- Schur, Dr. F., Professor der Geometrie an der Technischen Hochschule (1901).
- Schwarzmann, Dr. M., Privatdocent für Mineralogie an der Technischen Hochschule und Assistent am Naturalien-cabinet (1901).
- Schweickert, M., Oberlehrer a. D. (1873).

- Seith, K., Professor am Gymnasium (1885).
 Seneca, F., Fabrikant (1863).
 Siefert, X., Oberforstrath, Professor der Forstwissenschaft an der Technischen Hochschule (1895).
 Sieveking, Dr. H., Assistent an der Techn. Hochschule (1902).
 Sievert, E., Major a. D. (1884).
 Sprenger, A. E., Geh. Oberregierungsath (1878).
 Spuler, Dr. A., Privatdozent der Anatomie in Erlangen (1897).
 Stark, F., Professor an der Oberrealschule (1895).
 Stein, H., Apotheker in Durlach (1896).
 Steiner, Dr. A., prakt. Arzt (1896).
 Sternberg, Dr. H., prakt. Arzt (1897).
 Steude, Dr. M., Sekretär (1896).
 Struve, O. von, Russ. Wirkl. Geheimerath, Excellenz (1895). (Ehrenmitglied 1899.)
 Suck, O., Hofphotograph (1897).
 Teichmüller, Dr. J., a. o. Professor der Elektrotechnik an der Technischen Hochschule (1899).
 Tein, Dr. M. von, k. bayer. Bauamtmann (1888).
 Trautschold, Dr. H. von, Russ. Wirkl. Staatsrath (1895). (Ehrenmitglied 1900.)
 Treutlein, J. P., Direktor des Realgymnasiums (1875).
 Tross, Dr. O., prakt. Arzt (1893).
 Volz, H., Professor an der Akademie der bildenden Künste (1892).
 Wacker, M., Professor am Realgymnasium (1897).
 Wagner, Dr. E., Geheimerath, Konservator der Alterthümer (1864).
 Wagner, G., Privatier in Achern (1876).
 Wagner, Leop., Prokurist (1899).
 Wedekind, Dr. L., Hofrath, Professor der Mathematik an der Technischen Hochschule (1876).
 Weilandt, Dr., Assistent für Chemie an der Technischen Hochschule (1901).
 Weiler, Dr. A., Professor a. D. (1883).
 Wiegers, Dr. F., k. preuss. Geologe, Berlin.
 Williard, A., Baurath a. D. (1895).
 Wilser, Dr. L., in Heidelberg (1881).

XXIV

Witkowski, Dr. M., Apotheker (1900).

Wittmer, K., Forstrath (1899).

Wöhler, Dr. Loth., Privatdocent und Assistent am chemischen
Laboratorium der Technischen Hochschule (1898).

Wunderlich, Dr. H., prakt. Arzt (1896).

Zartmann, Dr. F., Privatmann (1899).

Ziegler, Dr. V., prakt. Arzt (1899).

Zimmermann, Fr., Maschineninspektor (1899).

Für die Redaktion verantwortlich:

Prof. Dr. Schultheiss.

Sitzungsberichte.

564. Sitzung am 24. Mai 1901.

Vorsitzender: Herr Geb. Rath Engler. Anwesend 70 Mitglieder.

Herr Hofrath Brauer hielt in einem Hörsaal des Maschinengebäudes der Technischen Hochschule einen Vortrag über die Einrichtungen des mechanischen Laboratoriums der Hochschule, und darnach unter Führung des Vortragenden besichtigt wurde.

565. Sitzung am 7. Juni 1901.

Vorsitzender: Herr Geh. Rath Engler. Anwesend 80 Mitglieder.

Im Zoologischen Hörsaal des Aulabaues der Technischen Hochschule hielt Herr Prof. Dr. Nüsslin einen Vortrag über "Geweiheweise", wobei er Folgendes ausführte.

Hörner und Geweihe sind Waffen, kommen nur bei Huftieren und unter diesen mit Ausnahme des Nashorns nur bei den echten Wiederkäuern, den Hohlhörnern, Gabelantilopen, Gazellen und Hirschen vor. Bei den Hirschen sind die Geweihe mit Ausnahme des Rennthieres auf das männliche Geschlecht beschränkt, daher als sekundäre Sexualcharaktere anzusehen und vorzugsweise als Waffen im geschlechtlichen Kampf. Da sie jedoch häufig sehr schwerfällige und komplicirte Bildungen sind, wodurch ihre Zweckmässigkeit als Waffen beeinträchtigt wird, so stellen sie vielleicht auch Zierrate des stärkeren Geschlechtes dar, durch die es den Weibchen zu gefallen sucht. Geweihlose männliche Hirsche und geweihtragende Weibchen

kommen nur ausnahmsweise vor. — Die Hörner der Rinder, Schafe, Ziegen und Antilopen kommen beiden Geschlechtern gemeinsam zu, und dienen daher in erster Reihe als Waffen gegen feindliche Thiere. — Sowohl die Hörner als auch die Geweihe sind als Ersatzorgane für die oberen Schneidezähne und die Eckzähne anzusehen, besonders für die letzteren, eine Annahme, die schon Aristoteles ausgesprochen hat. Die geweihlosen heutigen Hirsche (*Moschus*, *Hydropotes*) und einzelne Gattungen mit sehr ursprünglichem Geweih (*Elaphurus*, *Cervulus*) haben noch wohlausgebildete Eckzähne, die übrigen dagegen nur rudimentäre (Edelhirsch, Reh) oder überhaupt keine.

Den vollkommensten Wiederkäuern, den Hohlhörnern und den nordamerikanischen Gabelantilopen fehlen die Eckzähne und die oberen Schneidezähne stets vollständig. Dafür haben sie zeitlebens in beiden Geschlechtern Hörner. Niemals treten vollkommen entwickelte Eckzähne und Hörner oder Geweihe gleichzeitig bei einem Wiederkäuer auf. — Im Gegensatz zu ihrer gleichartigen Funktion sind Hörner und Geweihe ihrem Bau und ihrer Entwicklung nach sehr verschiedenartige Bildungen. Beide haben einen Knochenzapfen als Stütze, aber während beim Geweih dieser Knochenzapfen anfangs von behaarter Haut bedeckt ist, die später verloren geht, erfolgt bei der Hohlhornbildung eine Verhornung, die mit der darunter liegenden Lederhaut als Ueberzug des knöchernen Stirnzapfens erhalten bleibt. Ferner sind die Geweihe verästelt und werden alljährlich nach der Brunstzeit abgeworfen, während die Hörner nicht verästelt sind und nicht abgeworfen werden. Eine besondere Stellung nimmt in Bezug auf die Hornbildung die nordamerikanische Gabelantilope ein, deren Hörner gegabelt sind und durch Abwurf der Hornscheide gewechselt werden. — Die Geweihe sind unter sich wieder sehr verschiedenartig gebildet. Das einfachste Geweih ist das der Giraffe. Es ist ein zeitlebens mit behaarter Haut bedeckter unverzweigter Stirnzapfen. Auf der Stufe des Giraffengeweihs steht das Hirschgeweih im Baststadium des Spiessers. Erst durch Nekrose der beim Kampf entblößten Spitze, deren Abwurf und Ersatz, entsteht das typische Hirschgeweih, dessen individuelle Entwicklung sich bei den verschiedenen Hirscharten etwas verschieden gestaltet.

Einzelne Gattungen bringen es nur bis zum Spiesser (di

amerikaner (Coassus und Pudua), andere bis zum Gabler (Fur-
 er und Cervulus). Die meisten übrigen Hirscharten bringen
 nicht weiter als bis zum Sechser. Bei einigen Hirscharten
 sind die Geweihe schaufelartig, so bei Dam und Elch. Auch
 individuell sind die Geweihe recht verschieden, je nachdem die-
 se Hirschart in warmem oder kaltem, trockenem oder feuchtem
 Klima lebt, reichliche oder spärliche Nahrung vorfindet. — Die
 ontologische Entwicklung der Hirschgeweihe entspricht im
 Wesentlichen ihrer individuellen. So sind im Miocän nur Spiesser
 und Gabler vorhanden, und erst im Pliocän treten Sechser und
 Vierer auf. Die Diluvialzeit war ausgezeichnet durch den jetzt
 gänzlich ausgestorbenen Riesenhirsch mit aussergewöhnlich mächtig
 entwickeltem Geweih. — Was endlich die geographische Ver-
 breitung der Hirsche anlangt, so fehlen solche gänzlich in Australien,
 Neuseeland, Neuguinea und dem tropischen Afrika. Eine circum-
 polare Verbreitung besitzt das Rennthier, dessen Geweih sich durch
 grosse Variabilität auszeichnet, und der Elch. Sehr weit ver-
 breitet ist auch der Edelhirsch, da der kanadische Wapiti und
 asiatische Maral wahrscheinlich mit ihm spezifisch identisch
 sind. Diese und andere Verhältnisse der geographischen Ver-
 breitung der Hirsche erläuterte der Vortragende an einer Zu-
 sammenstellung der Hirschgeweihe, die auf einer grossen Wand-
 tafel an den Stellen ihres Vorkommens aufgehängt waren. Aus
 dieser Zusammenstellung ergab sich auch deutlich, dass die Grösse
 der Geweihe in den nördlichen Gegenden der Erde am bedeu-
 tendsten ist, während die südlichen fast nur Hirsche mit kleinen
 Geweihen aufweisen.

566. Sitzung am 28. Juni 1901.

Vorsitzender: Herr Geheimerath Engler. Anwesend: 21 Mitglieder.

Mitgemeldete Mitglieder: Herr Dr. Glaser, Assistent am chemischen Labo-
 ratorium der Technischen Hochschule, Herr Privatdozent Dr. Schwarz-
 mann, Assistent am Grossh. Naturalienkabinet.

Herr Prof. Dr. Futterer berichtete eingehend über die Ver-
 handlungen der internationalen seismologischen Konferenz, welche
 den Tagen vom 11.—13. April in Strassburg stattgefunden
 haben; der Vortrag ist unter den Abhandlungen zum Abdruck
 gebracht.

567. Sitzung am 13. Juli 1901.

Vorsitzender: Herr Geheimerath Engler. Anwesend: 29 Mitglieder.
Neu angemeldet als Mitglied: Herr Dr. Brode, Assistent am physikalisch-chemischen Institut der Technischen Hochschule.

Herr Prof. Rupp hielt einen Vortrag über „Wein und neue Weingesetz“. Bei der Schilderung der Weinbereitung hebt der Vortragende hervor, dass aus dem von den reifen Weinbeeren abgepressten Saft bei normalem Verlauf der Gährung, welche letztere durch die an den Weinbeeren haftenden Hefezellen eingeleitet wird, ohne jeden weiteren Zusatz ein gesunder, guter Wein erhalten werden kann. Der Redner schildert die bei der Gährung des zuckerreichen Traubensaftes, des Mostes, verlaufenden Vorgänge, wie die Bildung von Alkohol, Kohlensäure, Glykolsäure, Bernsteinsäure neben geringen Mengen von Essigsäure und Bouquetstoffen. Nach dem Lagern, öftern Abziehen und Reifen entsteht aus dem Jungwein der fertige klare Wein.

Nicht selten kommt es vor, dass, sei es durch eine mangelhafte Zubereitung des Weines, sei es durch Gährungsstörungen in Folge von Witterungseinflüssen bedingt, der Wein nicht trinkbar wird oder dass derselbe mit einem anderen Schönheitsfehler behaftet ist. In solchen Fällen wird eine Kellerbehandlung bestehend im Klären, Schönen, Schwefeln des Weines, nothwendig, die eingehend erläutert wird. In manchen Jahren, in denen die Trauben nicht zur Reife gelangen, werden saure Moste erhalten. Der Redner bespricht die Verbesserung solcher Moste mittelst Säuerungsmitteln und Zucker, insbesondere auch die Verfahren zur Weinverbesserung von Chaptal, Gall und Petiot, die in letzter Zeit aber in ein Strecken des Weines mit Zucker und Wasser bzw. mit Kunstwein ausgeartet seien.

Erstmals 1884 hat eine Kommission im Kaiserl. Gesundheitsamt in Berlin Beratungen gepflogen, um den Sachverständigen einheitliche Untersuchungsmethoden für den Wein, sowie Anhaltspunkte zur Beurtheilung desselben an die Hand zu geben. Viele Fälschungen wurden entdeckt und die gerichtlichen Hausdurchsuchungen förderten allerlei Chemikalien zu Tage, die zur Herstellung von Wein benützt wurden.

Das Reichsgesetz vom 29. April 1892, betreffend den Verkehr mit Wein, weinhaltigen und weinähnlichen Getränken, brachte die bekannten Grenzzahlen für Extrakt, Extraktrest und Mineral-

standtheile im Wein, manche Vorschriften desselben waren aber nicht bestimmt genug, um der Fälschung die nöthigen Schranken zu setzen. Die Weine wurden in der Regel nur nach ihrem Zuckr- und Mineralstoffgehalt beurtheilt, statt den ganzen Charakter, insbesondere das Aussehen und den Geschmack bei der Urtheilung zu verwerthen. Es fanden sich leider Chemiker vor, die derartigen geringwerthigen Produkten, welche aus unnormalen Mengen von Traubensaft und hauptsächlich aus veredelm Zucker bestanden, das Zeugniß der „Analysenfestigkeit“ ausstellten.

Die realen Weinproduzenten mussten geschützt werden und am 1. Oktober d. J. in Kraft tretende neue Weingesetz dürfte die unrealen Gebahren im Handel und Verkehr mit Wein sichere Schranken setzen. Redner erläutert die in diesem Gesetz anerkannte Kellerbehandlung des Weines, die Verbesserung desselben mittelst Entsäuerungsmitteln, sowie das Verbessern des Weines durch Zucker ohne erhebliche Vermehrung. Dabei hob derselbe hervor, dass Weine, die einen Zusatz von Zucker erhalten haben, nicht unter Bezeichnungen verkauft werden dürfen, welche die Annahme erwecken können, dass dieser Zusatz nicht stattgefunden hat. Es wurden ferner die Trester-, Hefe- und Rosinenweine, sowie die sogenannten Kunstweine, deren Herstellung nach dem neuen Weingesetze verboten ist, sowie eine Reihe von Chemikalien, Konservierungsmitteln, von Klärmitteln, künstlichen Süß- und Aromastoffen besprochen, die dem Wein überhaupt nicht zugesetzt werden dürfen.

Nach der Beschreibung des heutigen Standes der Weinanalyse berichtete der Vortragende Mittheilungen über die von ihm angestellten Versuche bezüglich des elektrolytischen Leitungsvermögens des Weines, von dem er hofft, dass er sich ebenso wie beim Trinkwasser zu quantitativen Bestimmungen eignet und so Messröhre und Telephon der analytischen Chemie dienstbar gemacht werden kann.

Der Vortragende zeigte an einem Experiment, dass sich der Wasserdampfdruckstand, das heisst die Menge der fixen Bestandtheile des Trinkwassers durch die Bestimmung der Leitungsfähigkeit desselben ausserordentlich schnell und fast mit derselben Genauigkeit feststellen lässt, als durch das übliche zeitraubende Einampfen eines bestimmten Volumens Wasser, sowie Trocknen und

Wägen des erhaltenen Rückstandes, so dass sich das rheometrische Verfahren insbesondere für Controlanalysen sehr gut eignet.

An den Vortrag knüpfte sich eine längere lebhafte Discussion, an der sich die Herren Dr. Dittrich, Geheimerath Engler, Prof. Le Blanc, Hofrath Meidinger, O. Ammon, Dr. Glauber, Prof. Oechelhäuser, Prof. Schleiermacher und Hofrath Limann betheiligten und welche davon Kenntniss gab, mit welchem Interesse die Mittheilungen des Vortragenden aufgenommen wurden.

568. Sitzung am 25. Oktober 1901.

Vorsitzender: Herr Geheimerath Engler. Anwesend 62 Mitglieder.

Der Vorsitzende theilt mit, dass in den Tagen vom 25. 27. Oktober die Naturhistorische Gesellschaft in Nürnberg ihr 100-jähriges und die Société Nationale des Sciences Naturelles et Mathématiques in Cherbourg ihr 50-jähriges Stiftungsfest feiern; es wird beschlossen, den Vorstand zu ermächtigen, beiden gelehrten Gesellschaften die Glückwünsche des Vereins zum Ausdruck bringen. Weiter machte der Vorsitzende bekannt, dass Herr Prof. Hittorf in Münster am 12. Januar 1902 sein 50-jähriges Professorenjubiläum feiere; in Anbetracht der hohen wissenschaftlichen Verdienste des greisen Jubilars schlug er vor, ihm in einer Adresse die Glückwünsche des Vereins auszudrücken; die Versammlung erklärt sich damit einverstanden.

Zum Schlusse theilte der Vorsitzende mit, dass die Bibliothek des Vereins nunmehr in einem Raum der Technischen Hochschule, der in dankenswerther Weise von der Gr. Regierung zur Verfügung gestellt worden sei, untergebracht sei, und dass zu fleissiger Benützung ein.

Der Vorsitzende hielt sodann einen Vortrag über Autoxydation und Selbstentzündung, worin er anknüpfte an die neuesten Ansichten über den Vorgang bei der Verbrennung und bei sonstigen Oxydationsprozessen ausführte, dass auch der Vereinigung des Sauerstoffs mit dem verbrennenden Körper bei den gewöhnlichen Verbrennungsprozessen die Bildung von Peroxyden, das sind mit Sauerstoff überladene Verbindungen vorausgehe, ähnlich wie dies bei den schon bei gewöhnlicher Temperatur von selbst verlaufenden sogenannten Autoxydationen

prozessen der Fall ist. Verbindungen dieser Art wurden eine Anzahl im hiesigen Laboratorium hergestellt und dienten zur Begründung der neuen Theorie, die darin besteht, dass die zuerst gebildeten Peroxyde ihren Sauerstoff an die brennenden Stoffe weitergeben und so den Verbrennungs- und Oxydationsprozess vermitteln. In nahem Zusammenhang damit steht die Selbstentzündung, denu, indem gewisse Stoffe schon bei gewöhnlicher Temperatur mit dem Luftsauerstoff solche Peroxyde bilden, die an sich äusserst kräftige Oxydatoren sind, übertragen diese den Sauerstoff weiter auf den brennbaren Körper und dieser entzündet sich oder andere Stoffe gleichsam von selbst, er wird zum Pyrophor. Eine Substanz dieser Art, die beim Erwärmen explodirt, wurde vorgezeigt, ebenso wurde durch eine Reihe von Versuchen die mehr oder weniger leichte Selbstentzündlichkeit verschiedener Stoffe erläutert. Auch die Selbstentzündung des Heus, der Steinkohle und gewisser Fettabfälle müssen auf solche Autoxydationsprozesse zurückgeführt werden. Beim Heu ist es der bei feuchtem Zustand eintretende Gährungsprozess, durch den die Temperatur im Innern eines Heuhaufens auf 70 und mehr Grad sich steigert und wodurch unter Mitwirkung von Bakterien das erhitzte Heu in einen halbverwesten und halbverkohlten Zustand übergeht, in dem es die Erscheinung der Autoxydation zeigt. Tritt desshalb Luft zu einer derart erhitzten Heumasse, so entzündet sie sich. Lüftung eines schon sehr heiss gewordenen Heuschobers ist desshalb verwerflich; sie kann die Entzündung geradezu herbeiführen. Vielmehr soll man feucht eingebrachtes Heu nur sorgfältig beobachten und falls es im Innern so heiss wird, dass die Hitze für die Hand unangenehm wird, insbesondere wenn es statt des stark aromatischen Duftes einen schärferen Geruch annimmt oder gar etwas zu qualmen anfängt, dasselbe auseinanderreissen und zur Abkühlung ausbreiten. Auch allzurasches starkes Einsinken des Heuhaufens ist ein bedenkliches Symptom.

Aehnlich verhält es sich mit der Selbstentzündung der Steinkohle, die schon zu so zahlreichen, zumal auf Schiffen so gefahrvollen Bränden geführt hat, nur dass dabei auch noch der den Kohlen beigemengte Eisenkies oder Schwefelkies, der sich in feiner Vertheilung an feuchter Luft sehr energisch oxydirt und erhitzt, eine Rolle spielt. Auch die Kohle ist ein Verwesungsprodukt pflanzlicher Substanz wie das pyrophore Heu und kann

sich deshalb, falls sie noch auf grossen Haufen liegt, im L
entzünden. Lüftung durch einzuführende Luftkanäle ist
hier zu verwerfen; bei eintretender Erhitzung und Bildun
Qualm müssen die Kohlen rasch auseinandergeworfen, nach
entstandenem Brand, z. B. in Schiffsräumen, die Luft n
Wasserdampf oder Kohlensäure verdrängt werden.

569. Sitzung am 8. November 1901.

Vorsitzender Herr Geheimerath Engler. Anwesend 51 Mitglied
Neu angemeldete Mitglieder: Herr Chemiker Dr. Glaser, Herr Dr.
Professor der Geometrie der Technischen Hochschule.

Der Vorsitzende theilte mit, dass die Stiftung,
im Frühjahr dem Verein für Zwecke der Erdbebenforschung
mentarisch vermacht wurde, die Genehmigung der Regieru
halten habe.

Herr Dr. May hielt sodann einen Vortrag über „Eri
Darwin“, der unter den Abhandlungen abgedruckt ist.

570. Sitzung vom 22. November 1901.

Vorsitzender Herr Geheimerath Engler. Anwesend 134 Mitglieder.
Neu angemeldete Mitglieder: Herr Dr. Paul Eitner, Abtheilungsvorst
an der Grossherzoglichen chemisch-technischen Prüfungs- und Versuchsanst
Herr Dr. Frankenstein, Assistent an der Technischen Hochschule.

Im physikalischen Hörsaal der Technischen Hochschule h
Herr Hofrath Professor Dr. Lehmann einen Vortrag ü
„Elektrische Entladungen, speziell über Elektrone
Kathoden- und Kanalstrahlen“.

Der Vortragende erörterte zunächst die Gründe, welc
dazu führten, die alte Hypothese von dem im elektrischen Funk
zu Tage tretenden elektrischen Fluidum, sowie die Hypothese d
die geladenen Leiter umgebenden elektrischen Atmosphäre
verlassen und mit Faraday als den Sitz der elektrischen Energ
den Isolator oder das von Kraftlinien durchzogene, den Condukt
umgebende Dielektrikum zu betrachten, welches sich in eine
eigenthümlichen Zwangszustand befindlich zu denken ist, ve
gleichbar der elastischen Spannung einer aufgezogenen Fede

es unter Funkenbildung durchreißt, wenn die Spannung gross wird. Sodann legte er an der Hand von zahlreichen alten Zeichnungen und Experimenten besonders die Ergebnisse eigener Untersuchungen dar, welche den Zweck hatten, die Theorien des Entladungsvorganges näher aufzuklären.

Die Zerreissung des Dielektrikums ist allerdings analog dem einer allzu straff gespannten Feder, doch darf man dabei an elastische Kräfte denken, da der Funke nicht nur in festen, sondern auch in einem flüssigen oder luftförmigen auftreten kann. Man muss vielmehr annehmen, dass der Entladungsvorgang beruhe auf Zertrümmerung der Moleküle, d. h. Ueberwindung der die Atome zu Moleküle verbindenden Attraktionskräfte. In solchem Sinne kann man von der „elektrischen Festigkeit“ des Dielektrikums sprechen. Versucht man dieselbe für Gase zu bestimmen durch Messung, in welcher Spannung mit dem betreffenden Gase gefüllte Glasgefässe bei Berührung an einen geladenen Konduktor aufleuchten, oder bei welcher Spannung die Entladung an einer in dem Gase befindlichen Spitze eintritt, hatten verschiedener Störungen halber den gewünschten Erfolg. Immerhin konnte konstatiert werden, dass entgegen der noch bis vor wenig Jahren herrschenden Ansicht, eine Elektrisirung der Luft durch Spitzenentladung unmöglich, und die Erscheinungen des sogenannten elektrischen Feindes würden nur durch Staubpartikelchen verursacht, die von der Spitze fortgestossene Luft thatsächlich eine beträchtliche Menge von Elektrizität enthält, als deren Träger nur durch Zertrümmerung der Moleküle entstandenen elektrischen Atome betrachtet werden können.

Alle Erscheinungen weisen darauf hin, dass sämtliche Atome elektrische Ladungen besitzen, welche verborgen bleiben, solange dieselben zu Molekülen vereinigt sind, weil beide Elektrisitäten in gleicher Menge vorhanden sind und somit ihre Wirkungen nach aussen sich gegenseitig aufheben. Zu dieser Annahme führen insbesondere auch die Untersuchungen von A. Lorentz (1880), welche eine wesentliche Ergänzung der von Maxwell und Hertz begründeten elektromagnetischen Lichttheorie darstellen, indem durch sie der Nachweis erbracht wurde, dass die Farbenzerstreuung des Lichtes bei der Brechung (Dispersion) ihren Grund hat in dem Vorhandensein beweglicher

elektrischer Ladungen in den Atomen, der sogenannten „Elektronen“. Auch das eigenthümliche Verhalten der „flüssigen Krystalle“, deren Struktur sich kaum anders als durch die Wirkung elektrischer oder magnetischer Kräfte zwischen den Molekülen erklären lässt, ferner auch die in neuerer Zeit von Planck aufgestellte Theorie der „Strahlung schwarzer Körper“ führen zu ähnlichem Ergebniss.

Die Lichterscheinung, welche bei der elektrischen Entladung auftritt, kann man sich hervorgebracht denken durch die bei Begegnung entgegengesetzt geladener Atome auftretende elektrischen Schwingungen. Die Verschiedenheit der Lichterscheinungen am positiven und negativen Pol lässt sich vielleicht zurückführen auf Umhüllung des negativen Pols mit positiver elektrischer Luft, welche ihre Elektrizität an diesen schwierig abgibt, als umgekehrt negative Luft an den positiven Pol.

Die weiteren Untersuchungen bezweckten hauptsächlich gerade diese Frage aufzuklären. Um die Störungen zu vermeiden, die sich in engen Entladungsgefässen, sogenannten Geissler'schen Röhren, wie sie gewöhnlich gebraucht werden, zu vermeiden wurden die Versuche ausgeführt in grossen sogenannten „elektrischen Eiern“ von 36 bis 40 cm Weite und 60 bis 80 cm Länge. Das Arbeiten damit erwies sich allerdings nicht ganz ungefährlich, in sofern es sich wiederholt ereignete, dass das Gefäss durch den äusseren Luftdruck zertrümmert wurde, wobei die Splitter bis 15 Meter weit flogen und sogar in Eichenbohlen eindrangen. Zum Schutze der Zuhörer wurde deshalb bei den Demonstrationen das elektrische Ei hinter einer starken Spiegelglasscheibe aufgestellt.

Auf die Einzelheiten der beobachteten Erscheinungen, welche sich nur unter Beiziehung von Figuren beschreiben liess, kann hier nicht eingegangen werden. Als besonders interessant und bisher nicht beobachtet mag aber angegeben werden, dass sich unter Umständen bei gleichbleibendem Gasdruck eine ausserordentlich starke Veränderlichkeit des dunkeln Kathodenraums zeigte, dessen Dicke beispielsweise bei einem Versuch im Laufe einer Stunde sich von etwa 4 cm bis zu 40 cm vergrösserte, so dass schliesslich auch die Anode in ihn eintauchte und damit der Stromdurchgang unmöglich gemacht wurde. Ferner gelang es bei relativ mässigen Verdünnungen und gleichzeitiger Einwirkung

eines magnetischen Feldes mehrere Meter lange Bündel von blauen negativen Glimmlichtstrahlen zu erhalten, welche ungestört mehrere als Anode benutzte Drahtnetze durchdrangen, ja sogar durch ein aus entgegengesetzter Richtung kommendes gleich langes Bündel von Glimmlichtstrahlen sich fortpflanzen konnten, und ebenso durch ein Bündel von Kanalstrahlen. Bei solcher gegenseitiger Durchdringung zweier Entladungen ergab sich ferner, dass die positive Entladung in den dunkeln Kathodenraum einzudringen vermag, allerdings nur schwierig, und dass sie dann die Form eines dünnen blauen Strahls annimmt, welcher von einem Glimmlichtstrahl nicht zu unterscheiden ist. Es hält schwer, diese Erscheinungen vom Standpunkt der dargelegten Theorie aus zu erklären, zumal da nothwendig die Annahme gemacht werden muss, dass bei jeder Entladung positive und negative Entladung in äusserst rascher Folge alterniren, während thatsächlich doch von solchen Intermittenzen nichts zu bemerken ist. Es kommt hinzu, dass die Entladung auch in dem einatomigen Quecksilberdampf möglich ist, in welchem von einer Zertrümmerung der Moleküle natürlich keine Rede sein kann. Die neue sogenannte „Elektronentheorie“ nimmt deshalb an, dass nicht eine Zertrümmerung der „Moleküle“, sondern vielmehr der „Atome“ stattfindet, dass speziell negativ geladene Partikelchen, deren Masse ungeheuer viel kleiner ist als die des kleinsten Atoms, mit der fast unfassbaren Geschwindigkeit von 100 Millionen Meter in der Sekunde von der Kathode fortgeschleudert werden und hiedurch die Erscheinung der „Kathodenstrahlen“ und indirekt die der Glimmlichtstrahlen hervorrufen, während die nach entgegengesetzter Richtung geschleuderten positiven Reste als „Kanalstrahlen“ erscheinen. Das Verhalten der genannten Strahlenarten gegen elektrische und magnetische Kräfte steht mit dieser Annahme im Einklang. Ebenso erklärt sich dadurch eine eigenthümliche Veränderung, welche das Licht einer gasförmigen Lichtquelle erleidet, wenn dieselbe in ein starkes magnetisches Feld gebracht wird, das sogenannte „Zeeman'sche Phänomen“. In verdünnter Luft können die Elektronen verhältnissmässig lange Wege zurücklegen, in dichter nur kurze, da sie bald von den Molekülen aufgefangen werden und dann die Erscheinung des elektrischen Windes hervorbringen. Mehr oder minder gut lässt sich durch die Elektronentheorie auch das Auftreten der Lenard- und Röntgen-

strahlen, sowie die Einwirkung des ultravioletten Lichtes auf elektrische Körper deuten, und, nachdem in jüngster Zeit der Nachweis erbracht ist, dass auch die Becquerelstrahlen gegen magnetische und elektrische Kräfte sich ganz ebenso verhalten wie die Kathodenstrahlen, wird es nöthig sein, auch diese Ströme von Elektronen zu deuten, obschon vorläufig nicht gelungen ist, eine Ursache aufzufinden, welche solche Ströme hervorbringen könnte.

Die nähere Untersuchung der Elektronenbewegung hat fern von der Annahme geführt, dass die Masse der Elektronen nicht nur sehr klein ist gegen die Masse der gewöhnlichen Atome, sondern in Wirklichkeit überhaupt nicht existirt, in sofern so ausserordentlich rasch bewegter, völlig massenloser elektrischer Punkt doch eine gewisse Trägheit zeigen muss, weil er ein magnetisches Feld um sich erzeugt, dessen Bildung einen Energieverbrauch bedingt. Die Annahme, dass die Elektronen auch in der metallischen Leitung sich fortzubewegen vermögen und den elektrischen Strom bilden, hat ermöglicht, auch die thatsächliche Beziehung zwischen elektrischer Leitung und Wärmeleitung zu deuten. Auch diese Annahme hat somit eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Allerdings würde man dadurch fast wieder auf den Standpunkt der alten Theorie des elektrischen Fluidums, welche die Leitung durchfliesst und in Funken zum Vorschein kommt, zurückkommen.

Weitere Spekulationen, dass vielleicht die Atome überhaupt nur Aggregate von Elektronen seien, dass also überhaupt keine Masse nur eine scheinbare Masse sei und eine Gravitation im Sinne einer Einwirkung nicht existire, dass sich vielleicht der Traum der Alchemisten doch noch verwirklichen lasse und auch die Lebensthätigkeit der kleinsten Organismen der Bakterien besserer Weise als auf Grund der relativ groben Atomstruktur durch das Getriebe der winzigen Elektronen erklärbar sein müsste, mag nur hingewiesen werden.

Von wirklichem Werth wird die neue Theorie erst dann, wenn sie nicht nur wenige einzelne Erscheinungen, sondern die Gesamtheit der zahlreichen beobachteten Thatsachen bezüglich des Entladungsvorgangs zu erklären vermag. Vorläufig hat es aber den Anschein, die alte Theorie von Faraday passe auf die weit grössere Zahl der beobachteten Erscheinungen. Klarheit kann

nur gewonnen werden durch Beobachtung grösster Vorsicht bei jedem Schritt und durch innige Verbindung von Theorie und Experiment.

571. Sitzung am 6. Dezember 1901.

Vorsitzender: Geheimerath Dr. Engler. Anwesend: 31 Mitglieder.

Neu angemeldetes Mitglied: Herr Lehramtspraktikant Horn.

Herr Prof. Dr. Schultheiss berichtete zunächst im Anschluss an einen im Winter gehaltenen Vortrag über das Hagelschiessen, d. i. über die Bestrebungen, die Hagelbildung durch Abgabe von Schüssen zu verhindern. Die praktisch wie theoretisch interessante Frage der Wirksamkeit des Hagelschiessens wurde eingehend auf der Tagung der deutschen Meteorologischen Gesellschaft, welche vor Ostern in Stuttgart stattgefunden hat, durchberathen. Das Ergebniss war, dass die Fachleute in der schon vorher herrschenden Ansicht noch bestärkt wurden, welche dahin geht, dass erhebliche theoretische Bedenken gegen die Wirksamkeit des Hagelschiessens beständen, weil insbesondere den aus den Wetterkanonen herausfahrenden Luftwirbeln nur auf geringe Entfernungen grössere Energie inne wohne, während in etwa 300 Meter Entfernung keinerlei Wirkung mehr zu verspüren sei; man müsse sich aber gleichwohl eines endgiltigen Urtheils enthalten, bis die Ergebnisse der von Fachleuten im Auftrag der österreichischen Regierung angestellten Untersuchungen vorlägen. Auf der Stuttgarter Versammlung war auch die Kostenfrage berührt worden; darnach erfordert jede Schiessstation etwa 400 M. einmalige und etwa 110 M. laufende Kosten. Würde in Württemberg jeder Quadratkilometer durch eine Wetterkanone vertheidigt, so würde das Schiessen in einem Jahr so viel kosten, als der Hagelschaden durchschnittlich beträgt. Ein nach österreichischem Muster in den von Hagel besonders oft heimgesuchten badischen Amtsbezirken Engen, Stockach und Ueberlingen eingerichtetes Netz von Schiessstationen würde einen einmaligen Aufwand von mehr als 400 000 M. und einen laufenden jährlichen von rund 115 000 M. erfordern, während der mittlere jährliche Hagelschlag rund 200 000 M. beträgt. Wie unwirtschaftlich das Hagelschiessen ist, geht auch daraus hervor, dass in mindestens 90 Proz. aller Fälle umsonst geschossen wird, da nur 5 bis 10 Proz. aller Ge-

witter Hagel im Gefolge haben; weil man nicht vorher erkennen kann, ob ein Gewitter Hagel bringt oder nicht, muss bei jedem geschossen werden. Berichte über Wirksamkeit des Hagelschiessens können nicht ohne weiteres als beweiskräftig angesehen werden, weil es, auch ohne dass geschossen wird, vorkommt, dass im Zuge eines Hagelwetters ganz verschonte Gebiete liegen. Der Vortragende zeigte zwei auf einer Karte des südlichen Badens eingezeichnete Hagelwetter, von denen das eine fünf, das andere aber von einander getrennte Gebiete betroffen hat.

Berichte über die österreichischen Versuchsfelder liegen zur Zeit noch nicht vor, wohl aber über die italienischen. Die beiden von der italienischen Regierung in die oberitalienischen Hagelschiessgebiete abgesandten Meteorologen, die Professoren Pochetti und Rizzo, haben über ihre während eines ganzen Sommers gemachten Erfahrungen eingehend berichtet. Demnach behaupteten mehrere von den Hagelschiessenden behaupteten Erscheinungen, z. B. dass Löcher in die Wolken geschossen wurden und dass die elektrischen Entladungen nachlassen, nicht. Professor Pochettino theilt mit, dass unter 192 Fällen, in denen es in einem bestimmten Gebiete hagelte, 60 mehr oder weniger für die Wirksamkeit des Schiessens, 123 dagegen sprachen; 46 davon waren grobe Misserfolge. Auch der Generalinspektor der italienischen Hagelversicherungsgesellschaft in Mailand, Stabili, berichtet über 16 Fälle, in denen es trotz regelmässigen Schiessens stark, selbst bis zur Vernichtung der Ernte gehagelt habe. Die abwartende Haltung der Fachkreise ist demnach vollkommen berechtigt.

An den Vortrag knüpfte sich eine Besprechung an, an welcher sich ausser dem Redner die Herren Dittrich, Futterer, Jahra und Meidinger beteiligten.

Herr Lehramtspraktikant M. Reichmann sprach sodann über die Erdbeben in Baden im Jahre 1901. Das erste fand am 24. März zwischen 4.20 und 4.26 Uhr morgens statt und betraf den südlichen Schwarzwald und die nordwestliche Schweiz. Die Erschütterung erreichte Stärkegrad 3 nach der von Futterer abgeänderten Forel'schen Erdbebenskala. Zu den am stärksten betroffenen Orten zählen die Ortschaften im Wiesenthal, an der Rheinthalspalte und im Münsterthal. Das pleistocene Gebirge lag im unteren Wiesenthal. Der Vortragende gab dann eine

Ueberblick über den geotektonischen Bau des betroffenen Gebiets. Seine Ausführungen führten zu folgendem Ergebniss: Das Erdbeben entstand durch eine Verschiebung von Sedimentschollen im unteren Wiesenthal. Von hier pflanzte sich das Erdbeben weiter nach Nordosten und Südwesten, als nach anderen Richtungen fort. Im Osten und Westen ist das Schüttergebiet durch Verwerfungslinien abgegrenzt. Die Rheinthalspalte erwies sich als ausgezeichnete Schütterlinie. — Das zweite Beben fand am 22. Mai zwischen 7 Uhr 57 und 8 Uhr 3 morgens statt und betraf ebenfalls das Wiesenthal. Als Ursache dieses Bebens ist gleichfalls eine Dislokation anzunehmen.

An der Besprechung, welche sich an den Vortrag anschloss, beteiligten sich die Herren Delisle, Engler, Futterer und Jahraus, sowie der Redner.

572. Sitzung am 20. Dezember 1901.

Vorsitzender: Herr Geheimerath Engler. Anwesend 36 Mitglieder.

Neu angemeldete Mitglieder: Herr Oberamtmann Jacob, Herr Nervenarzt Dr. Neumann.

Herr Dr. Wilser aus Heidelberg sprach über „Rasse und Gesundheit“. Der Vortrag ist sammt der Besprechung, die sich daran anschloss, unter den Abhandlungen zum Abdruck gebracht.

573. Sitzung am 10. Januar 1902.

Gemeinsam mit dem Kolonialverein und der Gesellschaft Museum.

Vorsitzender: Herr Geheimerath Engler.

Im grossen Saale des Museums sprach Herr Dr. Heinroth aus Berlin über „Land und Leute im Bismarckarchipel“ unter Vorführung vieler selbstgefertigter Lichtbilder.

574. Sitzung am 17. Januar 1902.

Vorsitzender: Herr Geheimerath Engler. Anwesend 70 Mitglieder.

Im chemischen Hörsaal der Technischen Hochschule sprach Herr Prof. Dr. Haber über den „textilen Flachdruck“ mit zahlreichen Experimenten.

575. Sitzung am 7. Februar 1902.

Vorsitzender: Herr Geheimerath Engler. Anwesend 22 Mitglieder.
 Neu angemeldet als Mitglieder: Die Herren Fabrikdirektor Beeg in Durla
 Dr. Heinsheimer, Fabrikdirektor Platz, Assistent Dr. Sieveking

Herr Prof. Leutz hielt einen Vortrag über „Erdbebe Messapparate“.

Seismometer sind Instrumente, welche den ganzen Verlauf eines Erdbebens registriren sollen, während Seismoskope nur einzelne Phasen der Erscheinung festlegen. Die Seismometer gestalten entweder nur die horizontale oder vertikale Komponente der Erdbewegung oder beide zugleich. Die horizontale Bewegung wird mit Hilfe von Pendeln und rollenden Körpern bestimmt, die vertikale unter Anwendung von Spiralfedern und hydrostatischen Systemen.

Aus der grossen Mannigfaltigkeit der vorhandenen Seismometer wurden einzelne beschrieben, besonders eingehend das Ewing'sche lange Pendel, das Ewing'sche Doppelpendel mit den von Milne angebrachten Verbesserungen, die Grablowitz'sche Pendel, die Mikroseismographen von Vicentini und schliesslich das Horizontalpendel von Milne und Rebeur-Paschwitz in ihren verschiedenen Ausführungen.

576. Sitzung am 21. Februar 1902.

Vorsitzender: Herr Geheimerath Engler. Anwesend 37 Mitglieder.
 Neuangemeldetes Mitglied: Herr Chemiker Dr. Kaufmann.

Herr Dr. Kronstein sprach über „Natürliche und künstliche Harze“. Nach einer kurzen Einleitung, in der der Vortragende die bis jetzt aufgestellten Harztheorien in solche theilte, welche nur dem Verhalten der Harze Rechnung tragen, und solche, die nur die Bildung derselben zu erklären suchen, geht auf das Polymerisationsproblem über. — Ueber die innern Vorgänge, welche sich abspielen, wenn flüssige organische Substanz nach längerem Stehen fest werden, ohne etwas aufzunehmen oder abzugeben, war bis jetzt nichts bekannt. Dem Vortragenden gelang es, nachzuweisen, dass die Hälfte des flüssigen Körpers sich in einen höhermolekularen Körper verwandelt, welchen er vorläufig als Zwischenprodukt bezeichnet. Die Zwischenprodukte verschiedener Substanzen zeigen in jeder Hinsicht das gleiche

Verhalten und bilden eine Körperklasse für sich. Charakteristisch für diese Körperklasse ist die Thatsache, dass gleiche Gewichtstheile des Zwischenprodukts und des monomolekularen Körpers beim Erhitzen die Erscheinung des Gerinnens zeigen. Der geronnene Körper ist unlöslich und geht beim Erwärmen in einen festen Zustand über. Vortragender zeigt ein solches Produkt, welches aus einem Zimmtsäurederivat hergestellt ist, und welches das gleiche Aussehen und die gleichen Eigenschaften hat, wie der natürliche Bernstein. Indem der Vortragende das Verhalten dieses künstlichen Harzes mit dem des natürlichen Bernsteins vergleicht, kommt er zum Schluss, dass ein Unterschied zwischen denselben nicht vorhanden sei. Es ist also zum ersten Mal der Aufbau eines Harzes gelungen. Durch Versuche führt Redner die Uebergänge der flüssigen Körper in einen gelatineartigen Zustand und die Verwandlung des letzteren in den festen Zustand vor. Zum Schluss bespricht er seine neue Harztheorie, nach welcher er die Harze als reine Polymerisationsprodukte vom Typus des Styrols auffasst. Ausser dem polymerisirten Körper enthält das Baumöl nicht polymerisirende Theile. Letztere können nicht die Bildung des Zwischenprodukts, wohl aber die Gelatinirung verhindern. Ihre Wirkung ist nur durch ihre Menge bedingt. Ist diese klein, so entstehen Balsame, welche sich mit der Zeit in Hartharze verwandeln. Uebersteigt der Gehalt der nichtpolymerisirenden Substanzen ein gewisses Verhältniss, so entstehen Weichharze, resp. solche Balsame, welche nicht befähigt sind, Hartharze zu bilden.

An der Besprechung, die sich an den durch mehrere Experimente veranschaulichten Vortrag knüpften, betheiligten sich die Herren Ammon, Beeg, Doll, Engler, Kaufmann, sowie der Vortragende.

577. Sitzung am 7. März 1902.

In Anwesenheit Ihrer Königl. Hoheiten des Grossherzogs und der Grossherzogin und zahlreicher eingeladener hoher Gäste sprach Herr Prof. Dr. Braun aus Strassburg in der Aula der Technischen Hochschule über sein „System der drahtlosen Telegraphie“ mit experimentellen Vorführungen.

578. Sitzung am 14. März 1902.

Vorsitzender: Herr Geheimerath Engler. Anwesend 45 Mitglieder.
 Neu angemeldete Mitglieder: Prof. Dr. Bauer, Prof. Dr. J. Behrens a
 Augustenberg, Civiling. Eppenich, Buchdruckereibesitzer Dr. A. Knitt

Herr Professor Dr. Mie hielt einen Vortrag über die „Elektrolyse der Luft“. Nach der heutigen Auffassung ist ein elektrisches Feld ein Raum, in welchem sich der Weltäther (d. h. d. nichtgreifbare Theil der Materie) in einem eigenthümlichen Zustand der Spannung befindet. Aber ebenso, wie eine elastische Feder sich nicht von selbst ausspannt, sondern nur durch die Wirkung einer äusseren Kraft, die durch einen mit ihr (etwa durch Klemmschrauben) verbundenen Körper vermittelt wird, so kommt auch ein elektrisches Feld nur zu Stande, wenn die greifbaren Theilchen der Materie, die mit dem Aether wirksam verbunden sind, durch die ihnen „eingepprägten“ Kräfte geeignete Ortsveränderungen erfahren. Die Verbindung, wenn man will, die Klemmschraube, zwischen Atom und Aether ist die elektrische Ladung. Die ersten Kenntnisse über die Ladungen der Atome oder „Ionen“ verdanken wir den Untersuchungen Faraday's über die Leitung in Elektrolyten. Danach überträgt jedes sich ausscheidende Atom (oder Radikal), eine Elektrizitätsmenge, welche seiner chemischen Valenz proportional ist, sonst aber nicht von der Natur des Atoms abhängt. Die kleinste elektrische Ladung, die möglich ist, die des einwerthigen Atoms, nennt man die elektrische Elementarquantum. Es ist kürzlich Planck gelungen, den genauen Werth des Elementarquantums zu berechnen. Die Gase sind im Allgemeinen gute Isolatoren, nur durch besondere Mittel, z. B. starke Erhitzung, Funkenentladung, gewisse chemische Prozesse kann man sie leitend machen. Aber in all diesen Fällen sind zu viele Nebenwirkungen vorhanden, die den Vorgang unübersichtlich machen. In den letzten Jahren hat man in den Röntgenstrahlen ein Mittel gefunden, welches die Gase ohne weiteres in Leiter der Elektrizität verwandelt, allerdings immer von sehr hohem Widerstand. Um die Untersuchung dieser leitenden Gase hat sich besonders J. J. Thomson in Cambridge mit seinen Schülern verdient gemacht, in Deutschland in besonders hohem Grade Elster und Geitel in Wolfenbüttel. Thomson ist es gelungen, zu zeigen, dass das leitende Gas positiv und negative Partikelchen suspendirt enthält, die man durch ein

elektrisches Feld von einander trennen kann. Leitet man durch ein Gasquantum, das einer konstanten Röntgenstrahlung ausgesetzt ist, einen elektrischen Strom, so folgt dieser bei sehr geringen Stromstärken dem Ohm'schen Gesetz. Verstärkt man ihn nach und nach, so erreicht man schliesslich einen Maximalwerth, über den man mit keinen Mitteln hinauskommen kann. Es ist dann die Zahl der elektrischen Theilchen, die der Strom dem Gas entzieht, genau gleich der durch die Röntgenstrahlen fortwährend neu gebildeten. In Luft, die mit Feuchtigkeit übersättigt ist, bilden die Ionen Nebelkerne. Es gelang Thomson, die Zahl der in einem den Röntgenstrahlen ausgesetzten Gasquantum gebildeten Nebeltropfen zu zählen, und damit auch direkt die Zahl der Ionen zu bestimmen. Berechnete er daraus den Werth des elektrischen Elementarquantums, so ergab sich eine gute Uebereinstimmung mit dem Planck'schen Werth. Die positiven und die negativen Ionen sind von einander verschieden, also sind nicht etwa in den chemisch einfachen Gasen zwei gleiche Atome, die sich nur durch ihre elektrische Ladung unterscheiden. Die negativen Ionen haben eine grössere Wanderungsgeschwindigkeit. Bläst man elektrolysirte Luft durch ein zur Erde abgeleitetes Metallrohr, so gehen die negativen Ionen schneller zum Metall hin und die Luft kommt mit einem kleinen Ueberschuss positiver Ladung heraus. Ferner bilden sich um die negativen Ionen leichter Nebeltropfen, als um die positiven. Die von Hertz zuerst entdeckten lichtelektrischen Erscheinungen, bei denen dieselben Ionen auftreten, wie bei der Wirkung der Röntgenstrahlen, gestatteten Thomson, die Grösse eines negativen Ions zu bestimmen. Er fand, dass sie den 700. Theil eines Wasserstoffatoms ausmacht. Neuere Untersuchungen machen es wahrscheinlich, dass dieser Werth noch dreimal so gross ist als der richtige. Bei der Elektrolyse der Luft wird also nicht nur das Molekül, sondern vielmehr das Atom selbst in ein grosses positives und ein äusserst kleines negatives Ion, das „Elektron“, zerspalten. Elster und Geitel haben gefunden, dass schon die gewöhnliche Luft, wenn auch in äusserst geringen Mengen, dieselben Ionen enthält, wie die den Röntgenstrahlen ausgesetzte, und haben höchst interessante Anwendungen für die Erklärung der elektrischen Ladungen der Atmosphäre und der Erde gemacht. Von besonderer Bedeutung sind neuerdings die sogenannten radio-

aktiven Substanzen geworden, Körper, die aus eigener Kraft mit grosser Geschwindigkeit Elektronen abschleudern und dadurch die Luft jonisiren.

An der Diskussion beteiligten sich die Herren Arno Engler, Haber, Lehmann und Müller.

579. Sitzung am 2. Mai 1902.

Vorsitzender: Herr Geheimerath Engler. Anwesend 68 Mitglieder.

Neu angemeldetes Mitglied: Herr Baurath Freiherr von Babo.

Der Vorsitzende theilte mit, dass der Vorstand beschlos habe, Seiner Königlichen Hoheit dem Grossherzog aus Anlass seines 50jährigen Regierungsjubiläums eine Festschrift zu überreichen. Diese sei inzwischen fertiggestellt und übergeben worden; sie enthalte Beiträge von den Herren Brauer, Schleimacher, Lehmann, Engler und May. Ihr Inhalt werde auch im nächsten Bande der Verhandlungen des Vereins zum Abdruck gebracht.

Der Vorsitzende brachte sodann den ersten Band des von dem Mitglied Herrn Hofrath Arnold verfassten Werkes über die Gleichstrommaschine unter dem Ausdruck des besten Dankes an den Verfasser zur Vorlage.

Hierauf sprach Herr Privatdozent Dr. Muth über „Das Problem der Befruchtung“. Nach den Ausführungen des Vortragenden ist dieses Problem eines der ältesten und zugleich interessantesten, das zur Zeit so recht wieder im Vordergrund der naturwissenschaftlichen Forschung steht; erst auf der Naturforscherversammlung in Hamburg hat einer der berufensten Vertreter auf diesem Gebiete, der Würzburger Zoologe Boveri, seine Ansicht über das Wesen der Befruchtung in einem längeren Vortrag dargelegt. Die Vertreter verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen, die Philosophen und Naturforscher, die Zoologen, Botaniker und die physiologischen Chemiker haben in den letzten 25 Jahren mit eifrigem Wettstreit an der Lösung dieses Problems gearbeitet. Sind es doch auch wichtige und hochbedeutsame Fragen, welche mit der Lösung desselben zusammenhängen; es sei z. B. nur an die Frage der Bastardirung und der Vererbung erinnert.

Es war nun vor allem die Absicht des Vortragenden, den Weg anzudeuten, auf welchem sich die Forschung auf diesem s

arbeitsvollen und man darf wohl auch sagen, erfolgreichen wissenschaftlichen Gebiete bis zu dem jetzigen Stande unseres Problems durchgerungen hat, um dann zum Schlusse daran anschliessend und darauf aufbauend den letzteren selbst etwas eingehender zu charakterisiren.

Nachdem im Jahre 1875 Oskar Hertwig an den Eiern des Seeigels die genaueren Vorgänge bei der Befruchtung, deren Wesen in der Verschmelzung zweier Zellen besteht und deren wesentlichstes Moment die Vereinigung der beiden Kerne dieser Zellen ist, beobachtet hatte, führte er im Verein mit seinem Bruder Richard Hertwig eine grössere Reihe von Versuchen aus über die Einwirkung äusserer Agentien auf den Befruchtungs- und Theilungsvorgang des thierischen Eies, und zwar des Seeigeleies. Diese Versuche, bei welchen der Einfluss chemischer Agentien, erhöhter und erniedrigter Temperatur, sowie von mechanischen Insulten (heftiges Schütteln der Eier) verfolgt wurde, haben gezeigt, dass sich die Befruchtungs- und Theilungsvorgänge in weitgehender Weise variiren lassen. Besonders die Experimente über die Wirkung mechanischer Insulten sind von grosser Bedeutung für die Entwicklung unseres Problems geworden; die Forscher machten nämlich dabei die Beobachtung, dass aus verletzten Eiern ausgetretenes Plasma unter Annahme von Kugelgestalt noch eine gewisse Lebensfähigkeit längere Zeit im Meerwasser bewahrt und dass die Spermatozoen in diese Eitheilstücke ebenso wie in intakte Eier eindringen. Die Versuche (Merogonieversuche) wurden dann durch Boveri, Delage, Rawitz, Winkler und Andere weiter verfolgt und zeigten, dass solche monosperm befruchtete, kernhaltige und kernlose Eifragmente sich zu Zwerglarven von normalem Typus entwickeln.

Winkler hat solche Merogonieversuche am pflanzlichen Ei, nämlich an dem der Meeresalge *Cytosira barbata* ausgeführt. Aus diesen soeben erwähnten Experimenten hat man den Schluss gezogen, dass der Spermakern für sich allein als Furchungskern zu funktionieren vermag und dass bei den Untersuchungsobjekten ein grösserer oder geringerer Plasmaverlust des Eies weder dessen Entwicklungsfähigkeit, noch den normalen Typus der Keimung zu beeinflussen vermag; nach Boveri besitzt noch $\frac{1}{20}$, nach Delage sogar $\frac{1}{87}$ des Seeigeleies die formative Wichtigkeit des ganzen Eies. Letzterem Forscher gelang bei Seeigeln zuerst die Bastardierung bei Eitheilbefruchtung.

Auch nach erfolgter Befruchtung können Eitheilstücke nach den Versuchen von Morgan und Winkler bis zum Beginn der ersten Theilung nochmals befruchtet werden, nach erfolgter Theilung aber gelingt dies nicht mehr.

Ueber den Einfluss von Spermaextrakt, erhalten durch Schütteln von frischem Sperma des Seeigels mit Meerwasser und Filtriren führten Piéri, Dubois und Winkler allerdings zum Theil nicht ganz einwandfreie Versuche aus; sie fanden, dass frische Eizellen in diesem Spermaextrakt einige Theilungen eingingen. Die Vorgänge gehören bereits zu den Erscheinungen der Parthenogenese, welche von hervorragender Bedeutung für unsere Ansicht über das Wesen der Befruchtung sind. Die Parthenogenese, welche beim Vorhandensein von männlichen Geschlechtsorganen das sich ohne Befruchtung entwickelt, kommt sowohl natürlich vor, als auch kann dieselbe durch sehr verschiedene Mittel künstlich hervorgerufen werden; andererseits liegt auch die Möglichkeit und die Wahrscheinlichkeit vor, dass auch Spermatozoen durch geeignete Reize zur Entwicklung gebracht werden können.

Wenn man nun die Frage aufwirft, was ist denn eigentlich der Zweck der Befruchtung, so muss man vor allem beachten, dass es sehr viele Organismen gibt, die sich ohne jeden geschlechtlichen Prozess, und zwar ohne Degenerationserscheinungen fortpflanzen, so dass sich die frühere Ansicht, die Befruchtung die in erster Linie der Fortpflanzung, nicht aufrecht erhalten lässt. Es muss sich also hierbei noch um etwas anderes und, wie wir vermuthen müssen, in erster Linie um dieses andere, und zwar um die Vermischung der beiden sich vereinigenden Zellen und ihrer Eigenschaften selbst handeln. Dies macht uns in erster Linie die Phylogenie der Befruchtung wahrscheinlich, welche alle Uebergänge von der Verschmelzung zweier, äusserlich wenigstens vollständig gleicher Zellen (sog. Gameten) bis zur typischen Befruchtung zeigt. Damit aber bei höheren Organismen eine solche Vermischung zweier Individuen stattfinden kann, müssen sich dieselben in einem dazu geeigneten Zustande befinden, d. h. es muss das ganze Individuum gleichsam in einer Zelle vereinigt sein, was in den Geschlechtszellen der Fall ist; nur ist in den letzteren eine Entwicklungshemmung eingetreten. Aber weder die letztere noch die erstere Eigenschaft sind spezifische Eigen-

ähnlichkeiten der Geschlechtszellen. Denn solche korrelative
 mmungen kommen auch sonst vor und andererseits wissen wir,
 s z. B. bei den Moosen jede einzelne Zelle die Eigenschaft
 itzt, die ganze Pflanze zu regenerieren.

Wir unterscheiden deshalb bei der Befruchtung zweierlei
 gänge:

1. Die Herstellung der Entwicklungsfähigkeit der Eizelle.
2. Die Qualitätenkombination zweier Individuen und definiren
 Phänomen der Befruchtung als die mit Kernvereinigung ver-
 dene Verschmelzung zweier einander fremder Zellen zu einer
 igen, entwicklungsfähigen Zelle. Die Ertheilung der Ent-
 kelungsfähigkeit der Eizelle ist somit nicht der Zweck der Be-
 chtung, vielmehr ist die Unfähigkeit der Eizelle sich zu ent-
 keln die Vorbedingung für die Befruchtung. Der erste Vor-
 g. die Herstellung der Entwicklungsfähigkeit der Eizelle lässt
 von dem zweiten trennen, ein Prozess, den wir als Partheno-
 esis kennen gelernt haben. Bei den Thieren wird die Ent-
 kelungshemmung des Eies durch das im Spermatozoon ent-
 tene, dem Ei fehlende Centrosoma aufgehoben; bei den Pflanzen
 der Mechanismus der Entwicklungshemmung und derjenige der
 lösung derselben jedenfalls vielfach ein anderer als bei den
 ieren. Auch bieten die Angiospermen in der sogenannten
 ppeibefruchtung, wo zwei Kerne in den Embryosack eintreten
 l der eine sich mit dem Eikern, der andere dagegen mit dem
 undären Embryosackkern vereinigt, eine Besonderheit in dem
 fruchtungsvorgang dar.

Was aber der zweite Vorgang bei der Befruchtung, die
 alitätenkombination bezweckt, darüber gehen die Ansichten zur
 t sehr weit auseinander (die einen meinen die Erhaltung der
 t, die anderen die Erzeugung neuer Arten) und ist es hier vor
 em der Komplex der Vererbungserscheinungen, welcher trotz
 : vielfachen Erklärungsversuche noch eine schwierige Aufgabe
 : die naturwissenschaftliche Forschung darstellt, deren Lösung
 less wohl vor allem die Kenntniss der Konstitution des so kom-
 zirt zusammengesetzten Eiweissmoleküls voraussetzt.

An der sich hieran anschliessenden Besprechung betheiligten
 ch die Herren Ammon, Engler, Klein, Neumann,
 üsslin, Ziegler, sowie der Vortragende.

580. Sitzung am 16. Mai 1902.

Mitglieder-Hauptversammlung.

Vorsitzender: Herr Geheimerath Engler. Anwesend 75 Mitglieder.

Neu angemeldete Mitglieder: die Herren Professor Benoit, Hauptlehrer Kneucker, Privatdozent Dr. Muth.

Vor Eintritt in die Mitglieder-Hauptversammlung theilte der Vorsitzende ein Schreiben Seiner Königlichen Hoheit des Grossherzogs mit, worin dieser in huldvollen Worten für die Ueberreichung der Festschrift (576. Sitzung) dankt, sodann überreichte er Herrn Hofrath Dr. Meidinger, der volle 33 Jahre das Amt eines Sekretärs geführt habe, und dieses nun mit Rücksicht auf seine Alters- und Gesundheitsverhältnisse niederlegen wolle, das künstlerisch ausgestattete Diplom als Ehrenmitglied mit einer Ansprache, in welcher die hohen Verdienste Meidinger's um das Vereinsleben hervorgehoben und der Dank dafür zum Ausdruck gebracht wurde.

Der Vorsitzende eröffnete hierauf die Mitglieder-Hauptversammlung, wobei er bemerkte, dass der Kassier durch ein Familienfest verhindert sei, den üblichen Kassenbericht zu erstatten. Der Sekretär des Vereins verlas hierauf den Bericht über die Thätigkeit des Vereins im abgelaufenen Vereinsjahr. Als neuer Sekretär wurde Herr Professor Dr. Futterer in Vorschlag gebracht und von der Versammlung durch Zuruf gewählt.

Hierauf hielt Herr Professor Dr. Futterer einen Vortrag über „Die jüngsten Vorgänge auf den kleinen Antillen und ihre allgemeine Bedeutung“. Könnte man das Antlitz der Erde vom Mond aus betrachten und eine Umdrehung derselben verfolgen, so würden vor allem die eigenthümlichen Züge auffallen, welche durch die Begrenzungen von Meer und Festland gebildet werden. Man erkennt, dass die Hauptfesten der verschiedenen Kontinente sich nördlich vom Aequator in die Breite ausdehnen, und nach Süden zuspitzen, so dass auf der südlichen Halbkugel die oceanischen Wasser weitaus vorherrschen.

Betrachtet man die Erdtheile genauer, so zeigt sich, dass Südamerika in seiner Hauptmasse etwas gegen Osten verlegt ist gegenüber demselben Areal in Nordamerika; beide trennt ein tief zwischen die Kontinente eindringendes Meer, der Mexikanische Golf. Dieselbe Rolle spielt das Mittelmeer zwischen Europa und Afrika und auch weiter im Osten besteht ein ähnliches Verhältniss zwischen Indochina und der australischen Feste.

Diese „Mittel“-Meer-Regionen in der alten wie in der neuen Welt sind im geologischen Sinne Einbruchsgebiete, die in jüngeren Perioden der Erdgeschichte entstanden sind und deren Bewegungen sich heute noch andauern.

Schon in jener geologischen Vorzeit waren diese Verschiebungen grosser Landtheile von enormen Eruptionen feuerflüssiger Massen aus dem Erdinnern begleitet, die auf den durch die Einbrüche entstandenen Spalten in der Erdrinde emporgepresst wurden.

Jene Gebiete sind von jeher von den unterirdischen Gewalten als Lieblingsplätze für Ausbrüche ausgewählt worden und die stätliche Zahl der tertiären und noch heutigen Vulkane in Amerika, auf den Antillen, im Mittelmeer und im fernen Osten der Sunda-Strasse reden eine deutliche Sprache.

Die zahlreichen und ausführlichen Berichte, welche die Tagesblätter brachten, ermöglichten es, einen ziemlich vollständigen Bericht über die Gesamterscheinung der vulkanischen Vorgänge auf den Antillen zu geben und noch einige theoretische Bemerkungen daran zu knüpfen.

Schliesslich machte Herr Professor Rehbock noch eine Mittheilung über das neuerdings konstatierte Vorkommen von Stapercha in den deutschen Kolonien.

Abhandlungen.



H. Grahn.

Franz Grashof

von

E. Brauer

Grossh. Bad. Hofrath und Professor der theoretischen Maschinenlehre.

Franz Grashof wurde am 11. Juli 1826 zu Düsseldorf als ältester Sohn des Oberlehrers Karl Grashof geboren.

Bis zum 15. Jahr besuchte er das Gymnasium seiner Vaterstadt, arbeitete hierauf, da er zu einem technischen Beruf bestimmt war, einige Zeit in einer Schlosserwerkstätte und bereitete sich dann, theils durch Privatunterricht, theils durch den Besuch der Gewerbeschule zu Hagen und der Düsseldorfer Realschule auf das Studium des Hüttenfaches vor. Im Oktober 1844 bezog er das von der Stadt gegründete Gewerbeinstitut zu Berlin, unterbrach aber seine Studien, um 1847 bis 1848 als Einjährig-Freiwilliger beim 7. Jägerbataillon in Düsseldorf zu dienen. Während dieser Zeit reifte in ihm der Entschluss, sich dem Dienst bei der neu erstehenden Flotte zu widmen. „Eine alte Jugendidee, die ihn zur See trieb, hatte“, wie es in einem Briefe seines Vaters heisst, „durch die Zeitumstände neue Nahrung gewonnen, und er glaubte als Seeoffizier in Vaterland seine Dienste dauernd und angemessen widmen zu können.“ Da ihm das Kriegsministerium die Bedingung stellte, vor einige Reisen als Matrose machen zu müssen, so trat er im März 1849 eine Seereise als Volontär auf dem Hamburger Dampfschiff Esmeralda an, welches nach Bombay bestimmt war und nach 1 bis 1½ Jahr zurückkehren sollte. Unterwegs erhielt das Schiff jedoch von seinem Rheder Herz neue Aufträge, durch welche die Reise auf fast 3 Jahre ausgedehnt wurde. Die Fahrt ging um Afrika herum, dessen Südküste in Port Elizabeth anlaufen wurde, sodann nach Maskat und Buschir im Persischen Meerbusen und über Bombay nach Batavia auf Java. Von hier kehrte das Schiff noch zweimal zum Persischen Golf und zurück nach Java. Hier fand es den Auftrag, nach Van-Diemensland zu gehen, um Ladung nach St. Franzisko zu nehmen. Das Geschäft wurde jedoch vereitelt, und das Schiff kehrte nun längs der

Ostküste von Australien durch die Torresstrasse über Java zu nach Hamburg, wo es kurz vor Weihnachten 1851 eintraf. lange Ausdehnung der Reise war für Grashof besonders des unangenehm, weil er sehr bald zu der Einsicht kam, dass Beruf des Seemanns seiner Natur weniger zusagte, als er ge hatte. Schon in einem Brief vom 8. Juli 1849 gibt er den schluss zu erkennen, nicht dabei zu bleiben. Obgleich er der Seekrankheit nicht zu leiden hatte, auch die körperli Anstrengungen sowie die Gesellschaft roher Matrosen ertr lernte, so fühlte er sich durch Kurzsichtigkeit dauernd gehem da seine Hoffnung, dieselbe werde sich auf See bessern, ni Erfüllung ging und der Gebrauch einer Brille ihm, wenig anfangs, unmöglich erschien, denn, wie er selbst schreibt, Steuermann oder ein Kapitän, der einer Brille bedarf, um einem Ende des Schiffes nach dem andern oder in die Mastsp hinauf zu sehen, würde dem Schiffsvolk ein Gegenstand Spottes sein und aller Achtung entbehren, abgesehen davon, die Sicherheit des Schiffes und der Mannschaft nicht von ei so gebrechlichen Werkzeug abhängig sein darf“. Später ha sich und seine Umgebung an den Gebrauch der Brille dem gewöhnt, und er würde wohl auch mit derselben ein tücht Seemann geworden sein. Seine Enttäuschung hatte jedoch 1 andere Gründe. Er schreibt: „Aber meine Kurzsichtigkeit es nicht allein, die das Bedenken in mir erregte, ob ich c auch wirklich zu einem tüchtigen und vollkommenen Seem geschickt sei. Da ich mich beständig aufmerksam, und wie glaube, unparteiisch und ohne Vorurtheil zu beobachten pf so musste ich gar bald die Bemerkung machen, dass der re praktische Blick und Griff und ein wahres Interesse an pra schen Arbeiten, welches alles unentbehrliche Eigenschaften e Seemanns sind, mir abgeht. Seid versichert, dass ich nicht e flüchtig oder verzagt gemacht durch mein anfängliches M geschick mir das bloss in den Kopf gesetzt habe; nein, ich h viele Anstrengungen gemacht und mich noch bis vor nicht la Zeit zu überreden gesucht, dass bei eiserner Ausdauer und ei festen Willen sich alles das erreichen lasse. Doch endlich bin zu der Ueberzeugung gekommen, dass die Willenskraft allein ni so allmächtig ist, wie ich früher wohl geglaubt hatte, und d natürliche Anlagen und lange Gewohnheit, in vielen Fällen wer

ens, sie aufwiegen. Jetzt weiss ich, dass ich zu einer praktischen Beschäftigung entweder von Natur nicht bestimmt, oder doch, wenn man an eine solche natürliche Anlage und Bestimmung nicht glauben will, durch die lange Gewohnheit des mit dieser Neigung und einigem Erfolg betriebenen Studiums untauglich geworden bin. Und ein vorzugsweise praktisches Leben ist das des Seemanns durchaus. Als ich mich ihm bestimmte, hatte ich geträumt von grossartigen Anwendungen und Erweiterungen meiner Kenntnisse in der Mathematik, den Naturwissenschaften und der Mechanik, von wissenschaftlichen Forschungen in dem Kennenlernen entfernter Länder, deren Erzeugnisse ich als Bewohner, kurz, ich dachte, wenigstens einst als Offizier oder Kapitän, so recht meiner Vorliebe für die Erforschung der Natur leben zu können. Aber wie sehr bin ich enttäuscht worden! Wie kümmerlich sind die vielen Anwendungen der Mathematik auf ein durch eine Menge Hilfstabellen ganz mechanisch gemachtes Rechnen zusammengeschrumpft, wie sehr die Beobachtungen der Natur auf ein bescheidenes Maass zurückgeführt worden! Die See bietet unstreitig viel Interessantes auch dem Naturforscher, doch reicher, mannichfaltiger und lehrreicher offenbart sich die Natur auf dem Lande. Die See ist unheimlicher, sagt man. Zuweilen, ja; aber das ist mehr Sache des Gefühls als ein Gegenstand für die Untersuchung. Und — sehr muss solche wissenschaftliche Untersuchung und Beschäftigung überhaupt in den Hintergrund treten gegen die Aufsichtung des Schiffes und seines Laufes zu Wasser und gegen die Wahrnehmung des Handels bei Land! Als Passagier und ohne die Freiheit, nach Belieben in das Land einzudringen, sobald das Schiff geankert hat, einige Seefahrten zu machen, das ist für den Naturforscher gewiss eine höchst wünschenswerthe und ergiebige Unternehmung; der Kapitän des Kauffahrteischiffes aber ist an sein Schiff und seinen Handel, der des Kriegsschiffes an diese oder jene Instruktionen gefesselt, und selten ist es, dass beide einmal weiter als höchstens einen Spazierritt weit in das Innere des Landes eindringen können. — Ihr seht also, dass ich diese Seefahrt als einen missglückten Versuch betrachte und bei dem ich nicht bleiben will. Eine Zeit lang, während ich noch darüber mit mir selbst im Kampfe lag, sagte ich mir, dass ich nicht da, da ich einmal den Entschluss gefasst und die Ausführung

begonnen hätte, auch dabei bleiben müsse, um mich nicht läch-
 lich zu machen. Ich glaubte mich schämen zu müssen, wenn
 nach Jahr und Tag in die Heimath zurückgekehrt, um hi-
 dem warmen Ofen zu bleiben, nachdem ich früher so zuversi-
 chert meinen Entschluss in die Welt hinausposaunt hatte. Ist
 solche Scham, so allgemein sie ist (wir haben deren zwei
 Bord, die bloss um ihretwillen bei der ihnen verhassten Seef-
 ausharren), ist dennoch falsch und im Grunde nichts weiter
 die Furcht vor Spötteereien. Wie viele selbst berühmt gewor-
 dene Männer, so sagte ich mir dagegen, haben erst später und
 nach vielen verunglückten Versuchen den Beruf gefunden und ergrif-
 fen, der allein ihnen entsprach; und wäre es nicht thöricht, eine
 kleinliche Furcht die Zufriedenheit eines ganzen Lebens-
 Opfer zu bringen! Dann fiel es mir wieder zentnerschwer
 auf die Seele, dass ich nun schon so lange säe ohne zu ernten,
 dass ich nun bereits so lange Zeit an meiner Ausbildung arbeite
 und noch keinen anderen Platz in der menschlichen Gesellschaft
 zunehmen als den eines Schülers. Und wenn ich nun gar nicht
 wieder diese 1 bis 2 Jahre auf's Neue verloren geben wollte,
 wäre das unverzeihlich, so dachte ich, umsomehr, da doch mein
 Vater ein Recht hätte zu fordern, mich endlich einmal selbst
 unabhängig und seiner Unterstützung unbedürftig zu sehen. Es
 hat mir das viel Kummer gemacht, doch, da ich mich Gott sei Dank
 eines so liebe- und rücksichtsvollen Vaters zu erfreuen habe,
 konnte auch diese Sorge nicht bestimmend für mich sein. — Eine
 andere Frage ist die, was nun beginnen? Darüber bin ich noch
 im ganzen Zweifel: Zum Hüttenfach werde ich nicht zurückkehren
 weil ich überzeugt bin, dass ich auch hierin nichts besonders
 Tüchtiges leisten würde. Ueberhaupt darf ich, so wie ich nun
 erkannt habe, keinen praktischen Beruf erwählen, wenn auch
 das Probiren ein Ende haben und ich mich nicht doch am Ende
 ein verfehltes Leben ohne Befriedigung meines Strebens mit
 selig und freudlos soll hinschleppen sehen. Mein eigentlicher Plan
 vielmehr ist, wie mir meine Kameraden in Berlin so oft ver-
 gepredigt haben, auf dem Lehrstuhl einer Gewerbe- oder Realschule
 zu stehen. Hier ist mir der Mangel des Universitätsbesuches nicht
 im Wege, und hier sind gerade diejenigen Wissenschaften
 bevorzugt, zu welchen ich die meiste Neigung habe. Wenn
 dann die verlorene Zeit anlangt, so lässt sich doch am Ende ge-

unzähligerlei anführen, was hier zu erschöpfen ich nicht versuchen will, wodurch diese Zeit des Seelebens nicht so ganz verloren für mich ist.“

Der Seelenkampf war damit noch nicht zu Ende, denn ein Jahr später, am 18. Juli 1850, schreibt er von der Sunda-Strasse am Ende einer ausführlichen Reisebeschreibung:

„Mein Brief vom vorigen Jahre hat Dir, lieber Vater, eine ziemlich unerfreuliche Schilderung meiner damaligen unruhigen und überspannten Gemüthsverfassung gegeben, und über den entschieden ausgesprochenen Vorsatz, abermals umsatteln zu wollen, hast Du wahrscheinlich auch nicht sehr erbaut gewesen sein. Ich war zu diesem Entschluss gekommen, weil ich mich in meinen Erwartungen von dem Interessanten des Seelebens getäuscht fand, weil ich meinen praktischen Anlagen misstraute und besonders, weil ich, noch von einem übermässigen Ehrgeiz beseelt, die Anforderungen an meine Wirksamkeit in der menschlichen Gesellschaft zu hoch stellte, weil ich noch meinte, durchaus mehr als das gewöhnliche in meinem einstigen Berufe leisten zu müssen. Nichtsdestoweniger überliess ich mich nicht der Gleichgiltigkeit für die gegenwärtige Lage, indem ich wohl einsah, dass ich ohne Interesse und mit Unlust arbeitend meine Lage um Vieles verbessern würde, und dann die lange Dauer dieser Reise erst recht als eine durchaus verlorene Zeit betrachten müsste. Vielmehr gab ich mir fortwährend Mühe, die Praxis der Matrosen zu eigen zu machen; ich nahm, wenigstens bei Tage, regelmässig meinen zweistündigen Stand am Steuerrade ein, was ganz gut ging, sowie Anderes mehr; und je mehr Erfolge ich gewahr wurde, desto mehr vergrösserte sich meine Lust an der Sache. Ich kam ich allmählich zu der Einsicht, dass es mir hauptsächlich an Selbstvertrauen gefehlt hatte; in den Betrachtungen über meine gegenwärtige Lage und meine Zukunft kam ich auf die früheren Entschliessungen wegen meines Berufes zurück und wurde wankend gemacht, und als es mir endlich auch gelang, mein Ehrgeiz Herr zu werden, da war ich mit dem Seelebensleben ausgesöhnt. — Der Ehrgeiz ist für mässig begabte Naturen der böse Feind, welcher die Freuden des Lebens verflüchtigt und die Ruhe der Seele stört, das Gift, welches den Geist trüben und das Blut in beständiger fieberhafter Wallung hält. Ich habe das an mir selbst erfahren. Wie oft, wenn ich mir

gestehen musste, dass meine Anlagen meinem Streben nicht gewachsen waren, hätte ich weinen mögen in meiner Niedergeschlagenheit und der Zerrissenheit meines Gemüths, und doch konnte ich mich nicht losreissen von dem süssen Trau. Hier endlich, wo ich, abgeschlossen von den anspornenden Flüssen der Welt, des politischen und wissenschaftlichen Lebens, meist Handlangerarbeiten verrichtend, in dem kleinen Kreise einiger wenig gebildeten Menschen eine ganz untergeordnete Stellung einnehme, hier endlich sollte ich von dem Rausche Ehrgeizes erwachen und zu einer besonnenen, ruhigen und politischen Lebensanschauung übergehen, wodurch ich, wie ich glaube, auf dem Wege der Weisheit einen guten Schritt vorwärts gemacht habe. Diese Veränderung in meinem Charakter und meinen Ansichten wollte ich bloss kurz andeuten, weil sie in engster Beziehung zu der Entschliessung über meine Zukunft steht, die ich will die Beschaffenheit derselben hier nicht weiter ausführen. Ich bin nun mit dem Seemannsleben zufrieden und will dabei bleiben. — Meine körperliche Verfassung lässt fortwährend nichts zu wünschen übrig; ich erfreue mich der besten Gesundheit, habe eine Hautfarbe, welche derjenigen der Araber und Perser wenig an Dunkelheit nachsteht und bin so breit und kräftig und stark geworden, dass Ihr gewiss Mühe hättet, mich wieder zu erkennen, wenn ich Euch eines Tages in Matrosentracht überraschen würde. Dabei habe ich mir eine durch keine Widerwärtigkeit störende Heiterkeit des Gemüths zu eigen gemacht, wie ich früher nicht gekannt habe. In See freue ich mich der Einsamkeit, welche zu stillen Betrachtungen einladet, bei Land macht es mir Vergnügen, den Charakter und die Sitten der fremdartigen Menschenrassen und verschiedenen Völker zu beobachten; in den Strassen segelnd freue ich mich des Anblicks der herrlichen Gebirge und Wälder, in offener See des Sturmwindes, wenn das Meer zu hohen und langen Wellen aufthürmt, die das Schiff umwerfen oder verschlingen zu wollen scheinen, oder es in seine ganzen Gebälke erdröhnen und erzittern machen, wenn sie gegen den Bug anprallen oder als Sturzsee das Deck überfluthen. Je toller es dann hergeht, desto besser, und es macht mir dabei Vergnügen, recht gelassen zu sein und zu lächeln, wenn andere fluchen und in ihrer Hast sich selbst im Wege sind. Vergnügen macht es mir, in die Anschauungs- und Redeweise der Matrosen

zugehen mit dem Bewusstsein, dadurch bloss zeitweise aus dem eigentlichen Charakter herauszutreten und jeden Augenblick die unfeinen Sitten wieder abschütteln zu können. Wenn mich hier in meinem Treiben beobachten könntet, so würdet Euch nicht wenig über die unerfreuliche Veränderung meiner Sitten verwundern, und gleichwohl sollt Ihr, wenn ich erst meinem Verhältnisse zu diesem Schiffe herausgetreten sein, wenigstens keine unvortheilhafte Aenderung derselben annehmen. Bloss das Branntwein-Trinken und Tabak-Kauen, die beiden gewöhnlichen Untugenden der Seeleute, mag ich nicht nachahmen, weil sie mir zu sehr zuwider sind und Spuren zurücklassen, die nicht jeden Augenblick nach Belieben zu verwischen sind. Die grössten Entbehnungen bei meiner gegenwärtigen Lebensweise sind mir der Mangel an Nachrichten von meiner Familie, die gänzliche Unkenntniss der Zeitgeschichte und der Mangel an klassischer Lektüre. Unser ganzer literarischer Reichthum vornehmlich im Logis besteht in einigen Jahrgängen von Unterhaltungsblättern, woraus ich Sonntags den Matrosen vorzulesen pflege, bis die dieselben aussprechenden Artikel erschöpft waren. In dem gebildeten Umgang und ohne klassische Bücher hat man doch gar zu wenig geistige Anregung, deren der gewöhnliche Mensch bedarf, um nicht abzustumpfen. Was gäbe ich nicht her, wenn ich bloss Goethe hier hätte! — Ueber die Politik bin ich gänzlich in Unwissenheit. Bei unserer Anwesenheit in Surabaja habe ich ein paar Blätter aus Hamburg vom August vorigen Jahres vorgelesen, woraus ich die Beilegung eines abermaligen Aufstandes in Baden und überhaupt soviel ersehen hatte, dass unsere deutsche Einheit fortwährend sehr im Argen lag, dass der Kapitän eines Bremer Schiffes, das wir vor ein paar Tagen vorbeisegelten und anriefen, theilte uns mit, dass Schleswigstein, von den deutschen Mächten verlassen, allein seine Sache zu wechsellichten werde. Das ist alles, was ich von den politischen Ereignissen der letzten 17 Monate weiss.“

Zwei Jahre blieb der junge Seemann ohne Nachricht von seiner Familie. Endlich in Surabaya auf Java erhielt er am 1. März 1851 einen Brief vom Vater, der ihn mit unbeschreiblicher Freude erfüllte. In der Antwort vom 23. März heisst es unter einer Familienangelegenheiten und Politik berührenden Einleitung: Mit Vergnügen habe ich es vernommen, dass Herrn

Druckenmüller's, meines mir gewogenen Lehrers Talent und wissenschaftliches Verdienst so glänzende Anerkennung gefunden. Aus seinem gütigen Anerbieten, mir vermöge seiner jetzigen flussreichen Stellung eine Wirksamkeit eröffnen zu wollen, sie dem in meinem ersten Briefe ausgesprochenen Wunsche irgend entsprechen kann, erkenne ich seine mir stets bewiesene freundschaftliche Gewogenheit, welche mich mit Dankbarkeit erfüllt und zugleich mit innerer Genugthuung über die Anerkennung meiner Befähigung zu einer solchen Stellung, zu der ich mich allerorts trotz der in meinem zweiten Briefe ausgesprochenen Gesinnung immer in unverändertem Masse berufen fühle. Denn jetzt, wo durch Deinen Brief so befriedigende Aussichten eröffnet sind, will ich es nur gestehen, dass mein Entschluss, bei der Fahrt bleibend zu wollen, weit mehr ein Ergebniss der Resignation gewesen ist, hervorgebracht durch das drückende Bewusstsein meines rückenden Alters, durch die Ungewissheit über die häuslichen Verhältnisse, durch die Unwahrscheinlichkeit, in kurzer Zeit eine meinen Wünschen entsprechende Laufbahn ohne Universitätsbesuch eintreten zu können und durch die Scheu vor Nothwendigkeit, in einem solchen Falle als alter Kerl noch die Unterstützung in Anspruch nehmen zu müssen, als dass es irgend welcher inneren Neigung zu dem Seemannsleben bedürfte.“ Aus einem Brief vom 27. Juli erfahren wir, dass der Versuch, das Schiff verlassen und mit einem andern die Heimath anzutreten zu dürfen, erfolglos geblieben ist. So musste Gradow noch die Umseglung Australiens mitmachen, und hatte Gelegenheit, in der englischen Verbrecherkolonie Van-Idemans-Land die Hauptstadt Hobarttown ein wegen seiner Naturschönheiten beneidenswerthes Gefängniss kennen zu lernen. Ueber den Grund aus welchem die Absicht, von dort auf eigene Rechnung eine Ladung Weizen für Californien einzunehmen, aufgegeben werden musste, schreibt er in demselben Briefe: „Ein paar Tage vor unserer Ankunft in Hobarttown war dort die Nachricht von kürzlich bei Sidney entdeckten Goldlagern eingetroffen. Die Verhältnisse des Lebens und des Verkehrs waren durch diese Entdeckung, wie man sich leicht vorstellen kann, in jener bedeutenden Stadt über den Haufen geworfen worden; der Unterschied von Arm und Reich, Vornehm und Gering, Vorgesetzten und Untergebenen hatte aufgehört, weil Alle sich darin gleich wurden.“

im Golde wühlen zu wollen, kurz, die Habsucht und der Neid, aus den Tiefen der menschlichen Seele aufgeschauelt durch den Schimmer des Goldes, veranstalteten in vergrössertem Massstab eine neue Auflage des herzlosen Treibens und der grenzenlosen Verwirrung, wie sie während der ersten Zeit der Goldindustrie in Californien geherrscht haben. Da, wie alle übrigen Geschäfte und Gewerbe auch die Arbeiten des Landmannes unter solchen Umständen darniederlagen, so wurde sehr bald die Nothwendigkeit fühlbar, den Mangel an den nothwendigsten Lebensmitteln durch Zufuhr von aussen her zu ersetzen, und so kam es, dass schon die ersten Nachrichten von den Verhältnissen in Sidney die Kornpreise zu Hobarttown so sehr in die Höhe getrieben hatten, dass bei unserer Ankunft daselbst an eine vortheilhafte Ausführung unserer beabsichtigten Unternehmung nicht mehr zu denken war. Es blieb uns nichts anderes übrig als zurückzugehen wo wir hergekommen waren.“ Am 3. August endlich kann er dem Vater aus Batavia mittheilen, dass das Schiff für Hamburg befrachtet werden und womöglich noch vor Weihnachten die Heimath erreichen soll.

Glücklich ging die Fahrt von Statten, wie denn das Schiff während der ganzen langen Reise von ernstestn Unfällen verschont blieb. Erst drei Jahre später gerieth es in der Nähe der afrikanischen Küste in Brand, doch konnte die Mannschaft durch die Boote gerettet werden.

Mochte auch dem heimkehrenden jungen Manne die zur See verbrachte Zeit theilweise als verloren erscheinen, so wird er vielleicht später anders darüber gedacht haben.

Ostern 1852 ging er wieder nach Berlin, um sich für den Lehrberuf in den technischen Fächern vorzubereiten. Die Jahre des Schwankens und der inneren Kämpfe waren nun überwunden, und bald zeigten sich die ersten Erfolge als Vorboten künftiger Früchte. Schon im nächsten Jahre, während er noch selbst studirte, betraute ihn Druckenmüller mit der Abhaltung einer Vorlesung über angewandte Mechanik, auch erging schon zur selben Zeit die Aufforderung an ihn, für das im Erscheinen begriffene grosse Handbuch der Physik von Karsten, denselben Gegenstand zu bearbeiten. Blieb auch die letztere Arbeit aus unbekannten Gründen unvollendet, so war sie doch die erste Gelegenheit, bei welcher Grashof seine schriftstellerische Thätigkeit erproben konnte.

Im April 1854 legte er die Staatsprüfung für Lehrer an preussischen Provinzialgewerbeschulen ab, und bereits ein halbes Jahr später wurde ihm eine Lehrstelle für Mathematik und Mechanik am Gewerbeinstitut zu Berlin übertragen.

Am 1. Januar 1855 wurde er im Nebenamt Direktor des Königl. Aichungsamtes, und bald sollte ein zweites Nebenamt seine Arbeitskraft in Anspruch nehmen, welches für die fernere Richtung seiner Thätigkeit von grossem Einfluss gewesen ist.

Als am 12. Mai 1856 bei Gelegenheit des zehnjährigen Stiftungsfestes des Vereins „Hütte“ in Alexisbad im Harz junge Ingenieure zusammentraten, um einen „Verein deutscher Ingenieure“ zu gründen, da war es vorzugsweise die Person Grashofs, sein in so kurzer Zeit schon erworbener wissenschaftlicher Ruf, welcher den Begründern zu ihrer jugendlichen Begeisterung das Vertrauen auf die Durchführbarkeit des Unternehmens gewährte, nachdem Grashof das Amt als Geschäftsführer des Vereins übernommen hatte. Und sie hatten sich nicht getäuscht. Nicht nur in den ersten, den schwierigsten Zeiten hat Grashof in unermüdlicher Arbeit die Zeitschrift zur Geltung gebracht, sondern während eines Zeitraums von 34 Jahren bildete er den geistigen Mittelpunkt des Vereins. Es ist natürlich nicht sein Verdienst allein, wenn der Verein die Schwelle des 20. Jahrhunderts mit einem Bestand von 15 000 Mitgliedern überschreiten konnte. Aber sehr sehr sich der Verein seinem langjährigen Direktor verpflichtet fühlte, das hat er bei verschiedenen Gelegenheiten bewiesen, besonders aber nach seinem Tode durch die Errichtung eines Denkmals in Karlsruhe und durch die Stiftung der Grashof-Denkmünze.

Als im April 1863 Redtenbacher starb, war Grashofs Name schon so bekannt und geachtet, dass die Technische Hochschule in Karlsruhe es als ein Glück erkennen musste, ihn neben Hartmann als Nachfolger zu gewinnen. Im Herbst 1863 begann er seine Vorlesungen, in denen er insbesondere Festigkeitslehre, Hydraulik, Wärmetheorie und andere Kapitel der theoretischen Maschinenlehre behandelte. Neben seiner Lehrthätigkeit entwickelte er auch hier, wenngleich er die Redaktion der Zeitschrift niedergelassen hatte, eine umfangreiche schriftstellerische Thätigkeit. Fünf Jahre verwaltete er das Amt des Direktors und 12 Jahre, 1877 bis 1889,

und 1887 bis 1890 war er Mitglied der Ersten Kammer der Landstände, glänzende Beweise für das Vertrauen seines Landesherrn und seiner Kollegen.

Eine vortreffliche Charakteristik Grashof's enthält die Rede seines langjährigen Kollegen, des Geheimen Hofraths Prof. Hart bei Gelegenheit der Einweihung des Grashof-Denkmal's.* Einige Sätze mögen hier Platz finden: „Neue Wegeweisend, auf seine eigenen Bahnen überleitend, trat Grashof hier als Lehrer, als Führer der studirenden Jugend auf. . . . Nicht gering waren allerdings die Anforderungen an die Fassungskraft und geistige Anstrengung der Studirenden. . . . Nicht sowohl rhetorische Ausschmückung, als wunderbare Klarheit, Sicherheit und Präzision des Ausdrucks zeichneten seinen Vortrag in vortheilhaftester Weise aus. Nie konnte sich Grashof entschliessen, etwa mit Rücksicht auf minder Begabte, tiefer herabzusteigen; allezeit war er bestrebt, und bei der überwiegenden Mehrzahl ist es ihm gelungen, seine Zuhörer zu sich empor zu ziehen. . . . Grashof war von zwar ernster, aber durchaus idealer Anlage, rastlos arbeitend, nicht Gefährdung der Gesundheit achtend, auch in bewegter Zeit an den idealen Gütern festhaltend, niemals in ruhelosem Jagen nach Besitz, sondern in einer dem Gemeinwohl förderlichen Thätigkeit die höchste Befriedigung und das innere Glück findend . . . Und bei all diesem, von nie versagendem Erfolge gekrönten unablässigen Wirken und Schaffen, welch ein liebenswürdiges Gebahren, welch ein bescheidenes Auftreten.“

Seit 1882 war Grashof Mitglied der Kaiserlichen Normal-Abrechnungskommission, seit 1887 Mitglied des Kuratoriums der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt. 1860 wurde er Ehrendoktor der Universität Rostock. 1868 erhielt er einen Ruf nach Aachen, und zweimal suchte ihn die Technische Hochschule München zu gewinnen. 1866 wurde er Hofrath, 1874 Geheimer Hofrath, 1877 Geheimerath II. Klasse, 1867 erhielt er das Ritterkreuz I. Klasse vom Zähringer Löwen, 1885 das Kommandeurkreuz II. Klasse, 1892 den Kronenorden II. Klasse mit dem Stern.

Zahlreiche wissenschaftliche Vereine ernannten ihn zum Ehrenmitglied, unter diesen auch der Naturwissenschaftliche Verein Karlsruhe, in welchem er eine lange Reihe von Jahren den

* s. Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure 1896 S. 1499.

Vorsitz führte und in dessen Sitzungen er eine grosse Zahl Vorträgen hielt, deren Inhalt grossentheils in seine literarischen Arbeiten übergegangen ist. Dabei verstand er es vortrefflicher Weise, seine theils recht schwierigen, wissenschaftlich tiefgehenden Gegenstände auch für ein nicht spezialtechnisch, sondern mehr nur allgemein naturwissenschaftlich gebildetes Publikum verständlich und damit in hohem Grade anregend zu gestalten.

Eine Vorstellung über die Vielseitigkeit und die Richtung von Grashof's wissenschaftlichen Studien und Forschungen ist das folgende Inhaltsverzeichniss der in der Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure erschienenen Arbeiten, von denen die meisten noch jetzt zum Studium empfohlen werden können.

Band Seite

I	25	Ueber ein Verfahren zur Bestimmung der Dichtigkeit fester Körper mittels der gewöhnlichen Waage.
	52	Theoretische Untersuchungen über Feuerungsanlagen.
	75	Ueber ein im Prinzip einfaches Verfahren, die Tragfähigkeit eines auf relative Festigkeit in Anspruch genommenen Balkens wesentlich zu vergrössern.
	105	Bestimmung der Gegengewichte in den Triebädern der Lokomotiven. Bearbeitung nach Scheffler.
	120	Ueber den Ausfluss der Luft aus Gefässen und Röhren im Allgemeinen, insbesondere über Versuche Rittingers zur Bestimmung des Coefficienten der Luftreibung an den Wänden einer Windleitung.
	208	Leitende Prinzipien zur Berechnung von Holz- und Eisenkonstruktionen hinsichtlich ihrer statischen Verhältnisse.
	315	Zur Konstruktion von Stufenscheiben.
II	22	Ueber relative Festigkeit mit Rücksicht auf vortheilhafte Unterstützung und Einmauerung der Träger bei konstantem Querschnitt derselben.
III	23	
	45	
	155	
II	57	Kritik von Dr. Zernikows Theorie der Dampfmaschine.
	236	Theorie des Zahnexcentriks.
	307	Ueber die empirische Abhängigkeitsformel zwischen Druck und Volum des gesättigten Wasserdampfes.
III	183	Vortrag über zusammengesetzte Festigkeit.
	234	Ueber den Widerstand von Röhren gegen Zusammendrückung.
	263	Ueber die zum Betrieb von Walzwerken erforderliche Arbeit.
IV	13	Ueber Weisbachs Versuche, den Ausfluss der Luft unter hohem Druck betreffend.
	95	Besprechung von Zeuners Grundzügen der mechanischen Wärmetheorie.

Band	Seite	
IV	227	Ueber die Theorie von Giffard's Dampfstrahlpumpe.
	289	Ueber die Berechnung der Festigkeit von Schraubengewinden.
	292	Theorie der Ericsson'schen calorischen Maschine.
V	130	Angenäherte Theorie der Lenoir'schen Gaskraftmaschine. Freie Bearbeitung nach G. A. Hirn.
VI	158	Besprechung von G. Schmidt's Theorie der Dampfmaschinen.
VII	236	Besprechung von Weisbach's Versuchen über den Stoss isolirter Wasserstrahlen.
	243	
	273	
	335	Ueber die Bewegung der Gase im Beharrungszustande in Röhrenleitungen und Kanälen.
VIII	47	
	101	
VIII	311	
IX	337	Besprechung von Zeuners Werk: „Das Lokomotivblasrohr“.
X	591	Ueber die Organisation von polytechnischen Schulen zu Grunde liegenden Prinzipien.
X	47	
	177	Besprechung von Hagens Theorie der Wasserwellen.
X	45	
	272	Ueber die Pressung des Erdbodens unter dem Ambos eines arbeitenden Dampfhammers.
	431	
	497	Theorie der Zugerzeugung durch Schornsteine.
XI	641	Ueber das Verhältniss der specifischen Wärmen der Luft für konstantes Volum und für konstanten Druck.
XII	161	Ueber die Grundbegriffe und die Terminologie der mechanischen Wärmetheorie.
	201	Zur Organisation polytechnischer Schulen.
	579	Ueber die wissenschaftlichen Prinzipien calorischer Maschinen.
	654	Vortrag.
	289	
XIII	353	Kritische Besprechung von Humphrey's und Abbot's Theorie der Bewegung des Wassers in Flüssen und Kanälen.
	491	

1866 erschien die erste Auflage der Elastizität und Festigkeit, 1878 die zweite Auflage, ein Werk, welches noch unübertroffen ist und viel dazu beigetragen hat, wissenschaftliche Methode in den Maschinenbau einzubürgern.

1870 gab Grashof eine neue Auflage von Redtenbacher's Resultaten für den Maschinenbau heraus mit einem neu hinzugefügten Anhang über die Resultate der mechanischen Wärmetheorie.

In der Zeit von 1873 bis 1890 erschien das grosse dreibändige Werk die Theoretische Maschinenlehre, ein Denkmal deutschen Fleisses und deutscher Gründlichkeit.

Es gibt in der technischen Litteratur manche Schriftsteller, welche mehr gelesen wurden und werden als Grashof, und kann nicht zweifeln, dass dieser selbst genau gewusst hat, er nicht für die grosse Menge schreibt. Um so mehr Anerkennung verdient die Selbstlosigkeit, welche sich in dieser Art literarischer Thätigkeit ausspricht, die sich an einen kleinen auserlesenen Kreis wendet.

In den Grenzen derselben weisen Selbstbeschränkung bewies sich seine Thätigkeit in der Ersten badischen Kammer. In sich gekehrte Natur hatte er wohl ein warmes Empfinden für sein engeres und weiteres Vaterland, indessen die Politik mit ihm in die Oeffentlichkeit sich hervordrängenden parlamentarischen Leben entsprach nicht seinem Sinn. Grashof fehlte deshalb nie, wo es galt, für die Interessen der Hochschule, an der er wirken einzutreten und überhaupt die geistige Entwicklung durch wissenschaftliche Institute und durch Unterrichtsanstalten zu fördern — wie ihn z. B. auch die Frage der Reform unserer Gymnasien auf gemeinschaftlichem Unterbau lebhaft beschäftigte —, dagegen sehen wir ihn bei Fragen der allgemeinen und insbesondere in der nationalen Politik niemals hervortreten. Besonderes Verdienst erwarb er sich durch seine vieljährige Thätigkeit als Referent der Budgetkommission für das Eisenbahnwesen.

Am 28. Dezember 1882 wurde Grashof von einem Schlaganfall betroffen, von welchem er sich zwar so weit erholte, dass er seine Thätigkeit wieder aufnehmen konnte; zu der ursprünglichen Arbeitskraft gelangte er aber nicht wieder. Ein grosser Freund der Natur, in deren stiller Betrachtung er so gerne sich weilte, suchte und fand er, so weit dies noch möglich war, auch jetzt noch auf den Höhen des Schwarzwaldes und der Alpen alljährlich körperliche und geistige Stärkung und Erfrischung. „Auch da war es noch — so schreibt ein befreundeter Kollege mit dem er die Sommerfrische genoss — eine Freude, körperlich zwar schon etwas gebrochenen, geistig aber immer noch frischen und regen Mann auf den Höhen umherwandeln zu sehen, die er so sehr liebte. Wehmuth aber mischt sich in die freudige Erinnerung, wenn ich jetzt des letzten Aufstiegs gedenke den wir von Obstalden aus über die Mürtschenalp zum Murgbach machten, eine fast unverantwortliche Anstrengung für den selbst schwer Leidenden. Doch er wollte hinauf! Oben angelangt

strahlten seine Augen in stiller Begeisterung über der sonn-
 rgoldeten Landschaft; stumm sass er auf einem Felsblock.
 as aber leuchtet plötzlich dort in lichtem Himmelsblau auf
 nkelgrüner Matte? — eine einsame Genziane. Beglückt brach
 die Blume, die letzte auf Bergeshöhen.“ Im Jahr 1891 warf
 die tückische Krankheit ein zweites Mal darnieder, so dass
 abermals seine Thätigkeit einstellen musste, und am
 Oktober 1893 erlöste ihn der Tod von seinen zunehmenden
 iden.

Er war seit 1854 mit Henriette, geborene Nottebohm ver-
 hlt, einer Schwester der zweiten Frau seines Vaters. Ausser
 ser seiner durch seltene Eigenschaften an Geist und Gemüth
 gezeichneten Gattin hinterliess er einen Sohn und eine Tochter,
 hrend eine zweite Tochter ihm im Tode vorangegangen war.
 t seiner Familie, seinen Freunden und Kollegen betrauerte ihn
 deutsche Technik, die in ihm einen ihrer hervorragendsten
 hrer verloren hatte.



H. Hertz

Heinrich Hertz.

Biographische Skizze

von

A. Schleiermacher

Professor der theoretischen Physik.

Nur vier Jahre gehörte Baden der Mann an, dessen Lebens-
i wir hier zur Erinnerung an seinen Aufenthalt in Karlsruhe
i als Denkmal seiner Mitgliedschaft in unserem Naturwissen-
aftlichen Verein zu zeichnen versuchen. In diesen wenigen
hren gelang es ihm, sich unter die ersten aller Physiker ein-
reihen, und so werden diese Zeit wie auch der Ort, wo Hertz
ne glänzenden Untersuchungen durchgeführt, in der Geschichte
Physik immer denkwürdig bleiben.

Heinrich Rudolf Hertz war geboren am 22. Februar 1857
ältester Sohn des Rechtsanwalts, späteren Senators und Vor-
ndes der hamburgischen Justizverwaltung, Dr. Gustav Hertz.
ne hervorragende Begabung trat schon in der Schulzeit hervor.
ichnen und Malen, Arbeiten an Hobel- und Drehbank trieb er
t Lust und Geschick zur Erholung von den Aufgaben der Schule,
der er sich durch eisernen Fleiss und strenge Gewissenhaftig-
t hervorthat. Ein ungewöhnliches Sprachtalent veranlasste
t, neben den Schularbeiten Sanskrit und Arabisch zu treiben,
i mit solchem Erfolg, dass ihm sein Lehrer ernstlich zuredete,
i den Sprachwissenschaften zuzuwenden. Noch in späteren
ren konnte er lange Stellen aus dem Homer und den griechi-
en Tragikern auswendig vortragen. Aber auch in anderen
chern befähigten ihn sein gutes Gedächtniss, seine scharfe Auf-
sung und namentlich ein hohes Pflichtgefühl ausgezeichnetes zu
ten. Weit überragte er seine Mitschüler in der Mathematik und
ständig wagte er sich damals schon an schwierigere Probleme
Astronomie und Physik.

Bei so vielseitiger Begabung und strenger Selbstkritik mag
i die Berufswahl nicht leicht geworden sein. Als er zu Ostern
75 das Johanneum mit dem Reifezeugniss verliess, hatte er
h zunächst für das Ingenieurfach entschieden und arbeitete

während des folgenden Jahres als Volontär bei dem Bau neuen Mainbrücke in Frankfurt. Von Berlin, wo er seiner Militärpflicht im Eisenbahnregiment genügt hatte, wandte er sich Herbst 1877 nach München mit der Absicht, das im Sommer 1876 in Dresden begonnene Studium seines Faches fortzusetzen. Damals aber war er durch das Lesen eines Buches über Wärmetheorie so mächtig ergriffen und gefesselt worden, anders vor die Nothwendigkeit gestellt, nun die bisher mit Vorliebe betriebene Mathematik und Physik bei Seite zu lassen, um Spezialstudien des Ingenieurwesens zu beginnen, dass ihm Erkenntniss aufging, wie er nicht in dem zunächst erwähnten Beruf, sondern nur im Studium der Natur und in der Erforschung ihrer Gesetzmässigkeiten dauernd Befriedigung finden könne. „— ich fühle, wie ich mich den Naturwissenschaften doch ganz und mit Begeisterung widmen könnte und mir auch mit ihnen genug geschähe, während ich doch jetzt einsehe, dass das, was man Ingenieurwissenschaften nennt, mir nicht genügt und daher immer noch andere Beschäftigung suche. Ich hoffe, dass ich mich hierin nicht täusche, denn es wäre eine grosse und verderbliche Selbsttäuschung; aber das weiss ich gewiss, dass mich bei den Naturwissenschaften nicht zurücksehnen würden, den Ingenieurwissenschaften, dass ich aber, wenn ich Ingenieur werde, mich immer nach der Naturwissenschaft sehnen werde und es scheint mir unerträglich, dass sie mir nur dienen, um ein Examen zu machen.“¹ —

Mit Zustimmung seines Vaters liess er sich daher an der Universität als Studirender der Physik immatrikuliren und blieb dort, obwohl ihm die Verhältnisse nicht ganz zusagten, zwei Semester. Seine beiden letzten Studienjahre verbrachte er in Berlin als Schüler von G. Kirchhoff und namentlich von H. Helmholtz.

Hier begann Hertz die Reihe seiner wissenschaftlichen Untersuchungen alsbald mit der Bearbeitung einer von der Fakultät gestellten Preisfrage, wonach untersucht werden sollte, ob bewegte Elektrizität in den Inductionsströmen Trägheit aufweist. Obwohl er nun erst jetzt sein eigentliches Studium aufnahm

¹ Brief an seinen Vater, mitgetheilt in der Einleitung zum I. Bd. der Gesammelten Werke.

und noch vor einem halben Jahre von der Elektrizitätslehre kaum mehr gewusst, als was er seit seiner Schulzeit noch nicht wieder vergessen hatte, gelingt es ihm in weniger als einem Monat, die Schwierigkeiten, die ihm Helmholtz als die hauptsächlichsten bezeichnet hatte, zu überwinden und in raschem Lauf mit seiner Lösung den Preis zu erringen. Bald nach der Promotion, die auf Grund einer umfangreichen theoretischen Untersuchung (Ueber die Induction in rotirenden Kugeln) erfolgt war, wählte ihn Helmholtz im Oktober 1880 zum Assistenten, eine Anerkennung seines Strebens, die ihn mit hoher Freude erfüllte. Neben den Aufgaben dieser Stellung fand er Zeit genug, sich mit mannigfaltigen Untersuchungen so intensiv zu beschäftigen, dass er manchmal drei verschiedene Arbeiten, theils theoretischer, theils experimenteller Natur, gleichzeitig förderte. Sein Interesse war dem Gebiet der Elektrizität, aber nicht ausschliesslich, zugewendet, daneben behandelte er die schwierige Frage der Verdunstung und einige Probleme der Elastizitätstheorie. Auf Helmholtz' Rath habilitirte er sich Ostern 1883 mit einer Arbeit über Glimmentladung in Kiel, wo ihm ein Lehrauftrag für theoretische Physik in Aussicht stand. Auf experimentelles Arbeiten musste er freilich dort verzichten, doch entwickelte er alsbald eine fruchtbare Thätigkeit, indem er neben der Vorbereitung für seine Vorlesungen einige in Berlin begonnene Arbeiten vollendete und neue theoretische Untersuchungen ausführte. So blieb ihm der Aufenthalt in Kiel, wo er manches Mal mit jungen Kollegen die schöne Umgebung in Ausflügen zu Wasser und zu Land durchstreifte, zeitlebens in angenehmster Erinnerung.

Schon in früheren Arbeiten war Hertz in einer wissenschaftlichen Streitfrage thätig gewesen, die, von ausserordentlicher Bedeutung für das Fortschreiten der physikalischen Erkenntniss, auch von Helmholtz mehrfach in theoretischen Untersuchungen behandelt und in einer wichtigen Folgerung zu jener Zeit als Gegenstand einer Preisaufgabe der Berliner Akademie gewählt worden war. Es war die Frage, ob die elektrischen und magnetischen Kräfte unmittelbare Fernwirkungen sind, oder ob sie bedingt sind durch einen besonderen Zustand des zwischen den elektrisirten und magnetisirten Körpern befindlichen Mediums, sich ohne dessen Bethätigung also nicht verbreiten und fortpflanzen können. Im ersten Fall wird die Wirkung irgend einer

Aenderung überall momentan auftreten, im zweiten bedarf jedes Mal einer endlichen Zeit zur Uebertragung. Die zweite Anschauung war hauptsächlich von Faraday im Gegensatz seinen Zeitgenossen aus seinen genialen und originellen Untersuchungen gefolgert und durch viele von ihm neu aufgedeckte Thatsachen gestützt worden. Dann hatte sie Cl. Maxwell eine strengere theoretische Form gebracht und weiter entwickelt. Hiernach ist das Medium, durch dessen Zustandsstörung elektromagnetischen Erscheinungen entstehen, vorzugsweise der den ganzen Weltraum erfüllende und alle ponderablen Körper durchdringende Aether. Gewisse Zustandsstörungen im Aether, die Lichtschwingungen, sind lange bekannt und ihre grosse, aber nicht unendliche Fortpflanzungsgeschwindigkeit gemessen; Maxwell wurde daher auch das Licht als elektromagnetischer Vorgang gedeutet und so viele thatsächliche Beziehungen zwischen Licht und Elektrizität erklärt. Eine andere Folgerung dieser Theorie bildete den Gegenstand jener Preisfrage der Berliner Akademie. Hertz hatte zwar ihre Bearbeitung zunächst nicht unternommen, da sein Scharfblick erkannt hatte, dass eine befriedigende Lösung mit den damals bekannten Hilfsmitteln nicht erreichbar sein würde; aber er behielt doch die Grundfrage dauernd im Auge und veröffentlichte von Kiel aus eine theoretische Arbeit, worin eine ganz neue Seite des Streites aufgewiesen wurde.

Ostern 1885 folgte Hertz, dessen Arbeiten schon allgemein Beachtung gefunden hatten, einer Berufung als Ordinarius an die Technische Hochschule zu Karlsruhe. Hier, im Herbst 1885 war es, wo ihm bei einem Vorlesungsversuch mit den Riess'schen Inductionsspiralen eine Funkenerscheinung den Weg zeigte, auf dem er erst die Lösung der Berliner Preisaufgabe und sehr bald die experimentelle Entscheidung über die Grundfrage finden sollte. Bei jedem wellenartigen, oscillatorischen Vorgang wird die Störung des Gleichgewichtszustandes in der Zeit einer vollständigen Schwingung um die Wellenlänge fortgepflanzt. Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit ist daher das Verhältniss von Wellenlänge zu Schwingungsdauer, und eine endliche Wellenlänge kann nur bestehen bei einer endlichen Fortpflanzungsgeschwindigkeit. Ende 1886 hatte Hertz eine Methode gefunden, um sehr rasche elektrische Schwingungen von genügender Regelmässigkeit zu erzeugen. Wenn die Fortpflanzungsgeschwindigkeit dieser Schwingungen

ndlich war, so war sie jedenfalls ausserordentlich gross und
 rmuthlich gleich der Lichtgeschwindigkeit. Nur bei überaus
 schen Schwingungen konnte man daher Wellenlängen erwarten
 n solcher Kleinheit, dass ihre Beobachtung in den beschränkten
 imen des Laboratoriums möglich erschien. In der That gelang
 Hertz, in der Ausbreitung seiner raschen Schwingungen Wellen-
 ngen zu messen, und da die Schwingungsdauer berechnet wer-
 n konnte, zu erkennen, dass die Wellen sich mit einer end-
 en Geschwindigkeit, die sich gleich der Lichtgeschwindigkeit
 gab, fortpflanzen. So war mit einem Schlag die Entscheidung
 Gunsten der Faraday-Maxwell'schen Theorie ausgefallen. Die
 önung des Werkes bildete eine Arbeit vom Dezember 1888
 er Strahlen elektrischer Kraft, in der die Wesensgleichheit
 r elektrischen Wellen mit den Lichtwellen und damit die letzte
 nsequenz der Theorie von Maxwell erwiesen wird. Den anzie-
 nden Bericht, den Hertz über Geschichte und Gang seiner
 ndeckung in der Einleitung zu seinen „Untersuchungen über
 e Ausbreitung der elektrischen Kraft“ gegeben hat, wird jeder
 ser mit Antheil verfolgen. Leider verbietet der Raum, hier
 ch nur einen Auszug daraus mitzutheilen.

Ueber diese Arbeiten sprach Hertz zum ersten Mal vor einem
 rösseren Kreis in der 368. Sitzung des Naturwissenschaftlichen
 reines, die am 22. Februar 1889 im Hörsaal des physikalischen
 tituts der Technischen Hochschule abgehalten wurde. Ein-
 ch und schlicht wie der Vortrag ist der von Hertz verfasste,
 die Verhandlungen Bd. 11 S. 41 aufgenommene Bericht. Noch
 ir der Ruhm seiner Entdeckungen kaum über den Kreis der
 chgenossen hinausgewachsen. Die beweisenden Versuche konnten
 r im völlig verdunkelten Zimmer durch mühsames und anstrengen-
 s Beobachten eines kaum 1/100 mm langen Fünkchens angestellt,
 em grösseren Kreis also überzeugend nicht demonstriert werden.
 ch waren die Hilfsmittel, die man heute bei der drahtlosen
 egraphie benutzt, um Hertz'sche Wellen auf hunderte von
 ilometern hin wirksam zu machen, nicht zur Hand. Immerhin
 tten sich zu dem Vortrag im Naturwissenschaftlichen Verein
 ppelt so viel Hörer als sonst eingefunden, und die Worte der
 wundernden Anerkennung und des Dankes, die am Schluss der
 zung der Vorsitzende (Wiener) an Hertz richtete, fanden bei
 llen lauten Wiederhall.

Zur Erinnerung an jenen für den Verein so denkwürdigen Abend sei auf die beiden hier beigelegten Abbildungen Herscher Apparate, bezeichnend für Anfang und Ende der Karlsruhe Epoche, verwiesen. Das erste Bild, nach einer von Hertz selbst aufgenommenen Photographie, zeigt eine Aufstellung, mit der ihm gelungen war, sehr schnelle Schwingungen zu erzeugen, die sie als Schwingungen nachzuweisen durch die Fähigkeit benachbarten, auf ihre Schwingungszahl abgestimmten Kreislagen Resonanz hervorzurufen. Man bemerkt das noch aus Eisenlorenz Zeit stammende Rühmkorff'sche Inductorium, das zur Speisung des die Wellen erregenden primären Leiters dient. Dieser besteht aus einem in der Mitte durch die Funkenstrecke unterbrochenen Draht, der an seinen Enden die beiden grossen Kugeln aus Zinnblech trägt. Auf dem davor stehenden Tisch ist der Resonanzkreis in Gestalt zweier rechteckig gebogener, von Siegellackstützen getragener Kupferdrähte aufgebaut. Das Nähere über die Anordnung findet sich in der ersten von Hertz über elektrische Schwingungen veröffentlichten Abhandlung.¹

Die zweite Abbildung möchten wir uns gestatten mit Hertz eigenen Worten zu erläutern und so zugleich den kurzen Bericht in den Verhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins vervollständigen. In einem Vortrag, ausgezeichnet durch Inhalt und Form, wie auch durch den Kreis der begeisterten Zuhörer, den Hertz am 20. September 1889 versammelten deutschen Naturforscher und Aerzte sprach Hertz über seine Entdeckungen. Nachdem er seine ersten Versuche erwähnt, wie sie ihn lehrten, dass es elektrische Wellen gibt, die sich transversal schwingend mit Lichtgeschwindigkeit fortpflanzen, gedenkt er seiner berühmten Hohlspiegelversuche mit Worten, die wir um so lieber anführen möchten, als sie uns einen Ausblick eröffnen auf die Ziele, die er für seine weitere Forschung damals noch vor sich sah. Diese Stelle seines Vortrages lautete: „Alle diese Versuche sind im Grunde sehr einfach, aber sie führen doch die wichtigsten Folgerungen mit sich. Sie sind vernichtend für jede Theorie, welche die elektrischen Kräfte als zeitlos den Raum überspringend ansieht. Sie bedeuten einen glänzenden Sieg der Theorie Maxwell's."


¹ Ueber sehr schnelle elektrische Schwingungen. Ausbreitung elektrischer Kraft. S. 50.


well's. Nicht mehr verbindet dieselbe unvermittelt weit entlegene Erscheinungen der Natur. Wem ihre Anschauung über das Wesen des Lichtes vorher nur die mindeste Wahrscheinlichkeit zu haben schien, dem ist es jetzt schwer, sich dieser Anschauung zu erwehren. Insoweit sind wir am Ziele. Aber vielleicht lässt sich hier die Vermittelung der Theorie sogar entbehren. Unsere Versuche bewegten sich schon hart an der Höhe des Passes, welcher nach der Theorie das Gebiet des Lichtes mit dem der Elektrizität verbindet. Es liegt nahe, einige Schritte weiter zu gehen und den Abstieg in das Gebiet der bekannten Optik zu versuchen. Es wird nicht überflüssig sein, die Theorie auszuhalten. Es gibt viele Freunde der Natur, welche sich für das Wesen des Lichtes interessiren, welche dem Verständnisse einfacher Versuche nicht unzugänglich sind, und welchen gleichwohl die Theorie Maxwell's ein Buch mit sieben Siegeln ist. Aber auch die Oekonomie der Wissenschaft fordert, dass Umwege vermieden werden, wo ein gerader Weg möglich ist. Können wir mit Hilfe elektrischer Wellen unmittelbar die Erscheinungen des Lichtes herstellen, so bedürfen wir keiner Theorie als Vermittlerin; die Verwandtschaft tritt aus den Versuchen selbst hervor. Solche Versuche sind in der That möglich. Wir bringen den Leiter, welcher die Schwingungen erregt, in der Brennnlinie eines sehr grossen Hohlspiegels an. Es werden dadurch die Wellen zusammengehalten, und treten als kräftig dahineilender Strahl aus dem Hohlspiegel aus. Freilich können wir diesen Strahl nicht unmittelbar sehen, noch fühlen; seine Wirkung äussert sich dadurch, dass er Funken in den Leitern erregt, auf welche er trifft. Er wird für unser Auge erst sichtbar, wenn sich dasselbe mit einem unserer Resonatoren bewaffnet. Im Uebrigen ist er ein wahrer Lichtstrahl. Wir können ihn durch Drehung des Spiegels in verschiedene Richtungen senden, wir können durch Aufsuchung des Weges, welchen er nimmt, seine geradlinige Ausbreitung erweisen. Bringen wir leitende Körper in seinen Weg, so lassen dieselben den Strahl nicht hindurch, sie werfen Schatten. Dabei vernichten sie den Strahl aber nicht, sie werfen ihn zurück; wir können den reflektirten Strahl verfolgen und uns überzeugen, dass die Gesetze der Reflexion die der Reflexion des Lichtes sind. Auch brechen können wir den Strahl, in gleicher Weise wie das Licht. Um einen Lichtstrahl zu brechen, leiten

wir ihn durch ein Prisma, er wird dadurch von seinem geraden Wege abgelenkt. Ebenso verfahren wir hier und mit dem gleichen Erfolge. Nur müssen wir hier entsprechend den Dimensionen der Wellen und des Strahles ein sehr grosses Prisma nehmen, wir stellen dasselbe also aus einem billigen Stoffe her, etwa Petroleum oder Asphalt. Endlich aber können wir sogar diejenigen Erscheinungen an unserem Strahle verfolgen, welche man bisher einig und allein am Lichte beobachtet hat, die Polarisationserscheinungen. Durch Einschlebung eines Drahtgitters von geeigneter Struktur in den Weg des Strahles, lassen wir die Funken unseres Resonators aufleuchten oder verlöschen, genau nach den gleichen geometrischen Gesetzmässigkeiten, nach welchen wir das Gesichtsfeld eines Polarisationsapparates durch Einschleben einer Krystallplatte verdunkeln oder erhellen.¹

Soweit die Versuche. Bei Anstellung derselben stehen wir schon ganz und voll im Gebiete der Lehre vom Lichte. Indem wir die Versuche planen, indem wir sie beschreiben, denken wir schon nicht mehr elektrisch, wir denken optisch. Wir sehen nicht mehr in den Leitern Ströme fliessen, Elektrizitäten sich ansammeln, wir sehen nur noch die Wellen in der Luft, wie sie sich kreuzen, wie sie zerfallen, sich vereinigen, sich stärken und schwächen. Von dem Gebiete rein elektrischer Erscheinungen ausgehend, sind wir Schritt vor Schritt zu rein optischen Erscheinungen gelangt. Die Passhöhe ist überschritten; der Weg senkt, ebnet sich wieder. Die Verbindung zwischen Licht und Elektrizität, welche die Theorie ahnte, vermuthete, voraussah, ist hergestellt, den Sinnen fasslich, dem natürlichen Geiste verständlich. Von dem höchsten Punkte den wir erreicht haben, von der Passhöhe selbst, eröffnet sie uns ein weiter Einblick in beide Gebiete. Sie erscheinen uns grösser, als wir sie bisher gekannt. Die Herrschaft der Optik beschränkt sich nicht mehr auf Aetherwellen, welche kleine Bruchtheile des Millimeters messen, sie gewinnt Wellen, deren Länge nach Decimetern, Metern, Kilometern rechnen. Und trotz dieser Vergrösserung erscheint sie uns von hier gesehen nur als ein kleines Anhängsel am Gebiete der Elektrizität. Diese letztere

¹ Alle die genannten Apparate, der sendende und der empfangende Hohlspiegel, das Prisma und das Drahtgitter sind auf unserer Abbildung ungefähr in der Stellung des Prismenversuches, vereinigt.





gewinnt am meisten. Wir erblicken Elektrizität an tausend Orten, wo wir bisher von ihrem Vorhandensein keine sichere Kunde hatten. In jeder Flamme, in jedem leuchtenden Atome sehen wir einen elektrischen Prozess. Auch wenn ein Körper nicht leuchtet, so lange er nur noch Wärme strahlt, ist er der Sitz elektrischer Erregungen. So verbreitet sich das Gebiet der Elektrizität über die ganze Natur. Es rückt uns auch selbst näher, wir erfahren, dass wir in Wahrheit ein elektrisches Organ haben, das Auge. Dies ist der Ausblick nach unten, zum Besonderen. Nicht minder lohnend erscheint von unserem Standpunkte der Ausblick nach oben, zu den hohen Gipfeln, zu den allgemeinen Zielen. Da liegt nahe vor uns die Frage nach den unvermittelten Fernwirkungen überhaupt. Gibt es welche? Von vielen, die wir zu besitzen glaubten, bleibt uns nur eine, die Gravitation. Täuscht uns auch diese? Das Gesetz, nach welchem sie wirkt, macht sie schon verdächtig. In anderer Richtung liegt nicht ferne die Frage nach dem Wesen der Elektrizität. Von hier gesehen verbirgt sie sich hinter der bestimmten Frage nach dem Wesen der elektrischen und magnetischen Kräfte im Raume. Und unmittelbar an diese anschliessend erhebt sich die gewaltige Hauptfrage nach dem Wesen, nach den Eigenschaften des raumerfüllenden Mittels, des Aethers, nach seiner Struktur, seiner Ruhe oder Bewegung, seiner Unendlichkeit oder Begrenztheit. Immer mehr gewinnt es den Anschein, als überrage diese Frage alle übrigen, als müsse die Kenntniss des Aethers uns nicht allein das Wesen der ehemaligen Imponderabilien offenbaren, sondern auch das Wesen der alten Materie selbst und ihrer innersten Eigenschaften, der Schwere und der Trägheit.“¹ —

Dankbar müssen wir hier auch der mancherlei anderen Vorträge gedenken, die Hertz in unserem Verein gehalten hat, so insbesondere des Vortrages vom 24. Juni 1887, als er die von ihm entdeckte Begünstigung der Funkenentladung durch ultraviolette Licht behandelte. Aber auch die Mittheilungen über Beobachtungen und Arbeiten Anderer besaßen durch seine eindringende Auffassung und die Fülle eigener Ideen einen besonderen

¹ Sonderabdruck des Vortrages „Ueber die Beziehungen zwischen Licht und Elektrizität“ im Verlag von Emil Strauss in Bonn.

Reiz, den leider die kurzen Berichte in den Verhandlungen nicht aufbewahren konnten.

Die ungemeine Bedeutung der Hertz'schen Arbeiten über elektrische Schwingungen wurde bald allerwärts anerkannt; seine Kollegen eilten nach Karlsruhe um die entscheidenden Versuche aus der Anschauung kennen zu lernen und die Genialität jungen Gelehrten zu bewundern, dem die grosse Errungenschaft mit so einfachen Hilfsmitteln und in so bescheidenen Räumlichkeiten gelungen war. Nicht nur in Deutschland, auch auswärts, besonders in England, wo ja schon länger die Faraday-Maxwell'sche Theorie zur Herrschaft gelangt war, wurden die Entdeckungen mit Enthusiasmus begrüsst und von Forschern, wie Lodge und die selbst an diesen Fragen gearbeitet, neidlos gewürdigt. Es konnte nicht ausbleiben, dass Hertz nach so ausserordentlichen Erfolgen von Karlsruhe, wo er sich 1886 durch die Verheirathung mit einer Tochter des Geodäten Dr. M. Doll ein glückliches Familienleben gegründet hatte, in einen grösseren Wirkungskreis berufen wurde. Die Universitäten von Berlin, wo Kirchhoff, Entdecker der Spectralanalyse, und Bonn, wo Clausius, einer der Begründer der mechanischen Wärmetheorie, kurz vorher gestorben waren, daneben auch Göttingen, bewarben sich gleichzeitig um ihn. Er entschied sich zum Frühjahr 1889 für Bonn, wo durch die mehr theoretische Richtung von Clausius das physikalische Institut etwas im Rückstand geblieben war, und mit der Reorganisation und Erweiterung neue Arbeit, dann auch bessere Gelegenheit zu experimenteller Forschung als anderswo in Aussicht stand.

An dem neuen Wohnsitz waren Hertz noch einige Jahre fruchtbarer Thätigkeit und wachsenden Ruhmes vergönnt. Neben seinen eigenen Arbeiten und denen von Schülern war ein umfangreicher Briefwechsel über den Gegenstand seiner Entdeckungen zu bewältigen, theils um andere mit Rath zu unterstützen, theils um Einwände zu beantworten. Von allen Seiten häuften sich Ehren und Anerkennung auf ihn, die Akademien von Berlin, München, Wien, Göttingen, Rom, Turin und Bologna wählten ihn zum korrespondirenden Mitglied, die Academie des Sciences in Paris verlieh ihm den Preis La Caze, die Akademien in Wien und Turin den Baumgartner- und den Bressa-Preis, von der italienischen Gesellschaft der Wissenschaften und von der Royal Society in London.

wurden ihm Medaillen zuerkannt. Aber alles dies und noch vieles andere vermochten seiner anspruchslosen Bescheidenheit keinen Abbruch zu thun, wahre Befriedigung fand er nur in neuem Fortschritt der Erkenntniss und, wie er sich einmal ausdrückte, im Alleinsein mit der Natur. Nachdem ihm in einer Experimentaluntersuchung der Nachweis gelungen war, dass die Kathodenstrahlen dünne Metallschichten durchdringen können, wendet er sich in seinem letzten Werk den allgemeinsten und tiefsten Fragen seiner Wissenschaft zu, um in einer neuen Auffassung der Mechanik den Inhalt seiner Naturanschauung niederzulegen. War durch seine Entdeckungen für die elektromagnetischen Kräfte die Annahme einer unvermittelten Fernwirkung für immer beseitigt, so musste folgerichtig auch auf anderen Gebieten das Bestehen solcher abstrakter Kräfte geleugnet werden, insbesondere, wie schon in dem Heidelberger Vortrag angedeutet, bei der allgemeinen Massenanziehung, wo diese Annahme Jahrhunderte lang geherrscht und von wo aus sie auch ihren Eingang in die elektromagnetischen Theorien genommen hatte. Die Kräfte, die die Mechanik zu betrachten hat, werden also nicht nur als Ursache von Bewegungen, sondern stets auch als Wirkung von solchen angesehen, und wo, wie z. B. bei einer scheinbaren Fernwirkung, die verursachende Bewegung der unmittelbaren Beobachtung nicht zugänglich ist, die Hypothese aufgestellt, dass es unsichtbare Massen sind, durch deren verborgene Bewegung die Kräfte veranlasst werden.

Die Klarheit und Konsequenz des hier in vollendeter mathematischer Form entwickelten Systems der Mechanik lassen nicht ahnen, dass es zum Theil in einer Zeit entstanden ist, wo der Verfasser in Arbeit und Beruf schon häufig durch ein qualvolles Leiden gehindert war. Im Herbst 1892 waren bei Hertz Krankheitserscheinungen aufgetreten, die anfänglich als harmloses Zahnleiden betrachtet und behandelt wurden. Nach einem Aufenthalt in Oberitalien fühlte er sich im Frühjahr 1893 soweit gekräftigt, dass er während des Sommersemesters seine Vorlesungen halten konnte. Aber kurz nach einer Erholungskur in Reichenhall traten die Anzeichen einer schmerzhaften Knochenerkrankung von Neuem auf, wiederholte Operationen hatten sie nicht bannen können. Seit November quälten ihn an Heftigkeit mehr und mehr zunehmende Gliederschmerzen und zwangen ihn am

7. Dezember 1893 seine Vorlesungen zu schliessen. In klarem Erkenntniss des unvermeidlich Gewordenen übergab er das Institut der Verwaltung seines Assistenten, sorgte für die Herausgabe seines letzten Werkes und schrieb seinen letzten Willen nieder. Am 1. Januar 1894 trat der erlösende Tod ein.

Tief und allgemein war die Trauer um den Entschlafenen in dem noch nicht 37jährigen betrauerte die Wissenschaft ein Forscher, dessen Name zu allen Zeiten unter den ersten genauen sein wird, und aus dessen Wirken sie sich noch die herrlichen Früchte versprochen hatte. Sein unvergängliches Denkmal hat er sich selbst in den drei Bänden seiner gesammelten Werke gesetzt, die im ersten die Berliner und Kieler Arbeiten, zweiten die meist hier in Karlsruhe entstandenen Untersuchungen über die Ausbreitung der elektrischen Kraft, und im dritten das letzte Vermächtniss, die Prinzipien der Mechanik, enthalten. „Heinrich Hertz hat sich durch seine Entdeckungen einen bleibenden Ruhm in der Wissenschaft gesichert. Sein Andenken wird aber nicht nur durch seine Arbeiten fortleben, auch seine liebenswürdigen Charaktereigenschaften, seine sich immer gleich bleibende Bescheidenheit, die freudige Anerkennung fremden Verdienstes, die treue Dankbarkeit, die er seinen Lehrern bewahrt wird Allen, die ihn kannten, unvergesslich bleiben.“ Das ist das Bild von Hertz, wie es auf die Nachwelt kommen wird, entworfen von seinem grossen Lehrer und Freund, H. von Helmholtz.

Der
dunkle Kathodenraum

VON

Dr. O. Lehmann

Hofrath und Professor der Physik a. d. Techn. Hochschule.

Unter den zahllosen Räthseln, welche die Entladung in verdünnter Luft dem Physiker darbietet, ist das hervorragendste die Frage nach dem Wesen des dunkeln Kathodenraums. Insofern die Gestaltung der mannigfaltigen Lichtgebilde solcher Entladung in innigster Weise mit der Form und Ausdehnung des Dunkelraums zusammenzuhängen scheint, dürfte mit der richtigen Beantwortung jener Frage zugleich die Lösung vieler anderer Probleme gewonnen sein.

Die Kenntniss des dunklen Kathodenraums und des hindernden Einflusses, den er bei grosser Ausdehnung im hohen Vacuum auf die Entladung ausübt, reicht wohl bis in die erste Zeit der Entwicklung des elektrischen Leuchtens zurück, wenn auch erst Hittorf (1869) seine Existenz und fundamentale Bedeutung für die Entladungsvorgänge klar erkannt und beschrieben hat.

In jenen alten Zeiten unterschied man zwischen dem Boyle'schen Vacuum und dem Toricelli'schen Vacuum d. h. dem Vacuum der Kolben- und dem der Quecksilberluftpumpe ¹.

Im Boyle'schen Vacuum erschien an der positiven Elektrode ein davon ausgehender röthlicher Büschel, der „Konusstrahl“, an der Kathode eine Atmosphäre von bläulichem Licht, der „Stern“. ²

¹) Die älteren Kolbenluftpumpen waren natürlich sehr unvollkommen und brachten den Druck gewöhnlich nur auf 2 mm herunter. Eigentliche Quecksilberluftpumpen gab es überhaupt nicht, sondern man evacuirte die Ladungsgefässe, indem man sie als oberen Theil eines Gefässbarometers bildete und durch Auspumpen der Luft aus dem Gefäss des Barometers mit einer gewöhnlichen Kolbenpumpe das Quecksilber bis zu genügender Höhe zum Sinken brachte.

²) Siehe O. L., Elektrische Entladungen, S. 18, Fig. 12 (aus Cavallo, vollständige Abhandlung über die Elektrizität aus dem Englischen, Leipzig 1791, Seite 164). (Vergl. auch J. Cuthbertson, Abhandlung von der Elek-

Das vollkommene Toricelli'sche Vacuum schien nach Untersuchungen von Dr. John Walsh (etwa 1773) und Wil Morgan¹ die Elektrizität überhaupt nicht durchzulassen.

Wurde Luft eingelassen, so vermochte die Elektrizität dazugehen und es zeigte sich zuerst grünliches, dann bläulich und schliesslich purpurfarbiges Phosphoreszenzlicht. Dagegen hatte die Leitungsfähigkeit den höchsten Grad erreicht.

Davy² füllte, um allen Quecksilberdampf zu vermeiden, ein Barometer mit geschmolzenem Zinn und erhielt, ebenso mit Quecksilber, sehr schwaches gelbes Phosphoreszenzlicht. Ein auf —29 Grad abgekühltes Barometer zeigte sich sehr blasses grünes Licht, welches beim Zulassen von Luft, bei den Versuchen von Morgan, durch meergrün in blau purpur überging.

Plücker³ konstatierte 37 Jahre später ebenfalls das Erlöschen des Stromes bei sehr hohem Vacuum und das Auftreten grünen Phosphoreszenzlicht, er spricht auch zuerst von Schichtung des negativen Lichtes.

Beispielsweise äussert er sich gelegentlich⁴: „In unui-

trizität, aus dem Holländischen, Leipzig 1786, S. 82 u. ff.). Eingehendere Untersuchungen wurden erst ausgeführt, als durch Erfindung von Ruhmkorff's Funkeninduktor und Geissler's Quecksilberluftpumpe, sowie Geissler'schen Röhren (vgl. Plücker, Pogg. Ann. 103, 88, 1858) geeignete Mittel zur Beobachtung gegeben waren. Eine Zusammenstellung der Beobachtungen mit Geissler'schen Röhren mit zahlreichen kolorierten Abbildungen findet man in der Schrift von Th. Meyer „Das geschichtliche elektrische Licht“, Bonn, 1858. Eine Andeutung der Glimmlichtstrahlung gibt zuerst De la Rive (Pogg. Ann. 131, 456, 1867) indem er schreibt: „Zwischen einer Kugel als negativer Elektrode und einem Metallring, dessen Centrum die Kugel ist, als positiver erweitert sich die bläuliche Atmosphäre, welche die Kugel umgibt, unter einem Druck von 2 mm bis zu mehreren Centimetern und ihr Umriss ist mit kleinen sehr langen Fasern besetzt, die gleichsam eine Franse bilden.“

¹ William Morgan, Electrical experiments made in order to ascertain the non conducting power of a perfect vacuum (Phil. Trans. 1785). Vgl. auch Faulwetter, Elektrizitätslehre, kurze Grundsätze, Nürnberg I, 1790. Uebrigens glaubten bereits Francis Hawksbee (Phil. Trans. 1705) und S. Gravesande (gest. 1742) festgestellt zu haben, dass ein luftleerer Raum keine elektrische Anziehung und Abstossung stattfindet.

² Davy, Gilb. Ann. 72, 357, 1822.

³ Plücker, Pogg. Ann. 107, 111, 1859.

⁴ Plücker, Pogg. Ann. 103, 92, 1858.

rer Nähe endlich ist die negative Elektrode von einer Hülle verschiedenfarbigen fein geschichteten Lichtes umgeben, welche die Form der Elektrode entspricht. Die feinen Schichten sind unregelmäßig, wenn die Elektrode selbst die Form einer Kugel hat; sie haben cylindrische Form in dem Fall, dass die Elektrode als Hohlzylinder in die Röhre hineinragt¹; und an einer anderen Stelle²: der negative Draht selbst blieb, was überall der Fall ist, fortwährend von der fein geschichteten cylindrischen Lichthülle unverändert umgeben“.

Aus Abbildungen, welche den Abhandlungen Plücker's beigegeben sind, ist zu ersehen, dass er die wesentliche Bedeutung der drei Schichten des negativen Lichtes noch nicht erkannt und die Schichtung mehr als etwas Zufälliges, Nebensächliches betrachtet hat, ebenso wie diejenige des positiven Lichtes, die bekanntlich ebenfalls völlig fehlen kann.

Erst Plücker's ehemaliger Gehilfe und Mitarbeiter Hittorf wurde auf die grundsätzliche Bedeutung dieser nie fehlenden Schichten aufmerksam und seine Untersuchungen waren es, welche im ersten Mal die eigenthümlichen Eigenschaften der schwach leuchtenden negativen Schicht in dem elektrisch durchströmten Gase in ihren Grundzügen klar ermittelt haben. Schon in der ersten Mittheilung² schreibt er: „Das Glimmlicht erscheint auf der Kathode, die es von der Kathode aus durchfluthet, nicht gleichzeitig, sondern besteht bekanntlich aus drei Schichten, welche von der negativen Oberfläche parallel laufen und durch ihre verschiedenen Leuchtkraft erkannt werden. Während die Zahl der Schichten im positiven Lichte nach den Dimensionen und der Gestalt des Behälters der Dichte und Natur des Mediums sehr veränderlich ist, bleibt sie beim negativen Lichte unter denselben Umständen konstant. Ein schmaler, manchmal schwierig wahrnehmbarer Saum umgibt unmittelbar die Kathode. Auf demselben folgt eine dickere, weniger leuchtende und daher durchsichtiger Schicht, die sich wieder von der letzteren hellern und ausgedehntesten bestimmt abhebt. Mit der Verringerung der Gasdichtigkeit wird die Dicke dieser Schichten stetig grösser. Ebenso wächst sie bei derselben Dichte mit der Intensität des Stromes“.

¹ ibid. 102.

² Hittorf, Pogg. Ann. 136, 1, 1869.

Sodann beschreibt Hittorf eine Menge von Versuchen, welchen hervorgeht, dass in der Nähe der Kathode ein eigenthümlicher Widerstand gegen die Entladung auftritt.

Er sagt: „Die Versuche führten zu dem Resultat, dass in der Umgebung der Kathode eigenthümliche Verhältnisse bestehen, welche die Fortpflanzung der Elektrizität in der Weise, wie sie im positiven Lichte vor sich geht, nicht gestatten und diesem Strome den Eintritt in die negative Oberfläche unmöglich machen. Es wird demnach vermuthet werden, dass die Leitung daselbst durch den Vorgang des Glimmens erfolgt.“

In der That bewähren sich die Strahlen des negativen Lichtes in ihrem Verhalten gegen den Magnet . . . als einfache Ströme, die, was ihre Richtung betrifft, in die Kathode aus der Umgebung fliessen“.

Ist das Gefäss nicht weit genug, um die vollkommene Ausdehnung des negativen Glimmlichts zu gestatten, so wird die äusserste hellblauleuchtende Schicht desselben abgeschnitten.¹

Hittorf's eigene Worte sind:

„Ist dies eingetreten, so füllt die mittlere dunklere und sichtbare Schicht des Glimmlichtes die Weite der Röhre aus, die äusserste stärker leuchtende wird nicht mehr wahrgenommen. Statt derselben erscheint rothgelbes positives Licht, das nicht selten geschichtet ist. Es tritt dicht an der Glaswand über die ganze Länge des mit Glimmlicht bedeckten Drahtes auf und nur eine geringe Dicke. Liegt der Draht nicht genau in der Axe der Röhre, so bildet es einen rothgelben Streifen auf der Seite des Drahtes, wo der grössere Abstand von der Glaswand besteht.“

Tritt dieses positive Licht in weiteren Röhren bei grösseren Verdünnungen über der Kathode auf, so ist die Farbe blau und wird zuletzt weiss, wie die des positiven Lichtes überhaupt.

Der Widerstand solcher Röhren ist ausserordentlich hoch und die älteren Beobachtungen über die Unmöglichkeit der Entladung im hohen Vacuum* finden nach Hittorf in

¹ l. c. p. 213.

² Hittorf, l. c. S. 204.

* Siehe S. 36, Anmerk. 1.

Erklärung einfach darin, dass zu enge Gefässe benutzt wurden, in welchen der dunkle Kathodenraum die Wände berührte.

Indess auch schon solange noch negatives Glimmlicht vorhanden ist, beobachtet man deutlich ein Eindringen des positiven Lichtes in dasselbe bis zum Dunkelraum.¹ Hittorf sagt hierüber²:

„Man bemerkt nun sehr deutlich wie das positive Licht nur bis zur mittleren dunklen Schicht des Glimmlichtes sich ausdehnt und ganz scharf am äussern Rand derselben abschneidet.“ . . .

„Sehr schön gibt sich die Thatsache ferner kund in der Lichterscheinung einer cylindrischen Röhre, deren Kathode ein in der Axe liegender Draht ist. Vermehrt man nämlich bei grösserer Verdünnung, etwa durch Verringerung des Widerstandes, die Stromstärke, so verkleinert sich stetig der dunkle Raum zwischen Glimmlicht und positivem Licht, indem letzteres sich ausdehnt. Ist es geschichtet, so vermehren sich seine Schichten und erscheinen bei genügender Stromstärke auch neben dem Kathodenlicht. Sie nehmen hier aber nie den ganzen Querschnitt der Röhre ein, sondern bilden leuchtende Ringe, welche auf der einen Seite von der Glaswand begrenzt sind und auf der andern scharf an der dunkeln negativen Schicht endigen.“³

„Ist der Abstand der Elektroden so klein, dass der positive Draht in diese dunkle Schicht hinein ragt, so bleibt er, so weit er hineinreicht, ganz frei von Licht, während das ausserhalb liegende Stück sich mit einer leuchtenden Hülle umgibt.“

„Bei nahestehenden parallelen Drähten verfolgt das weisse positive Licht nicht den kürzesten Weg zur Kathode, sondern erscheint auf der Seite des positiven Drahtes, welcher von dem negativen abgewendet ist und fluthet, sich von letzterem entfernend, nach den Wandungen des Glases zu der äusseren Schichte des Glimmlichtes.“

Hittorf erhoffte von der weiteren Aufklärung dieses eigen-

¹ Schon v. Waltenhofen (Pogg. Ann. 126, 537, 1865) bemerkte, dass die Verdünnung, bei welcher die Entladung erlischt, von der Form der Elektroden abhängig ist.

² Hittorf, Wied. Ann. 21, 95, 1884.

³ Aehnliche Fälle, welche ich später selbst beobachtete unter Anwendung grosser Stromstärken und weiter Recipienten (wobei die Erscheinung besonders deutlich zum Ausdruck kommt), sind dargestellt in den Figuren O. L. Elektr. Entladungen Tafel 7, Fig. 6, 7, 8 u. 9, ferner Tafel 8, Fig. 5, 7 u. 8.

thümlichen Widerstandes des dunklen Kathodenraums zugl weitere Aufklärung über das Wesen des elektrischen Stromes

„Täusche ich mich nicht“, schreibt er, „so sind diese Verhältnisse äusserst günstig, um uns Schlüsse auf den Vorgang elektrischen Stromes selbst zu gestatten; es ist nicht unmöglich dass die Gase auf unserem Gebiete, wie in der Lehre von Wärme, am leichtesten das Wesen der Erscheinungen erkennen lassen und die moderne Physik von ihren letzten Imponderabilien elektrischen befreien werden.“²

Hittorf's Versuchsergebnisse wurden indess kaum beachtet. Erst die Schriften von William Crookes, dessen Name durch Untersuchungen über die Eigenschaften hoch verdünnter Gase (speziell die Entdeckung der Radiometererscheinungen³, sowie durch Publikationen über Spiritismus⁴ bereits in weiteren Kreisen bekannt geworden war, lenkten die allgemeine Aufmerksamkeit auf jene eigenthümlichen Thatsachen.⁵

War Plücker zu der Ansicht gelangt, das negative Licht bestehe aus Strahlen zerstäubter Elektrodenmaterie, welche der Kathode divergirend nach der umgebenden Glaswand

¹ Hittorf, Pogg. Ann. 136, 223, 1869.

² Schon Davy hatte sich übrigens aus ähnlichen Gründen mit den Gasentladungen im hohen Vacuum befasst. Er äussert sich (Gilb. Ann. 72, 1822), nachdem er auf die dunkeln Gebiete der Korpuskularphilosophie hingewiesen hat: „Es schien mir, dass das Verhalten der Elektricität in dem möglichst leeren Raum, soweit sich ein solcher auf Erden darstellen lässt, mit allen diesen Fragen in inniger Verbindung stehe“ und weiter (l. c. p. 1) „Es scheint nicht unwahrscheinlich zu sein, dass die Theilchen, welche von der abstossenden Kraft der Wärme von der Oberfläche der Körper losgerissen werden, ebenfalls durch die Macht der elektrischen Kräfte entrissen werden und, wenn ihre entgegengesetzten elektrischen Zustände zerstören, leuchtende Erscheinungen in dem leeren von allen anderen Materie freien Raum hervorbringen können.“

³ Crookes, Attract. und Repulsion resulting from radiation, London Phil. Trans. 164, 166, 169 und 170, 1874—79; Repulsion resulting from radiation, London, Roy. Soc. Proc. 25, 1876; Experim. contrib. to the theory of the radiometer, London, Roy. Soc. Proc. 25, 1876.

⁴ Crookes, Researches on the Phenom. of Spiritualism, 1874—76.

⁵ Crookes, Molec. physics in high vacua; Phosphorogenic properties of molec. discharge, London, Phil. Trans. 170, 1879. Illumination of the cathode by molec. pressure etc.; Elektr. insulation and molec. physics in high vacua, London, Roy. Soc. Proc. 28, 1879; On a fourth state of matter, London

hen und von dieser wieder zu der Elektrode zurückkehren ¹, so
 ah Crookes in diesen Erscheinungen die Folge einer eigen-
 tigen Bewegung der Gasmoleküle, welche dadurch ermöglicht
 ist, dass bei den ausserordentlich hohen Verdünnungen der Weg,
 welchen ein Molekül durchlaufen kann, ehe es mit einem andern
 zusammen stösst, verhältnissmässig ausserordentlich gross wird.
 schreibt: ² „Schon längst bin ich der Ansicht gewesen, dass
 die wohlbekannte in Vacuumröhren beobachtete Erscheinung in
 engem Zusammenhange mit der mittleren freien Weglänge
 der Molekeln steht. Untersucht man den negativen Pol beim
 Durchgang der Entladung einer Inductionsrolle durch eine Röhre,
 in welcher die Luft gepumpt worden, so sieht man, dass den-
 selben ein dunkler Raum umgibt. Man findet, dass dieser
 dunkle Raum grösser oder kleiner wird bei Veränderung des
 Grades der Verdünnung der Luft, in derselben Weise wie die
 mittlere freie Weglänge sich verlängert und verkürzt. Wie man
 daher einen mit dem geistigen Auge erkennt, dass sie grösser
 wird, so sieht man bei dem andern mit dem leiblichen Auge die
 Annahme; und wenn das Vacuum unzureichend ist, um solches
 Spiel der Molekeln zu gestatten, bevor sie auf einander stossen, so
 wird der Durchgang der Elektrizität, dass der dunkle Raum auf
 kleine Dimensionen zusammengeschrumpft ist. Daraus schliessen
 wir naturgemäss, dass dieser dunkle Raum die mittlere freie Weg-
 länge der Molekeln des noch übrig gebliebenen Gases ist, eine
 Annahme, die durch das Experiment bestätigt wird.

Die Dicke dieses dunklen Raumes ist das Mass der mittleren
 freien Weglänge zwischen den aufeinander folgenden Zusammen-
 stössen der Molekeln des übrig gebliebenen Gases. Der Ueber-

Phil. Soc. Proc. 30, 1880; -Sur la Matière radiante, Ann. chim. phys., 19,
 1890 (Vortrag in Sheffield.)

Hittorf (Wied. Ann. 7, 607, 1879), bemerkt dazu: „Crookes hat in
 der letzten Zeit einen grossen Theil der Thatfachen, welche ich bezüglich
 des negativen Glimmlichtes in meiner ersten Mittheilung beschrieben habe,
 wiederholt und, ohne meine Arbeit zu nennen, als neu der Königlichen
 Gesellschaft in London und der französischen Akademie vorgelegt (Phil. Mag.
 5. 7. p 57. 1879)“.

¹ Plücker, Pogg. Ann. 113, 251, 1861.

² Crookes, Strahlende Materie oder der 4. Aggregatzustand, deutsch
 von Dr. Heinr. Gretschel Leipzig, Quandt u. Händel 1879, Seite 7.

schuss von Geschwindigkeit, mit welchem die negativ elektrisch gemachten Molekeln von dem erregten Pole zurückfliegen, und die langsamer sich bewegenden Molekeln zurück, sich nach dem Pole hin bewegen. Ein Zusammenstoss findet statt an der Grenze des dunkeln Raumes, wo der leuchtende Raum Zeugniß ablegt von der Intensität der Entladung.

Es ist daher das zurückgebliebene Gas — oder, wie ich lieber zu sagen, das Gas-Residuum innerhalb des dunkeln Raumes in einem Zustande, der ganz verschieden ist von demjenigen Gases, das in einem Gefässe bei einem niedrigen Grade der Verdünnung zurück bleibt.“ . . .

„Bei den Erscheinungen . . . die wir nun untersuchen wo ist der Grad der Entleerung so weit getrieben, dass der dunkle Raum um den negativen Pol sich erweitert hat, bis die ganze Hülle erfüllt. Durch die grosse Verdünnung der mittlere freie Weg so lang geworden, dass die Zusammenstösse in einer gewissen Zeit im Vergleich zu den Vorübergehenden vernachlässigt werden können und dass durchschnittlich der Molekel gestattet ist, ihren eigenen Bewegungen oder Gesetzen ohne Hinderniss zu gehorchen. Der mittlere freie Weg ist in der That den Dimensionen des Gefässes vergleichbar und wir haben nicht mehr mit einem kontinuierlichen Theile der Materie zu thun wie es der Fall sein würde, wenn die Röhren in weniger hohem Grade entleert wären, sondern wir müssen hier die Molekeln individuell betrachten. In diesen stark entleerten Gefässen vermögen die Molekeln des Gasrückstandes mit verhältnissmässig wenigen Zusammenstössen durch die Röhre zu gehen und wenn sie mit ungeheurer Geschwindigkeit vom Pole ausstrahlen, so nehmen sie Eigenschaften an, die so verschieden und so charakteristisch sind, dass die Anwendung des von Faraday entlehnten Ausdruckes „strahlende Materie“ vollständig gerechtfertigt wird.

Beim Studium dieses vierten Zustandes der Materie scheitern wir endlich unter unsern Händen und im Bereich unserer Prüfungen die kleinen untheilbaren Theilchen zu haben, von denen man auf gutem Grunde voraussetzt, dass sie die physikalische Grundlage des Weltalls bilden. Wir haben gesehen, dass in einigen ihrer Eigenschaften die strahlende Materie ebenso materiell ist wie dieser Tisch, während sie in andern Eigenschaften fast den C

akter strahlender Energie annimmt. Wir haben thatsächlich das Grenzgebiet berührt, wo Materie und Kraft ineinander überzugehen scheinen, das Schattenreich zwischen dem Bekannten und Unbekannten, welches für mich immer besondere Reize gehabt hat. Ich denke, dass die grössten wissenschaftlichen Probleme der Zukunft in diesem Grenzlande ihre Lösung finden werden und selbst noch darüber hinaus. Hier, so scheint mir's, liegen die grössten Realitäten“.

I. Einfluss der Gasdichte.

Allenthalben begann man nunmehr mit grösstem Eifer und Interesse die Crookes'schen Versuche zu wiederholen, besonders, da die zweckmässigen und eleganten von Crookes ersonnenen Demonstrationsapparate bald überall käuflich zu haben waren.

Die Vermuthung, die Dicke des dunklen Kathodenraumes solle direkt die molekulare Weglänge dar oder stehe in einfacher Beziehung dazu, fand sich freilich nicht bestätigt.

Schon im Jahr 1883 zeigte Puluj¹, dass dieselbe auch nicht nähernd gleich der mittleren Weglänge der Moleküle ist. Dieselbe sollte z. B. bei 0,06 mm Druck 0,9 mm betragen, wurde aber thatsächlich zu 22 mm bestimmt, bei 1,46 mm Druck müsste sie 0,04 mm sein, war aber in Wirklichkeit 2,5 mm u. s. w. Solche Uebereinstimmung war aber auch nicht zu erwarten, da Crookes, wie aus obigem zu ersehen, annimmt, dass die in Folge elektrischer Kräfte abgestossenen Atome an der Kathode die übrigen hindern heranzukommen, ihre freie Weglänge somit grösser sein muss als die nach den Annahmen der kinetischen Gastheorie berechnete.

Eingehende Versuche hat später Wehnelt² ausgeführt, mit dem Ergebniss, dass zwar mit abnehmendem Druck und wachsender Spannung die dunkeln Kathodenräume zunächst proportional der Abnahme des Druckes wachsen, bei sehr niederem Drucke, dagegen einige Zeit vor dem Eintreten der Funkenentladung, bedeutend schneller, wie dies namentlich die beigegebene

¹ Puluj, Strahlende Elektrodenmaterie, Wien 1883, S. 7 u. ff.

² Wehnelt, Wied. Ann. 65, 511, 1898.

graphische Darstellung der Versuchsergebnisse (l. c. S. 531 Fig. erkennen lässt.

Bald darauf prüfte Ebert¹ den Zusammenhang mit der Dichte bei grösseren Stromstärken bei sechs verschiedene Gasen (O_2 , H_2 , N_2 , CO , CO_2 , Luft). Es ergab sich folgendes Entwicklungsgesetz:

„Nimmt die Verdünnung in gleichem Verhältnisse zu, nimmt auch die Dicke des Dunkelraumes in gleichem Verhältnisse zu“, oder anders ausgedrückt: „Schreitet die Evacuation des Entladungsraumes nach einer geometrischen Reihe fort, wächst auch der Dunkelraum nach einer geometrischen Reihe.“

Nennt man d die Dicke des Druckraumes und p den Druck, so ist im Allgemeinen nicht $d \cdot p$ eine Konstante und die Dicke des Dunkelraumes proportional dem Drucke, sondern

$$d \cdot p^m = \text{konst.}, \text{ wobei } 0 < m \leq 1.$$

Merkwürdiger Weise zeigten alle Kurven einen Knick, und hinter welchem die Konstante m verschiedene Werthe hat.

Eigene Beobachtungen, welche indess nur den Charakter der Vorversuche haben², ergaben bei genügender Stromstärke Zahlenwerthe, welche sich dem Ebert'schen Gesetz einordnen lassen. Grosse Abweichungen zeigten sich dagegen bei sehr geringen Stromstärken.³

2. Einfluss der Stromstärke.

Wie schon erwähnt, war Hittorf⁴ zu dem Ergebniss gekommen, bei gleichbleibender Dichte des Gases wachse die Dicke

¹ Ebert, Wied. Ann. 69, 211, 1899.

² Angestellt mit einem weiten elektrischen Ei von der in Figur 2 Tafel 2 Drude's Ann. Bd. 7 gezeichneten Beschaffenheit und Verwendung. Die Messungen sind ungenau, da das Manometer zwischen Ei und P. eingeschaltet war, anstatt hinter dem Ei, so dass Fehler in der Druckmessung entstehen konnten, wie sie Neesen (Drude's Ann. 7, 693, 1902) beschreibt.

³ Schon Ebert (Wied. Ann. 69. 1899, Seite 202) bemerkt: „Erst wenn man die durch das Entladungsrohr hindurchgehende Stromstärke, so wie sich der Dunkelraum zusammen und behält dann ein bestimmtes Minimum von der Ausdehnung bei verhältnissmässig grossen Stromdichten an der Kathode bei“.

⁴ Hittorf, Pogg. Ann. 136. 213, 1869.

Schichten des negativen Lichtes, also auch die des dunkeln Kathodenraumes, mit steigender Intensität des Stromes.

Dieses in Bezug auf den Dunkelraum unzutreffende Versuchsergebniss Hittorff's mochte wesentlich dazu beigetragen haben, der Crookes'schen Hypothese über die Natur des dunkeln Kathodenraumes weitere Verbreitung zu verschaffen. Denn mit der Stromstärke wächst auch die Spannung; stellt also die Dicke des dunkeln Kathodenraums die freie Weglänge der von der Kathode fortgeschleuderten negativ elektrisirten Theilchen dar, so folgt ohne weiteres, dass dieselbe mit vergrößerter Stromstärke wachsen muss, weil damit die treibende elektrische Kraft wächst, somit auch die von den Molekülen erlangte Geschwindigkeit und die Energie, mit welcher sie die andern Gasmoleküle von der Kathode fortstossen.

Schon Crookes bemerkte nun aber, dass der dunkle Kathodenraum über einer mit Russ bedeckten Stelle der Kathode grösser ist. Berücksichtigt man, dass der Russ ein sehr schlechter Leiter ist, dass somit an den russbedeckten Stellen die Stromstärke jedenfalls kleiner war, so hätte schon hieraus geschlossen werden können, dass zunehmende Stromstärke den Dunkelraum nicht vergrössert, sondern im Gegentheil vermindert.

Eine ähnliche Beobachtung machte auch G. Wiedemann.¹

Er fand, dass bei einer plattenförmigen Kathode das Glimmlicht eine Art Schale bildet, deren convexe Seite der Elektrode zugewendet ist, d. h., dass am Rande der Glimmlichtfläche, wo wie später Wehnelt durch sorgfältige Experimente² nachgewiesen hat, die Stromdichte geringer ist als in der Mitte, umgekehrt die Dicke des Dunkelraums beträchtlich grösseren Werth hat.³

¹ G. Wiedemann, Pogg. Ann. 145, 392, 1872.

² A. Wehnelt, Ueber Strom- und Spannungsmessungen an Kathoden in Entladungsröhren, S. Hirzel, Leipzig 1901. Fig. S. 5.

³ Diese Aufbiegung des Glimmlichts an den Rändern habe ich selbst in zahlreichen andern Fällen beobachtet und durch Figuren zur Anschauung gebracht, z. B. in meinem Buche über elektrische Entladung Tafel 7, Fig. a—f und Tafel 6, Fig. 4. Wird die Stromdichte in der Mitte des Glimmlichts sehr gross, so zeigt sich daselbst pos. Licht, wie Tafel 4, Fig. 4, und Tafel 1, Fig. 2 andeuten. Wächst die Stromdichte noch mehr an, so wird die Dicke des Dunkelraums in der Mitte rasch minimal, da sich daselbst Metaldampf bildet, und die Entladung geht in Bogenentladung über.

Die erste klare Bemerkung über den Zusammenhang Stromstärke und Dicke des Dunkelraums findet sich wohl an genannter Stelle bei Ebert.¹ Es steht dort: „Bei grossen Stromstärken verdichtet sich das ganze Kathodengebilde und die Dicke der zweiten Schicht erreicht ein Minimum, welches dann von der Stromstärke und Spannung innerhalb weiter Grenzen unabhängig ist.“

In besonders auffälliger Weise beobachtete ich¹⁾ die Entladung bei einem grossen elektrischen Ei unter Benutzung eines geladenen Kondensators mit 8 Mikروفarad Kapazität als Elektrizitätsquelle, bei Einschaltung eines Widerstandes von etwa 50 Ohm. In dem Masse, wie mit fortschreitender Entladung die Spannung des Kondensators und damit die Stromstärke sich minderte, hob sich die Glimmlichthülle von der Kathode ab und wanderte gegen die Anode hin, wobei sich die Dicke des Dunkelraumes bis auf etwa 35 cm vergrösserte. Sodann hörte der Durchgang des Stromes auf. Bei einem Luftdruck von 0,195 mm vergrösserte sich der Dunkelraum von 8—19 cm als die Stromstärke von 10,2 auf 0,03 Milliampere abnahm. Bei dem Druck von 0,105 mm vergrösserte sich der Dunkelraum von 5 auf 7 cm während die Stromstärke von 62 auf 0,6 Milliampere fiel. Bei 0,15 mm Druck trat keine Aenderung der Dicke (4 cm) ein, die Stromstärke von 0,3 bis 20,5 Milliampere anstieg.

In ganz unzweideutiger Weise, d. h. unter Umständen, welchen über gleichen Druck und gleiche chemische Beschaffenheit des Gases nicht der geringste Zweifel obwalten konnte, zeigten die Versuche den Zusammenhang zwischen Stromstärke und Dunkelraum. Versuch mit einem durch eine Scheidewand aus Aluminium in zwei durch eine Röhre communizierende Hälften getheilten elektrischen Ei, in dessen Abtheilungen gleichzeitig Ströme

Ferner gehört hierher eine Beobachtung von Wehnelt (Wied. Ann. 511. 1898), welcher zu Folge in weiteren Röhren unter sonst gleichen Verhältnissen der dunkle Raum stets etwas grösser ist als in engeren. In letzteren tritt nämlich, wie schon Hittorf bemerkte, die Entladung bei grösserer Spannung ein und demgemäss ist auch die Stromstärke grössere.

¹ Ebert, Wied. Ann. 69, 202, 1899.

² O. L., Drudes Ann. 7, 4, 1902.

verschiedener Stärke flossen, wobei man die Stromstärken leicht austauschen konnte.¹

Um die gesetzmässige Beziehung zwischen Stromstärke und Dunkelraum aufzufinden, wurde bei dem mehrfach erwähnten runden elektrischen Ei mit Drahtnetzscheidewand eine grössere Zahl Messungen gemacht und deren Resultate graphisch aufgetragen. Der Verlauf der Kurven konnte, da die Messungen den bereits oben erwähnten Ungenauigkeiten behaftet waren, schätzungsweise ermittelt werden. Die Ergebnisse sind in Figuren 1 und 2 dargestellt, von welchen die erstere die Dicke des Dunkelraums an einer kugelförmigen Elektrode (Durchmesser 7 cm), die letztere an dem ebenen Drahtnetz (Durch-




Fig. 1.

messer 32 cm) bei den Drucken 0,01; 0,02; 0,03; 0,04; 0,05 mm ist. Wie man sieht, wächst die Dicke des Dunkelraumes bei dem kleinsten Druck und bei äusserst kleiner Stromstärke ganz verhältnissmässig. Bei grösseren Drucken lassen sich solche kleinen Stromstärken nicht erzielen.

Auch der Einfluss der Temperaturerhöhung lässt deutlich den Einfluss der vergrösserten Stromstärke auf den Dunkelraum erkennen, weil gleichmässige Erwärmung bei konstanter Stromstärke den Dunkelraum nicht beeinflusst. Wurde ähnlich wie bei dem eben angeführten elektrischen Ei eine zum Teil aus Aluminiumfolie bestehende Kathode benutzt, so erschien die Dicke des Dunkelraums über der Aluminiumfolie vermindert, offenbar weil in Folge der Erhitzung der dünnen Folie dort die Verdichtung eine grössere ist.

¹ l. c. Fig. 4.

Insofern der Dunkelraum ein Hinderniss für die Entladung darstellt, bedingt solche Verminderung seiner Dicke durch Temperaturerhöhung ein weiteres Anwachsen der Stromstärke, so




Fig. 2.

der Zustand leicht ein labiler wird und schliesslich, wenn Temperatur bis zur Bildung von Metaldampf an der Elektrode gesteigert hat, Umschlagen in Lichtbogenentladung stattfindet.

¹ Siehe O. L. Elektrische Entladungen S. 241.

Sehr deutlich zeigt sich schliesslich der Einfluss der Stromstärke auf den Dunkelraum bei Einwirkung eines magnetischen Feldes, wobei die Stromdichte an einzelnen Stellen der Kathode ausserordentlich anwächst, nämlich da, wo die magnetischen Kraftlinien die Kathode durchschneiden, während sie an den Stellen, wo die Kraftlinien nur tangiren, sich ausserordentlich vermindert. An den ersteren sieht man die Dicke des Dunkelraumes mit steigender Intensität des Magnetfeldes bis zu minimalen Werthen sinken, während sie an den andern weit über die normale Mass steigt.

3. Einfluss des Magnetismus.

Die Wirkungen des Magnetismus auf die elektrischen Entladungen sind zuerst von Plücker¹⁾ untersucht worden. Er schreibt: „Je mehr meine Beobachtungen sich vervielfältigen, desto mehr scheint mir das negative Licht ein selbständiges, das von dem eigentlichen elektrischen Strome und seinem Lichte keine eigentliche Beziehung hat. Es unterscheidet sich vom positiven Lichte wahrscheinlich dadurch, dass es in sich zurückkehrende Ströme bildet und nicht das Gas, sondern andere ponderable Materien zu Trägern hat“. Das positive Licht dagegen sollte sich nach Plücker's Ansicht wie ein biegsamer Leiter verhalten.

Anderer Ansicht ist Hittorf, welcher Plücker's Untersuchungen fortsetzte. Er äussert sich²⁾:

„Das Laplace'sche Gesetz, welches alle Ströme beherrscht, ist für das positive wie negative Licht in gleicher Weise giltig. Solange der Magnet schwach bleibt, erscheinen auch die Bewegungen, welche beide in der cylindrischen Röhre ausführen, fast gleich; sie werden aber um so verschiedener, je stärker der Magnetismus auftritt. Der Glimmstrahl verhält sich nämlich wie ein unendlich dünner, gradliniger, gewichtloser, steifer Stromfaden, der bloss an dem Ende, welches den negativen Querschnitt berührt, fest bleibt. Mit seinem andern Ende und der ganzen biegsamen Länge folgt er den Kräften, welche zwischen seinen Theilchen und dem Magnet

¹⁾ Plücker, Pogg. Ann. 104, 629, 1858 und 107, 88 u. 111, 1859.

²⁾ Hittorf, Pogg. Ann. 136, 215, 1869.

bestehen, ohne Rücksicht darauf, welche Lage er in Bezug auf die Anode gewinnt, ob er sich von derselben entfernt, oder nähert. Das positive Licht unterhält die Verbindung zwischen den Glimmstrahlen in der jedesmaligen Lage, die sie einnehmen, und der Anode und ist für diese durch den geringen Widerstand, den es in den stark verdünnten Medien besitzt, geeignet. Es erscheint daher als ein der ganzen Länge biegsamer Stromleiter, dessen Enden beide fest sind, und kann nur soweit den magnetischen Kräften folgen, als es diese Bedingung gestattet.“

Von besonderem Interesse ist noch die nachfolgende Bemerkung¹:

„Bildet die Axe des Glimmstrahlenbündels mit der magnetischen Kurve, welche durch den negativen Querschnitt einen rechten Winkel, so gehen die Glimmstrahlen, welche er zur Richtung haben, bei hinreichend starkem Magnete in eine ebene kreisförmige Windung über, welche auf der magnetischen Kurve senkrecht steht; zu beiden Seiten derselben legen sich divergirenden Strahlen als Spiralen an. Es entsteht so eine schöne Regelfläche, die in der Mitte am stärksten leuchtet; deren Querschnitt mit der Annäherung an die Polfläche sich verkleinert, da die Krümmungskraft hier zunimmt“.

Meine eigenen Untersuchungen stehen mit diesen Ergebnissen Hittorf's nicht vollkommen in Uebereinstimmung, wie unten näher dargelegt werden soll.² Zunächst sei nur darauf hingewiesen, dass auch diese Versuchsergebnisse von Hittorf zu Gunsten der Crookes'schen Theorie sprachen, und wohl wesentlich zu deren Verbreitung und weiteren Ausbildung beigetragen haben. Die Ablenkung der Kathodenstrahlen erfolgt nämlich ganz in dem Sinne, in welchem negativ geladene Theilchen gelenkt werden müssen, welche in senkrechter Richtung von der Kathode mit grosser Geschwindigkeit fortgeschleudert werden. Die Wärmewirkung an den Stellen, wo die abgelenkten

¹ Hittorf, Pogg. Ann., 136, 216, 1869.

² Schon Goldstein (Berl. Ber. 1876, 284) kam zu der Ueberzeugung, dass eine Verschiedenheit von positivem und negativem Licht nicht bestehe. Meine Versuche (Drude's Ann. 7, 10, 1902) ergaben, dass keinen festen Ausgangspunkt des Lichtes an der Anode gebe.

nicht abgelenkten Stellen einen festen Körper treffen, sowie die mechanischen Wirkungen¹ sprechen gleichfalls in hohem Masse für die Hypothese.

Aber wie sollten die Gasatome die Ladung der Kathode annehmen, da doch die Gase vollkommene Isolatoren sind?

Denkt man sich einem langen Metalldraht, etwa einer Telegraphenleitung, an einem Ende plötzlich elektrische Spannung mitgeteilt, z. B. durch Berührung mit einem geladenen Konduktor, so wird der dielektrische Spannungszustand, den man sich für einen Moment auch im Draht in der Nähe des Konduktors vorhanden denken kann, dort plötzlich verschwinden (Influenz), der Draht bildet nun eine Verlängerung des Konduktors und der elektrische Zustand breitet sich an seiner Oberfläche aus mit einer Geschwindigkeit, die annähernd gleich der Lichtgeschwindigkeit ist. An Stelle der Energie des verschwundenen dielektrischen Polarisationszustandes tritt im Drahte Wärme-Energie auf.

Denkt man sich den Draht ersetzt durch eine ebenso lange Glasröhre mit angesäuertem Wasser, so breitet sich der elektrische Zustand auch aus, aber nur mit einer Geschwindigkeit, welche gleich der Wanderungsgeschwindigkeit der Ionen ist. Die verschwindende elektrische Energie verwandelt sich in diesem Fall vorwiegend in Energie chemischer Trennung.

Ersetzt man den Draht durch eine Glasröhre mit sehr verdünntem Gas, so schreitet, wie Versuche gezeigt haben,² der elektrische Zustand fort annähernd mit der Geschwindigkeit des Lichtes. Die verschwindende elektrische Energie geht über in Wärme und Strahlung. Elektrolyse (Ausscheidung von Zersetzungsprodukten an den Elektroden) findet nicht statt,

¹ Siehe J. J. Thomson, die Entladung der Elektrizität durch Gase, Leipzig, 1900, Seite 99 u. 100.

² Nach den Versuchen von J. J. Thomson (Proc. Roy. Soc. 49, 84, 1891) schreitet die Entladung von der Anode gegen die Kathode hin, etwa mit der Hälfte der Lichtgeschwindigkeit fort. Aeltere Bestimmungen der Geschwindigkeit der Kathodenstrahlen siehe Wiechert Sitzb. d. phys. ökonom. Ges. z. Königsberg 1897, 7. Jan. u. Beibl. 21, 443, 1897, Willy Wien. Verh. phys. Ges. Berlin, 16, 165, 1897; Des Coudres, Verh. d. phys. Ges., Berlin 14, 85, 1895.

Nach neueren Bestimmungen von Batelli und Stefanini beträgt die Geschwindigkeit der Kathodenstrahlen bei 25 000 Volt 5796 m, bei 120 000 Volt 120 576 m pro Sek.

wohl aber weisen die Existenz eines Entladungsgradienten, so das Auftreten der strahlenden Energie darauf hin, dass Zertrümmerung der Moleküle in elektrische Atome bewirkt wird.¹

Sind es diese, welche ähnlich wie die Ionen bei der Elektrolyse das Fortschreiten der Entladung bedingen, oder verläuft sich nur die Entladung wie bei Metallen, ähnlich einem Riss in einem elastisch gespannten Körper mit jener ungeheuren Geschwindigkeit fort, während die elektrischen Atome sich nur langsam von der Stelle bewegen und zu neuen unelektrischen Molekülen vereinigen? Der Mangel von Zersetzungsprodukten, die Umsetzung der Energie in andere Energieformen, statt in chemische Erscheinungen mit Bestimmtheit auf eine solche grundsätzliche Verschiedenheit von Gasentladung und Elektrolyse hinzuweisen.

Im Gegensatz hierzu erscheint die Crookes'sche Hypothese nur verständlich unter der Annahme, dass auch die Gasentladungen elektrolytischer Natur seien.

Dass die elektrischen Atome, welche der Entladungsprozess hervorgerufen hat, wenigstens theilweise dem Antrieb der Kraft des elektrischen Feldes folgend zu den Elektroden hinwandern und dort Verschiedenheiten hervorrufen², ist verständlich, auch wenn man den Entladungsvorgang selbst nicht als elektrolytischen Prozess betrachtet. In neuerer Zeit haben nun aber verschiedene Untersuchungen, insbesondere von J. J. Thomson wahrscheinlich gemacht, dass bei der Entladung die elektrischen Atome dieselben Elektrizitätsmengen transportieren wie

Bei Verwendung eines Induktoriums entstehen in Folge der abwechselnden Spannung der Partialentladungen nach einander Kathodenstrahlen von verschiedener Geschwindigkeit, welche im magnetischen Felde verschieden stark abgelenkt werden und das von Birkeland gefundene sogenannte magnetische Spektrum der Kathodenstrahlen erzeugen, wenigstens glaubt Strutt (Phil. Mag. (5) 48, 478, 1899) die beobachteten Erscheinungen in dieser Weise erklären zu können.

¹ Siehe O. L. Entladungen, Seite 180.

² Nach Morren (1865) zeigt sich das weisse Phosphoreszenzlicht in 40 Theile Luft, 60 Theile Sauerstoff und eine Spur Schwefelsäureanhydrid enthaltenden nachleuchtenden Geisler'schen Röhren nicht in der die Kathode anhaltenden Kugel, wohl aber sehr stark in der Nähe der Anode.

³ Siehe J. J. Thomson, Phil. Mag. (5), 44, 293, 1897 und Die Entladung der Elektrizität durch Gase, Leipzig 1900, Seite 20, 198 u. s. w.

der Elektrolyse und dass sie sich mit derselben Geschwindigkeit von der Kathode fortbewegen mit der die Entladung von hier aus fortschreitet. Dies würde allerdings für die elektrolitische Natur des Entladungsvorganges sprechen.

Berechnet man nun auf Grund dieser Annahme die Ablenkung, welche die bewegten elektrischen Theilchen in einem gegebenen magnetischen Felde erleiden müssen, so zeigt sich durchaus keine Uebereinstimmung mit den thatsächlichen Verhältnissen. Um solche zu erzielen, muss man die Masse der Ionen nicht gleich der der gewöhnlichen Atome, sondern mindestens 700 mal kleiner setzen, d. h. man muss annehmen, dass durch den Entladungsvorgang kleinere Theilchen von den Atomen abgetrennt werden.

Unabhängig von dieser elektrolytischen Entladungstheorie und früher als dieselbe hat auch schon die gewöhnliche von Faraday begründete Dissociationstheorie ¹ zu derselben Annahme geführt, dass es kleinere elektrische Theilchen als die elektrischen Atome geben müsse, welche durch Zertrümmerung aus den Atomen entstehen, weil nämlich die Entladungserscheinungen im einatomigen Quecksilberdampf und andern einatomigen Metaldämpfen ² ganz dieselben sind wie in gewöhnlicher Luft, so dass man nothwendig eine „Dissociation höherer Ordnung“ (Warburg) d. h. eine Zerspaltung der Atome annehmen muss. Ferner hatten zu derselben Annahme der Existenz frei beweglicher Theilchen (Elektronen) innerhalb der Atome eine Menge neuerer Untersuchungen auf andern Gebieten, insbesondere von H. A. Lorentz (1880) und J. J. Thomson, geführt, bezüglich deren auf die Schriften der Genannten, sowie die Zusammenstellung von Kaufmann hingewiesen werden möge. ³

Kann man nun aber auch auf Grund der Elektronenhypothese

¹ O. L. Entladungen, S. 518, ff.

² Vergl. E. Wiedemann und G. C. Schmidt, Wied, Ann. 57, 456, 1896 und O. L. Entladungen, Seite 278 u. S. 236, Fig. 146. (Letztere zeigt, dass die Entwicklung von Kupferdampf an einer Stelle des dunkeln Kathodenraums dort keine Aenderung hervorbringt, sondern nur grünliche Färbung der Glimmlichthülle an jener Stelle bedingt.)

³ W. Kaufmann, Phys. Zeitschr. 3, 9, 1901.

das magnetische Verhalten der Kathodenstrahlen, so wie es H. H. H. Torf beschrieben hat, im allgemeinen erklären¹, so stösst die Deutung des dunkeln Kathodenraumes auf grosse Schwierigkeiten. Versuche in dieser Richtung sind neuerdings J. Stark² gemacht worden.

Er äussert sich in folgender Weise: „Indem ein Ion, angetrieben von der Kraft des Feldes, dem elektrischen Spannungsfälle, eine Spannungsdifferenz durchläuft, wird elektrische Energie des Feldes an dem Ion in kinetische Energie verwandelt. Die kinetische Energie des im Spannungsfelde fallenden Ions kann indess nicht unbegrenzt anwachsen, da das Ion bei jedem Zusammenstoss wieder Energie abgibt; das Ion kann immer nur seine Weglänge zwischen zwei auf einander folgenden Zusammenstössen Energie in kinetischer Form in sich ansammeln. Das Maximum seiner kinetischen Energie besitzt es immer unmittelbar vor dem Zusammenstoss. Und dieses Maximum ist gleich der dahin freidurchlaufenen Spannungsdifferenz.

Bei der hohen Temperatur, welche die bewegten Ionen annehmen können, ist es selbstverständlich, dass sie Atome und Moleküle zu intensivem Leuchten durch ihren Anschlag erregen.

„Kommen an einer Elektrode von einer Ionisationspartie in das Innere des durchströmten Gases Ionen an, so können sie an der Metalloberfläche mit so grosser kinetischer Energie eintreffen, dass sie dort das Gas durch ihren Stoss ionisieren. Dies ist der Fall der einfachen Grenzionisierung.

Der Fall der einfachen Grenzionisierung kommt lediglich an der Anode vor. Hier nämlich können die negativen Ionen, welche beispielsweise von dem negativen Glimmlicht, der positiven Lichtsäule herkommen oder im Gasinnern durch einen sekundären Ionisator erzeugt wurden, schon nach Durchlaufung einer kleinen Spannungsdifferenz ionisierend wirken, bei welcher die kinetische Energie der positiven Ionen noch lange nicht zur Ionisierung ausreicht.

¹ Aus dem Potentialgefälle an der Kathode und der Masse der Elektronen, welche aber theilweise eine scheinbare, durch die Bildung des magnetischen Feldes bedingt ist, muss sich die Geschwindigkeit der Elektronen berechnen lassen. (Siehe Abraham, Gött. Nachr. Heft 1, 1902.)

² J. Stark, Drudes Ann. 7, 423, 1902.

Umgekehrt kann an der Kathode nicht die von den positiven Ionen frei durchlaufene Spannungsdifferenz behufs einfacher Ionisirung genügend gross werden, ohne dass gleichzeitig, oder noch mehr schon viel früher, auch die kinetische Energie der negativen Ionen zur Ionisirung ausreichend gross wird und so zweite Ionisirung eintritt. . . .

„Von der negativen Glimmschicht gehen positive Ionen aus, durchlaufen den dunkeln Kathodenraum frei, vermöge der hierbeieinommenen grossen kinetischen Energie ionisiren sie an der Kathodenoberfläche in der ersten Kathodenschicht das Gas. Von dieser Ionisierungsartie gehen hinwiederum negative Ionen aus, durchlaufen in entgegengesetzter Richtung den dunkeln Kathodenraum frei und ionisiren in der negativen Glimmschicht vermöge ihrer grossen kinetischen Energie das Gas. . . .

„Der Abstand zwischen Kathode und dem Saum des negativen Glimmlichts, die Dicke des dunkeln Kathodenraums, ist mit Näherung gleich der mittleren freien Weglänge der positiven Ionen unter den gegebenen Verhältnissen“.

Diese Erklärung lässt verstehen, dass der Dunkelraum mit wachsender Stromstärke, d. h. steigender elektrischer Kraft an der Kathode abnehmen muss, auch erscheint die Zunahme der Dicke des Dunkelraums mit abnehmendem Gasdruck verständlich in Folge der vergrösserten mittleren freien Weglänge; das magnetische Verhalten der Strahlen ist aber bedeutend schwieriger zu erklären sein, besonders wenn man als die Existenz eines entgegengesetzt gerichteten positiven Ionenstroms vorausgesetzt wird.

Schon oben wurde angedeutet, dass Hittorf's Ausführungen über das magnetische Verhalten meinen Untersuchungen zufolge nicht ganz zutreffend sein können, speziell soweit sie das Vorhandensein eines von der Anode ausgehenden positiven Stromes annehmen sollten.¹ Beispielsweise wurde eine drahtförmige Kathode

¹ Siehe insbesondere die oben (S. 38) angeführte Stelle, welcher zufolge die Erzeugung der Elektrizität, wie sie im positiven Licht stattfindet, in der Umgebung der Kathode nicht möglich sein soll, im Gegensatz zu der im negativen Glimmen.

Goldstein (Ber. d. Berl. Akad. 1876, 284) äussert sich: „Nachdem er erkannt hatte, dass die Charaktere des negativen Lichtes an jeder beliebigen Stelle der positiven Lichtsäule durch blosse Querschnittsänderung der Entladungsräume sich hervorrufen lassen und dass jede einzelne

einer grossen positiven Platte gegenübergestellt, hinter welcher sich die Pole eines Hufeisenmagneten befanden.¹ Die Glimmlichtstrahlen werden in solchem Falle der Regel gemäss zu einem Pole verbindenden Bogen deformirt, dessen Enden die positive Platte berühren, so dass eigentlich positives Licht überhaupt nicht auftreten könnte; statt dessen sah man aber von allen Punkten dieses blauen Bogens rechtwinklig zu demselben positiven Pole in gekrümmter Bahn zu der Anode sich hinziehen, woraus schönes röthlich leuchtendes Gewölbe hervorging, welches auf einer Seite durch den blauen Bogen begrenzt war. Noch deutlicher tritt der Unterschied hervor bei meinen neueren Versuchen in weiten Gefässen, z. B. in der Anordnung, welche in den Figuren 8 und 9 der mehrfach citirten Abhandlung² dargestellt ist. Während die blauen Glimmlichtstrahlen an den Stellen austreten, wo die magnetischen Kraftlinien die Kathodenfläche schneiden und da verschwinden, wo diese nur tangiren, tritt umgekehrt der positive Lichtstrom da hervor, wo die Kraftlinien tangiren und verschwindet da, wo sie die Oberfläche der Anode durchdringen. Die blauen Glimmlichtstrahlen sind bei genügender Stärke des Magnetfeldes über den Kraftlinien parallel, der scheinbar aus der Anode austretende rothe Lichtstrom ist an allen Stellen senkrecht dazu. Dieses Gesetz findet man immer bestätigt, nur wenn die magnetischen Kraftlinien, wie in den angegebenen Figuren, senkrecht zur Verbindungslinie der Elektroden verlaufen.

positive Schicht nichts ist, als ein modificirter Büschel negativen Lichtes, wurde jener Gegensatz von Kathodenlicht und positivem Licht mir ebenso zweifelhaft, wie schon früher eine grosse Zahl anderer vermeintlicher Gegensätze zwischen beiden, deren Aufhebung mir gelungen war.“

Meine Untersuchungen unterscheiden sich von denjenigen Hittorfs und Goldsteins dadurch, dass sie mit Elektroden von grosser Oberfläche ausgeführt wurden (besonders Kugeln), so dass nicht nur Beobachtung der Ablenkung des Lichtes zwischen den Elektroden, sondern auch die Verschiebung der Ansatzpunkte an denselben möglich war. Bezüglich der negativen Glimmlichtstrahlen ergab sich (Vgl. O. L., Entladungen S. 366), dass eine Verschiebung der Ansatzpunkte nicht eintritt, wohl aber die negativen Strahlen unmöglich werden, für welche der Widerstand zu gross wird.

¹ Siehe O. L. Elektrische Entladungen, S. 365, Fig. 233.

² O. L., Drude's Ann. 7, Tafel 1, 1902.

ndern auch wenn sie dazu parallel oder beliebig geneigt sind, dann, wenn das Magnetfeld nicht wie angenommen homogen sondern seine Richtung in beliebiger Weise vom Orte abhängt. Stets zeigen sich an der kugelförmigen Kathode intensiv leuchtende blaue Glimmstrahlenbündel in der Richtung der Kraftlinien, an der Anode ein heller röthlicher Ring, dessen Ebene zu den durch die Anode verlaufenden Kraftlinien senkrecht steht.

Hittorf hat wohl vollständig recht, wenn er die Glimmstrahlen auffasst als Ströme, die von der Kathode ausgehen und endigen, es ist aber nicht richtig, dass diesem negativen Strom von einem festen Punkte der Anode aus ein positiver entgegenkommt, welcher da mit ihm zusammenfällt, wo die Glimmstrahlen (an der Glaswand) endigen. Das positive Licht ist vielmehr die Fortsetzung des negativen, es geht von allen Punkten der blauen Glimmlichtbündel ausserhalb des dunkeln Raumes aus und endigt an der Anode, indem es, soweit möglich, senkrecht zu den magnetischen Kraftlinien verläuft. Mit andern Worten: Sämmtliche Lichterscheinungen im luftverdünnten Raum werden hervorgerufen durch einen Strom negativer Elektricität, welcher unbekümmert um die Anode der Kathode senkrecht aus der Kathode hervordringt, dessen Kraftlinien aber in einiger Entfernung von der Kathode ausserhalb des dunkeln Raumes an verschiedenen Stellen, da wo die primäre Lichtentwicklung auftritt, plötzlich ihre Richtung ändern und sich der Anode zuwenden.

Dass neben diesem Strom negativer Elektricität noch ein anderer positiver vorhanden sein könnte, dafür lassen sich aus Lichterscheinungen und dem magnetischen Verhalten nicht wenige Anhaltspunkte gewinnen, dieselben sprechen vielmehr durchaus dagegen, da sich alle Erscheinungen vollkommen durch einen negativen Strom erklären und das Austreten eines ähnlich verhaltenden Stromes aus der Anode (besonders im Magnetfeld) Störungen hervorbringen müsste, von welchen nichts zu merken ist.

Bei der Spitzenentladung in freier Luft, zwischen einer negativen Platte und positiven Spitze kann man freilich nicht so sagen, es komme ein negativer Strom aus der Platte und ende sich gegen die Spitze; man wird vielmehr der alten

Faraday'schen Theorie gemäss sagen müssen, dass an Spitze mit steigender Spannung zuerst der Entladungsgrad erreicht wird, weshalb dort Zerreissung der Moleküle oder Atome stattfindet (unter Verbrauch elektrischer Energie d. h. Verschwinden des Polarisationszustandes), und dass alsdann die entstandenen negativen Elektronen oder Ionen gegen die Spitze hin wandern und ihre Elektrizität daselbst abgeben, die positiven dagegen unsichtbarer elektrischer Wind der negativen Platte zu strömen. Dort zunächst eine mehr oder minder dicke Atmosphäre bilden, um nach und nach ihre Elektrizität ebenfalls zu verlieren¹. Der elektrischen Ei ist ein solcher unsichtbarer Konvektionsstrom der Anode aus sicher nicht vorhanden, wohl aber muss an Kathode, von welcher die negativen Ionen fortgeschleudert werden, eine ähnliche Anhäufung der übrig bleibenden positiven Ionen in Form einer die Kathode umgebenden Hülle eintreten, gleichem Grunde, weil diese positiven Ionen ihre Elektrizität langsam an die Kathode abzugeben vermögen².

In dieser Hülle positiv elektrisirter Luft dürfte, wie schon in einer der ersten Arbeiten andeutete³, der Grund der Bildung der negativen Glimmlichthülle, sowie auch des dunklen Kathodenraums zu suchen sein. Für eine solche Hülle schon namentlich auch der verhältnissmässig kleine Betrag der von Goldstein entdeckten Deflexion der Kathodenstrahlen sowie der elektrostatischen Ablenkung der Lenardstrahlen im Felde eines im Vakuum befindlichen Kondensators.

¹ Interessant wäre die Untersuchung des elektrischen Windes, welchen geschichteten Töpler'schen Büschellichtbogen in freier Luft beglei-
(M. Töpler, Wied. Ann. 63, 109, 1897).

² Den Grund der Verschiedenheit kann man in ungleicher Grösse beider Ionen erblicken, wie ich es früher angenommen habe (vergl. C. Elektrizität und Licht, 315, § 176, 1895 und O. L. Elektrische Entladungen S. 172 unten, 1898). Auch die neuere Elektronentheorie macht aus den besprochenen Gründen dieselbe Annahme.

³ O. L. Vortrag b. d. Naturforscherversammlung in Freiburg 1883 Wied. Ann. 22, 305, 1884; ferner Drude's Ann. 6, 661, 1901.

Mebius (Wied. Ann. 59, 695, 1896 und Fortschritte 54 (2), 803, 1896) kam durch Bestimmung des Potentialgefälles im dunkeln Kathodenraum ebenfalls zu der Ansicht, dass das Gas daselbst positiv elektrisch sei und von konstanter elektrischer Dichte. Bei geringerem Drucke zeigte allerdings die innere Kathodenschichte scheinbar negative Ladung.

prechen¹, sodann auch das Fortfallen der Kathodenerscheinungen sowie des räthselhaften Widerstandes an der Kathode, bei durch Induktion erzeugten, in sich zurücklaufenden Entladungen nach Hittorf und J. J. Thomson².

Auf alle Fälle folgt aus diesen Betrachtungen über den Verlauf der Stromlinien, dass eine Brechung derselben an der Grenze Dunkelraums und im negativen Glimmlicht stattfinden muss, die bei einem konstanten Strom, wegen der damit verbundenen Querkreuzung der Stromlinien undenkbar ist. Es gibt zwei Annahmen, welche diese Brechung erklärlich erscheinen lassen, nämlich diejenige, dass es sich um zwei in äusserst raschem Tempo alternirende, von der Anode und der Kathode ausgehende Entladungen handelt — welche aber durch den Nachweis, dass von der Anode keine Strömung ausgeht, hinfällig wird — und die andere, dass die negativen Ströme (oder Entladungen), die von der Kathode ausgehen, in Folge der dieselben umgebenden positiven Luft zunächst eine Bahn verfolgen, welche senkrecht auf der Kathode steht, unabhängig von der Richtung, und nachdem sie unter Lichtentwicklung (durch Zusammenstossen) einen grossen Theil ihrer Energie verloren haben und demnach von der positiven Hülle entkommen sind, schliesslich den von der Anode ausgehenden Kraftlinien folgen und längs diesen verstreuen. Die Lichterscheinungen können bedingt sein, wie ich schon früher angenommen habe, durch die bei Trennung und Vereinigung durch die elektrische Kraft) und Wiedervereinigung positiver und negativer Theilchen auftretenden raschen elektrischen Entladungen³.

¹ Siehe Goldstein, Eine neue Form elektrischer Abstossung; Berlin, 1880 und Lenard, Wied. Ann. 64, 279, 1898.

² Vergl. Hittorf, Wied. Ann. 23, 805, 1884 und O. L. Elektr. Entladungen, S. 48.

³ O. L. Elektrizität und Licht, 331, 1895. Mit der Auffassung, dass das Leuchten veranlassende Strom ausschliesslich von der Kathode zur Anode geht, stimmt auch sehr gut der Versuch von Goldstein mit einer nach gebrochenen Röhre mit seitlichen Ausläufern, wie sie in Figuren 221 und 222, Seite 347 in meinem Buche über Entladungen dargestellt ist.

Ferner stimmt damit die schon früher von Goldstein ausdrücklich ausgesprochene Identität von positivem und negativem Licht, wie sie sich aus der Betrachtung der Uebergangsformen an Gefässverengungen kundgibt. (Siehe O. L. Ent-

4. Einfluss der Elektrodendistanz.

Die gemachte Annahme, die Bildung des dunkeln Kathodenraums beruhe in dem Auftreten einer positiv elektrischen Hülle um die Kathode, lässt es plausibel erscheinen, dass Dunkelraum mit abnehmender Gasdichte wächst, da diese mit wachsender molekularer Weglänge grössere Ausdehnungen nehmen muss.

Sie macht es auch begreiflich, dass sich der Dunkelraum zusammenziehen muss mit wachsender Stromstärke, weil auch die Spannungsdifferenz und somit die von der Kathode auf die positiven Ionen ausgeübte Anziehungskraft wächst. Schwierig einzusehen ist dagegen, warum der Dunkelraum eine scharfe Grenze besitzt und weshalb er sich als grosses Hindernis für den Durchgang des Stromes erweist.

Da die Entladung durch das Potentialgefälle bedingt ist, müsste zur Erklärung der Erscheinungen der genaue Verlauf der Potentialkurve ermittelt werden. Bei der Berechnung wäre zu berücksichtigen, dass sich für jede Stelle des Dunkelraumes das Potential aus 3 Theilen zusammensetzt, dem Beitrag der Ladung der Kathodenoberfläche, dem der positiven und dem der negativen Ionen. Die Glimmlichtgrenze gegen den Dunkelraum dürfte der Ort derjenigen Punkte sein, an welchen die Wirkung der negativen Ionen, über die sich theilweise kompensirenden Wirkungen beider andern Faktoren, so sehr überwiegt, dass dort das Ladungspotentialgefälle erreicht wird, ähnlich wie unmittelbar an der Oberfläche der Kathode, in Folge der dort überwiegenden Wirkung der positiven Ionen.

Was den Widerstand des dunkeln Raumes anbelangt, tritt derselbe, wie schon die Untersuchungen Hittorf's gezeigt haben, besonders hervor bei geringer Elektrodendistanz und

Entladungen 332). Die Tafeln meiner Arbeit in Drude's Ann. 7, 1, 1902 (S. 1) enthalten zahlreiche Beispiele hierzu. Die Figuren 16 und 17 beispielsweise zeigen den Drahtnetzen unmittelbar aufsitzendes negatives Glimmlicht, welches (richtiges Kathodenglimmlicht) durch den dunkeln Trennungsraum von positiven Schichten getrennt ist. Auch gegen den Magneten verhält es sich ganz genau wie negatives Licht. Durch Erweiterung der Poren lassen sich aber alle Uebergänge zu einer Schicht positiven Lichtes herstellen. Dabei nicht, wie bei Fig. 72, das Drahtnetz als Sekundärelektrode funktionierend, zeigt das Fehlen des dunkeln Kathodenraums. (Vgl. d. Tab. S.

gen Gefässen. Es war dies einer der Gründe, die mich veranlassten, die Untersuchung über Entladungen in weiten Gefässen auszuführen. Der Erfolg entsprach durchaus den Erwartungen. Es zeigte sich, dass in solchen weiten Gefässen nicht nur sehr geringe Potentialdifferenzen (ca. 400 Volt) ausreichen die Entladung einzuleiten und zu unterhalten, sondern dass man bei reichend weit fortgesetzter Verdünnung im Stande ist, Ströme von minimaler Stärke durch das verdünnte Gas zu leiten, wie sie bei gewöhnlicher Verdünnung oder bei engeren Gefässen nicht entfernt erhalten werden können. Im Gegensatz der üblichen Auffassung, dass äusserst verdünnte Gase vollkommene Isolatoren seien¹, ergab sich eine hervorragende Leitfähigkeit, welche nur dann fast plötzlich aufhörte, wenn die Anode vollständig von dem dunkeln Kathodenraum umhüllt wurde. Dass aber auch bei einem solchen Gefäss nicht jede Entladung im Gase ausgeschlossen war, auch wenn weder Erscheinungen beobachtet werden konnten, noch ein Ausschlag des (Milliampère anzeigenden) Galvanometers, war leicht zu erkennen, wenn man auf das Entladungsgefäss ein Magnetfeld wirken liess, in solcher Richtung, dass, falls leuchtende Entladung vorhanden gewesen wäre, die Dicke des Dunkelraums in

¹ Ein solches nahezu absolutes Vakuum glaubt z. B. Lenard (Wied. Ann. 64, 279, 1898) erhalten zu haben, da er schreibt: „Die Strahlen (Kathodenstrahlen) führen also negative Elektrizität mit sich durch eine zur Erde geleitete metallische Wand hindurch und durch einen Raum, welcher in jeder Hinsicht als vollkommen nicht leitend erweist, im besonderen auch dann, wenn man versucht, unter Zuhilfenahme starker Kräfte eine elektrische Ladung durch ihn zu senden“; und später, da er von dem in dem Vakuum aufgestellten Kondensator spricht: „Zunächst überzeugen wir uns davon, dass der Kondensator eine elektrische Ladung, die ihm ertheilt wird, den merklichen Verlust beibehält auch dann, wenn die Strahlen ihn quer durchziehen und wenn er so stark geladen ist, dass die Potentialdifferenz zwischen seinen Platten einer Funkenlänge von mehreren Millimetern in Luft entspricht; auch ist es in keinem Falle möglich, eine elektrische Entladung zwischen den Platten in Gang zu setzen. Der Beobachtungsraum ist also, in den vorhergehenden Versuchen, vollkommen isolirend und bleibt auch, wenn er durchstrahlt wird“.

Meines Erachtens muss auch ein enges Gefäss, wie es Lenard benutzte, für kurze Zeit den Strom hindurch gehen lassen, bis sich die Wandladungen gebildet haben, welche den weiteren Stromfluss hindern.

Folge Erhöhung der Stromintensität sich vermindert hätte. bald setzte der Strom in Form einer leuchtenden Entladung wieder ein, hörte aber sofort wieder auf, sobald man das Magnetfeld beseitigte¹.

Diese Versuche beweisen, dass auch bei so geringer Enddistanz, dass die Anode innerhalb des Dunkelraums zu kommt, zunächst ein schwacher lichtloser Strom zu kommt, welcher aber fast völlig wieder aufhört, wenn sich die positive Luft genügend weit ausgebildet hat. Dann nämlich das Potentialgefälle in der Nähe der Anode verschwindend also kein Grund zu einer Wanderung der negativen Ionen, selbst nicht im Fall einer Neubildung an der Kathode da bei solcher auch die positiven Ionen in gleicher Weise mehr und durch diese die negativen festgehalten würde solcher Art kann man sich den molekularen Zustand des in einem hochevakuierten kleinen Entladungsgefäß denken, was anscheinend ein vollkommener Isolator geworden ist². Aus

¹ Die hemmende Wirkung eines Magnetfeldes auf die Entladung beobachtete zuerst Plücker, Pogg. Ann. 107, 87, 1859. H. Ebert, E. Wiedemann, Wied. Ann. 50, 34, 1893; O. L. ibid. 56, 320, 1899. Warburg Sitz.-Ber. d. Berliner Akademie 132, 1897 fanden sodann sich diese hemmende Wirkung auch auf den Eintritt der Entladung erst wenn das Magnetfeld vorher erregt war und zwar so, dass die magnetischen Kraftlinien senkrecht zu den späteren Stromlinien verliefen. Diese Wirkung konnte nur bedingt sein durch den Einfluss des Magnetfeldes auf eine leuchtenden Entladung vorangehende konvektive lichtlose Entladung (Vergl. O. L. Wied. Ann. 22, 334, 1884). Warburg fand ferner, dass eine begünstigende Wirkung eintritt, wenn die Kraftlinien den Stromlinien parallel sind, ich selbst, dass bei verstärktem Magnetfeld die begünstigende Wirkung in eine hemmende übergehen kann (Drude's Ann. 1902) und die eben besprochenen neuen Versuche ergeben, dass auch umgekehrt bei Kreuzung von Strom- und Kraftlinien durch Verstärkung des Magnetfeldes die Hemmung in Begünstigung übergehen kann. Massgebend in allen Fällen, wie die Dicke des dunkeln Kathodenraums der lichtlose äusserst schwachen Entladung durch die Ablenkung derselben bestimmt wird. Wird sie an einer Stelle der Elektrode sehr gering, so wird der Eintritt der leuchtenden Entladung begünstigt.

² Weitere Aufklärung erhoffte ich von Versuchen mit hoch evakuierten Elektroskopen mit gut isolirender Glaswand.

Schon oben wurde der Versuch von Hawksbee und s'Graves gedacht, welche scheinbar ergaben, dass im Vakuum keine elektrische Ziehungs- und Abstossungskraft auftrate.

cheinungen, welche eintreten, wenn die Anode nicht vollständig im dunkeln Kathodenraum eintaucht, ergeben sich ungezwungen unserer Auffassung. Ein Potentialgefälle ist nur an den im Dunkelraum befindlichen Theilen der Anode vorhanden,

Dessaignes (Gilb. Ann. 48, 40, 1814) vermochte indess im Vakuum ein Trommeter zur Divergenz zu bringen und ebenso Davy (Gilb. Ann. 72, 1822). Letzterer hängte an einen in das obere Ende eines Barometers geschmolzenen Platindraht dünne Platindrähtchen, welche an ihren unteren Enden mit zwei sehr kleinen Kugeln aus demselben Metall versehen waren. Er fand sich, dass diese Kugeln, wenn der Platindraht elektrisirt wurde, vollkommensten, über dem Quecksilber zu bildenden Leere sich einander abhiessen als sie es unter den gewöhnlichen Umständen gethan haben. Eine schwach geladene Leydener Flasche wurde langsam durch dieses im Vakuum entladen.

Worthington (Phil. Mag., 19, 218, 1885) fand, dass eine im stark evakuirten Raum aufgehängte Platinkugel heftig nach einem elektrisirten Blättchen hin angezogen, und nachdem im Augenblick der Berührung keine Funke entstanden war, abgestossen wurde.

Genaue Untersuchungen hat neuerdings H. Pflaum (Drude's Ann. 1, 1900) ausgeführt mit dem Ergebniss, dass das Vakuum ein vollkommener Isolator ist und elektrostatische Wirkungen in ihm intensiv werden.

Er liess sich von dem Glaskünstler Müller-Unkel in Braunschweig ein evakuirtes Elektroskop herstellen mit etwa 1 cm langen und $1\frac{1}{2}$ mm breiten Pendelplättchen aus starker Aluminiumfolie, welche an einer flachen Metalllamelle befestigt sind.

Näherte man einen elektrischen Körper dem Knopfe dieses Vakuumelektroskops, so wurden die Blättchen stark abgestossen und zwar mit der nämlichen Elektrizität; entfernte man den Körper, so fielen sie augenblicklich in die senkrechte Lage zurück, berührten die Lamelle und wurden sofort von dieser abgestossen, wobei nun ihre Ladung die entgegengesetzte wurde.

Den Vorgang kann man sich nach Pflaum folgendermassen denken: Der genäherte Körper z. B. negativ elektrisch, so bewirkte er eine Anziehung der positiven Elektrizität im Knopfe, der negativen in der Lamelle der Blättchen. Letztere strömt ziemlich schnell durchs Vakuum auf die innere Glaswand aus, und die Lamelle erweist sich daher nach Entfernung des Körpers als schwach positiv elektrisch. Die gewöhnlichen Elektroskopversuche gelingen mit dem Apparat nach Pflaum ebenfalls, er ist sogar noch empfindlicher, jedoch wirkt das Auftreten von Ladungen auf der Glaswandung sehr störend. Ist die äussere Wandung nicht ganz trocken, so ist es kaum zu vermeiden, dass nicht auf ihr eine starke ungleichnamige Ladung auftritt. Diese kann sich dann stundenlang halten. Nähert man den elektrisirten Körper dem Knopfe, während die Aussenwandung zur Erde abgeleitet ist, so laden sich die Blättchen durch Influenz; berührt man nun den Knopf, so tritt durch das Freiwerden der gleichnamigen Elektrizität eine so

nur dort also kann positives Glimmlicht auftreten, während andere Theil dunkel bleibt. Es wird dies namentlich dann gel wenn die Anode scharf zugespitzt ist, somit geringe Kapazität besitzt und der Einfluss der positiven Ionen auf die Gestalt der Potentialkurve vorwiegt. Abgerundete oder plattenförmige Anoden werden dagegen den Dunkelraum zurückdrücken können, indem ihre Ladung in gleichem Sinne wirkt, wie diejenige der positiven Ionen.

Gleiches kann auch schon bei gleichgeformten Elektroden eintreten. So beobachtete schon Poggendorff¹, dass bei Elektroden von nur 1 mm Abstand bei gesteigerter Luftverdünnung das blaue Glimmlicht von der Spitze des Drahtes wegrückte.

starke Ladung der Blättchen auf, dass sie meist unter einem Winkel 180° divergiren.

Versuche, welche ich selbst an einem solchen ebenfalls von Müllner bezogenen Vakuum-Elektroskop ausführte, ergaben, dass die Erscheinungen recht komplizirter Natur sind und sich nur erklären lassen durch den Uebergang der Elektrizität von den Blättchen auf die Wände des Gefäßes unter Berücksichtigung des Umstandes, dass das Ausströmen der negativen Elektrizität viel schwieriger stattfindet als das Ausströmen der positiven.

Ähnlich mussten bei einem von Hittorf (Wied. Ann. 7, 596, 1868) benutzten Vakuumelektroskop die Gefäßwände störend einwirken.

Zur Vermeidung dieser Wandladungen habe ich mir ein evakuirtes Elektroskop herstellen lassen, dessen Innenwände mit einem zur Erde abgeleiteten Drahtnetz bedeckt waren. Dasselbe schien sich, so lange im Innern keine Entladung eintrat, ganz wie ein gleichartiges gewöhnliche Luft enthaltendes Elektroskop zu verhalten, sowohl bei positiver wie bei negativer Elektrizität, auch hinsichtlich der Grösse der Ausschläge und deren allmählicher Abnahme mit der Zeit. Das Gefäß hatte etwa 5 cm Durchmesser.

Um auch das Verhalten während des Stromdurchgangs bei geringen Verdünnungsgraden beobachten zu können, brachte ich in einem tubulären Luftpumpenrezipienten, welcher auf einen metallenen Teller aufgekittet war, ein Aluminiumblattelektroskop als Elektrode an. War der Teller Kathode (Dunkelraum 58 mm dick) und das Elektroskop Anode, so erschienen die Blättchen von positivem Glimmlicht eingehüllt und divergirten nur wenig. Wurde der Strom umgekehrt, so erschien das ganze Elektroskop vom „dunklen Raum“ umgeben; die Blättchen divergirten relativ stark und der Winkel zwischen ihnen war vollständig von dem „gelben Saum“ ausgefüllt.

Diese Ergebnisse harmoniren mit der Auffassung, dass die Kathode von einer positiven Lufthülle umgeben ist, welche dort starken Potentialabfall bedingt.

¹ Poggendorff, Pogg. Ann., 138, 644, 1869.

Einige Versuche, die ich selbst¹ ausführte, sind dargestellt in meinem Buche über elektrische Entladungen, Fig. 129 und 130, S. 179; Tafel 2, Fig. 10 (nach O. L. Wied. Ann. 11, 686, 1880); ferner Fig. 5—8, S. 12; Tafel 4, Fig. 7; Tafel 5, Fig. 3; Tafel 8, Fig. 1, 2, 5 und 7 und Tafel 9, Fig. 2 und 9. Auch E. Wiedemann² und Wehnelt³ haben mehrere hierher gehörige Beobachtungen gemacht.

Da die früheren Beobachtungen mit einer einfachen Influenzmaschine angestellt waren, habe ich einige derselben⁴ unter Anwendung einer Accumulatorenatterie oder Hochdruckinfluenzmaschine wiederholt.

Die Figur 3 zeigt die Erscheinungen bei verschiedenen gestalteten Elektroden bei verhältnissmässig hoher Verdünnung.

Im Falle a. taucht die nadelförmige Spitze der Anode, welche letztere ganz von blauem Glimmlicht umgeben ist, fast vollkommen in den Dunkelraum; auch die Spitze der Kathode ist dunkel und dahinter erscheint lediglich der durch Strichelung parallel zur Kathode kenntlich gemachte „gelbe Saum“.

Im Falle b. ist die ganze positive Kugel im Dunkelraum und auch die vordere Hälfte der negativen Kugel erscheint dunkel, nur auf der Rückseite wird der „gelbe Saum“ sichtbar.

Die Figur c. zeigt eine positive Platte, auf deren Rückseite sich positives Glimmlicht (durch Punktirung angedeutet) festgesetzt hat, das sich am Rande mit dem sehr spärlich vorhandenen negativen Glimmlicht mischt. Fast die ganze Spitze der Kathode ist dunkel, nur an dem dickeren Stiel zeigt sich eine kurze Hülle von „gelbem Saumlicht“.

Figur d. zeigt den umgekehrten Fall, dass die Platte Kathode und die Spitze Anode ist. Sogar der dicke Stiel der letzteren reicht weit in den Dunkelraum hinein und der gelbe Saum auf der Vorderfläche der Platte erreicht beträchtliche Dicke.

Bei Figur e. endlich sind beide Elektroden plattenförmig. Da das Gefäss nicht weit genug war, konnte das positive Licht nur in Form eines dünnen geschichteten Stiels, dessen Lage sehr

¹ O. L. Wied. Ann. 11, 693, 1880.

² E. Wiedemann, Wied. Ann. 20, 776, 1883.

³ Wehnelt, Wied. Ann. 65, 511, 1898. Siehe ferner: O. L., Entladungen, S. 175, Fig. 127, S. 180 S. 389 Fig. 258, S. 377, Fig. 252.

⁴ Speziell die in O. L. Entladungen S. 12 Fig. 5—8 dargestellten.




Fig. 3.

veränderlich ist, von der Anodenseite nach dem blauen Glimmlicht gelangen. Der Büschel auf der positiven Seite erscheint, wenn genügend Raum gegeben ist, als röthlicher Büschel, ist die




Fig. 4.

Passage aber sehr eng, so nimmt er die Eigenschaften eines Bündels von Kanalstrahlen an.

Die Figur 4 zeigt ähnliche Erscheinungen bei etwas grösserer Dichte des Gases. Figur a. ist der normale Fall beim Ueber-

gang des Stromes zwischen sehr nahestehenden Spitzen. Die positive Spitze ist ganz von röthlichem Glimmlicht umhüllt, negative vollkommen dunkel. Erst über dem Stiel zeigt sich negatives Glimmlicht. (Der blasse gelbe Saum ist nicht angedeutet.)

Wurde vor die Kathode eine kleine Funkenstrecke eingeschaltet, so nahm die Lichterscheinung die Form der Figur an. Das positive Glimmlicht zog sich in die Nähe der Spitze der Anode und vereinigte sich mit dem negativen Glimmlicht, während die Spitze selbst dunkel blieb. In einigem Abstand von dieser blauen nur an der Kuppe röthlichen Hülle, durch einen „Trennungsraum“ davon getrennt, erschien die in dem rötlichen positiven Lichte leuchtende zweite Hülle, scheinbar ebenfalls von der Anode ausgehend und ihrer Natur nach übereinstimmend mit dem positiven Büschellicht.

Wurde die Funkenstrecke vor die Anode gesetzt, so nahm die Intensität dieses Büschellichtes zu, während die blaue Hülle abblasste und fast völlig unsichtbar wurde, bis auf das, die Kuppe bildende positive Glimmlicht. (Fig. c.)

Bei zwei einander nahe stehenden Kugeln (Fig. d.) war die Anode ausserhalb des Dunkelraums mit positivem Glimmlicht bedeckt, welches unmittelbar in die kolbenartig aufgetriebene blaue Glimmlichthülle an der Kathode überging. Unter Umständen kann die Vergrößerung des Dunkelraums zwischen den Elektroden so beträchtlich sein, dass das positive Glimmlicht nur am Stiele der Anode hervortritt und die blaue Glimmhülle eine davon völlig getrennte Manschette am Stiele der Kathode bildet¹.

Wird an der Kathode eine kleine Funkenstrecke eingeschaltet, d. h. dort die Stromintensität erhöht, so zieht sich entsprechend der Dunkelraum zusammen, die blaue Manschette verlängert sich zu einer die ganze Kathode umschliessenden blauen Hülle, welche nur da, wo sie die Anode berührt, in rothes positives Glimmlicht übergeht (Fig. e). In kleinem Abstand von dieser Hülle, dem dunkeln „Trennungsraum“, zeigt sich eine zweite röthliche Hülle, welche ebenfalls von der Anode ausgeht, aber über dem ersten von der ersteren durch einen dunkeln Zwischenraum getrennt ist das positive Büschellicht, von der bekannten rosa Farbe. Erhöht man die Entladungsintensität an der Anode durch Vorschalten

¹ Vergl. O. L. Entladungen, S. 175, Fig. 127 und Taf. 7 Fig. 1d.

ner kleinen Funkenstrecke, so wird dieses positive Büschellicht vorherrschend, die blaue Glimmhülle blasst ab und verschwindet raschen fast vollständig (Fig. f).

Bei sehr nahe stehenden grossen Platten nimmt dabei diese Hülle in dem Winkel zwischen der negativen Platte und deren Mittel ganz die Färbung des negativen Glimmlichts an, wird auch durch den Magneten ebenso wie dieses beeinflusst und erregt an der Stelle der Glaswand, wo sie auftritt, grünes Phosphoreszenzlicht; ein weiterer Beweis für den Mangel einer grundsätzlichen Verschiedenheit von positivem und negativem Licht. Umgekehrt kommt an einer nadelartig dünnen Kathode, welcher einer grösseren positiven Platte nahe gegenüber steht, die negative Glimmhülle der Nadel bei passender Luftverdünnung durchaus die Farbe des rothen positiven Lichtes an, so dass man wohl sagen kann, dass die blaue Farbe durch grosse, die rothe durch geringe Verdichtungen bedingt ist.

Nicht nur das Eintauchen der Anode in den Dunkelraum vermag eine Zurückdrängung desselben an der Kathode zu bewirken, sondern auch die Anwesenheit eines indifferenten Körpers. So wenigstens dürfte eine von Wehnelt beobachtete Erscheinung¹ zu Stande kommen, welche darin besteht, dass ein nahe der Kathode innerhalb des Dunkelraums befindlicher Körper einen vergrösserten unscharf begrenzten Schatten auf dem gelben Lichtsaum auf der Kathode erzeugt, welcher sich auch hinter denselben in den Kanalstrahlen fortsetzt. Dadurch nämlich, dass der Kathodenraum durch den fremden Körper abgegrenzt wird, kann an dieser Stelle keine Entladung auftreten, somit müssen auch die Kanalstrahlen auf der Rückseite ausbleiben.

5. Einfluss von Polwechseln.

Beruht wie angenommen die Bildung des dunkeln Kathodenraums auf der Erzeugung einer positiv elektrischen Lufthülle, zu deren Bildung sicherlich eine bestimmte, wenn auch äusserst kleine Zeit nothwendig ist, so wird man erwarten können, dass solche Pulsationen des Stromes und Wechsel der Stromrichtung nicht ganz ohne Einfluss sein werden. Erstere können hervor-

¹ Wehnelt, Wied. Ann. 67, 421, 1899.

gerufen werden durch Vorschalten einer kleinen Funkenstrecke, und in der That zeigt sich dabei, wie Ebert¹ mittheilt, eine kleine Aenderung: „Werden solche Funkenstrecken etwa den Entladungen der Influenzmaschine vorgelegt, so geht die Entladung von der „normalen Form“ (E. Wiedemann) mit verhältnissmässig grossem Dunkelraume zu einer Form mit immer enger anschliessender Glimmlichtschicht über.“

Diese Aenderungen dürften aber hauptsächlich dadurch bedingt sein, dass durch die Funkenstrecke eine Erhöhung der momentanen Stromstärke an der Kathode bedingt wird².

Sicherer erscheint der Einfluss von Wechselstrom sehr hoher Frequenz, den ich selbst bei dem oben beschriebenen grossen elektrischen Ei mit Netzkathode untersuchte.

Bei Anwendung von Teslaschwingungen ergab sich dabei, dass die Dicke des Dunkelraumes mit zunehmender Zahl der Schwingungen pro Sekunde bedeutend (bis etwa auf den zehnten Theil) abnimmt und bei sehr hohen Schwingungszahlen die Dunkelräume überhaupt kaum mehr sichtbar sind. Eine Aenderung des Gasdruckes trat dabei nicht ein und der Einfluss der Stromstärke wurde dadurch beseitigt, dass dieselbe bis zum Erlöschen der Entladungen herab gemindert wurde d. h. soweit, dass die maximale Spannung der Schwingungen gerade eben noch zureichte, die Entladung einzuleiten, so dass also der Dunkelraum das Maximum der Dicke annehmen musste.

In sehr langen engen Röhren zeigt sich eine Lichterscheinung nur noch in unmittelbarer Nähe der Elektroden³.

Die geringe Elektrizitätsmenge eines Stromstosses reicht nicht aus ein längeres Stück der Röhrenwand zu laden. Die Lichterscheinungen bleiben daher auf die Nähe der Elektroden beschränkt, es bilden sich dort sogenannte rekurirende Ströme aus, von welchen meist nur der negative das Gas wirklich zum Leuchten bringt, so dass an beiden Elektroden die drei Schichten

¹ Ebert, Wied. Ann. 69, 202, 1899.

² Vergl. O. L. Entladungen, S. 415.

³ Vergl. O. L. Entladungen, Taf. IX Fig. 8. Es sei auch hingewiesen auf die frühere Beobachtung, dass im Hittorfschen Rohr mit Kniekathode an der Spitze der Kathode bei Wechselstrom kein Licht auftritt. (Vergl. O. L. Entladungen, S. 398.)

des Kathodenlichts zu bemerken sind, während der ganze übrige Theil der langen Röhre völlig dunkel bleibt und auch thatsächlich keinen Strom führt¹.

Nach E. Wiedemann² ziehen sich bei gleichbleibender Stromrichtung Kathode und Anode, wenn letztere sich im Dunkelraum befindet, mit grosser Kraft an. Im Gegensatz hiezu beobachtete Ebert³, dass sich zwischen zwei im Vakuum gegenüberstehenden Plattenelektroden bei 2800 Volt Wechselstrom eine abstossende Kraft geltend macht, sobald sich die Glimmlichter durchdringen. Als Ursache betrachtet er das Nachdauern von eigenthümlichen Zuständen in der Nähe der Kathode, welche nach meiner Ansicht in der positiven Elektrisirung der Luft bestehen würden.

6. Durchdringen eines zweiten Stromes.

Die Entdeckung Hittorf's, dass der dunkle Kathodenraum ein wesentliches Hinderniss für die Entladung bildet, hat wiederholten Anlass gegeben zu untersuchen, ob sich derselbe etwa wie ein schlechter Leiter verhält und ein anderer Strom, welchen man hindurchleitet, darin ebenfalls einen grossen Widerstand findet. Schon Hittorf selbst⁴ hat solche Versuche ausgeführt mit dem Ergebniss, dass die Transversalleitung im Dunkelraum kleiner ist als an den leuchtenden Stellen des Gases.

E. Wiedemann und C. G. Schmidt⁵ fanden, dass durch den Strom zum Leuchten erregte Gase auch auf sie treffende Schwingungen absorbiren, auch wenn sie dies stromlos nicht thun. Der dunkle Kathodenraum absorbirt aber elektrische Schwingungen nur sehr schwach und verhält sich hierin wie ein Nichtleiter.

¹ H. Ebert und E. Wiedemann (Wied. Ann. 62, 186, 1897) fanden, dass, sobald die von den beiden Kathoden ausgehenden Gebilde sich gegenseitig durchdringen, die Anregbarkeit des Gases durch elektrische Schwingungen aufhört; drängt man diese Gebilde mittelst eines Magneten zur Seite, so findet von Neuem eine Anregung statt.

² E. Wiedemann, Wied. Ann. 20, 756, 1883.

³ H. Ebert, Wied. Ann. 69, 372, 1899. Siehe auch J. J. Thomson, Elektr. Entladungen, Leipzig, 1900, S. 102.

⁴ Hittorf, Wied. Ann. 7, 615, 1879.

⁵ E. Wiedemann und C. G. Schmidt, Wied. Ann. 62, 462, 1897.

Bei nahestehenden Platten, von welchen die eine, die Kathode vertikal beweglich war, zeigt sich nach E. Wiedemann (1) folgendes: „Hat man sie einmal in Berührung gebracht und man sie wieder trennen, so springen zwischen ihnen Funken über, während die Kathode dabei auf und niederschwirrt“.

Ich selbst fand bei Anwendung einer punktförmigen Anode plattenförmigen Kathode¹, dass sich der Funke längs der Gränze des dunkeln Kathodenraums hinzieht und schliesslich denselben durchbricht, um nach einem Punkte an der von der Anode entfernten Seite der Kathode zu gelangen.

E. Wiedemann² liess die positive Entladung durch ein Loch in den dunkeln Kathodenraum an der Kathode eintreten. Aus der Oeffnung austretende geschichtete positive Lichtbogen dann nach rückwärts, um sich ausserhalb des Dunkelraumes dem negativen Glimmlicht zu vereinigen.

Wehnelt³, welcher die Erscheinung ebenfalls untersuchte, fand, dass in solchem Fall, ebenso wie wenn der dunkle Raum die Anode völlig umhüllt, starke elektrische Wellen von der Kathode aus der Rohre ausgehen. Er schliesst hieraus: „Der dunkle Kathodenraum verhält sich wie ein vollständiges Dielektrikum. In denselben erzwungene Entladungen verlaufen genau wie eine Entladung in Paraffinöl oder anderen Dielektricis“.⁴

¹ O. L. Entladungen pag. 236 und Ztschr. f. phys. Chemie 18, 97, 1897.

² E. Wiedemann, Wied. Ann. 63, 243, 1897.

³ Wehnelt, Wied. Ann. 65, 510, 1898.

⁴ Schon in der Abhandlung Wied. Ann. 22, 317, 1884 habe ich darauf hingewiesen, dass in sehr verdünnten Gasen aus dieser Ursache „Streifenentladung“ auftritt. „Bei grosser Verdünnung tritt an der Kathode ein Hinderniss auf, welches ähnlich wie eine Funkenstrecke daselbst wirkt, so dass Streifenentladung vorherrschend wird“ (Vergl. Entladungen, p. 8.)

Im Gegensatz hierzu findet man in neueren Abhandlungen, welche bezwecken nachzuweisen, dass durch die Kathodenstrahlen negative Elektrizität transportirt wird (z. B. in der während des Druckes erschienenen Abhandlung von Austin und Starke, Verh. phys. Ges., 21. März 1902, S. 126), ausdrücklich hervorgehoben, dass die benutzten Ströme constante gewesen seien und die Resultate überhaupt nur unter dieser Voraussetzung Werth hätten. Häufig wird dabei auch angegeben, dass ein zur Erde abgeleiteter Conduktor, z. B. ein Blechgehäuse, innerhalb des Vacuumrohres nothwendig das Potential 0 haben müsse. Wirkt aber der Dunkelraum wie eine kleine Funkenstrecke und erzeugt in Folge dessen rasche elektrische Schwingungen

Einen andern Fall von Durchgang des positiven Lichtes durch den Dunkelraum habe ich selbst beschrieben¹. Am besten überzeugt man sich von der Möglichkeit des Durchgangs einer Entladung durch den Dunkelraum einer andern, indem man stuzieren an einer Drahtnetzscheidewand in einem elektrischen Ei




Fig. 5.

zeugt². Ein solches Ei, dessen kugelförmige Elektroden den Strom einer Akkumulatorenbatterie von 2000 Volt zuleiteten, liess zwischen dem Drahtnetz und der Anode mit Leichtigkeit den

braucht dies nach meiner Meinung keineswegs der Fall zu sein, selbst wenn nicht, wenn ein angeschlossenes Elektrometer die Spannung σ anzeigt besonders mit Rücksicht auf die Abweichungen der Stromwelle von der Normalform, s. O. L., Wied. Ann. 56, 320, 1895). Jedenfalls müsste, ehe aus solchen Untersuchungen weitgehende Schlüsse gezogen werden, zunächst diese fundamentale Frage entschieden werden. Vergl. auch Cantor, Wied. Ann. 7, 481, 1899; ferner die Bemerkungen am Schluss des 7. Kapitels, S. 81, Anm. 3.

¹ O. L. Drude's Ann. 7, Tafel 2, Fig. 76.

² O. L. Drude's Ann. 7, 22, 1902.

Strom der 110-voltigen Lichtleitung durchgehen. Dabei zeigte sich entweder einfach eine der Erhöhung der Stromintensität entsprechende Verminderung der Dicke des Dunkelraums, oder es bildete sich in der Mitte eine trichterartige Vertiefung, durch welche sich von dem Netz ausgehend ein blauer Strahl hindurchzog, wie Figur 5a zeigt.

Von besonderem Interesse war das Verhalten bei starker Annäherung eines starken Elektromagneten. Man erhielt zwei hellleuchtende Glimmlichtstrahlenbündel, Figur 5b, das eine von der negativen Kugel, das andere von dem Drahtnetz ausgehend, die völlig von einander getrennt waren und die Richtung der Kraftlinien verfolgten.

Der Versuch zeigt sehr deutlich, dass der von der Kathode ausgehende Strom aus dem ersten Glimmstrahlenbündel senkrecht austreten, unsichtbar das Gas durchfliessen, sodann in das zweite Glimmstrahlenbündel eintreten und dann wieder in unsichtbarer Form aus diesem sich gegen die Anode hinziehen muss. Dies ist vom Standpunkt der gewöhnlichen elektrolytischen Entladungstheorie schwer zu erklärende Komplikation, welche aber verständlich wird unter der Annahme, dass der Dunkelraum mit positivem elektrisiertem Gas erfüllt sei.

Man kann zu dem Versuch zwei verschiedenartige Stromquellen verwenden, aber auch eine einzige, indem man den Strom an die beiden Kathoden sich verzweigen lässt. Durch eingeschaltete Widerstände kann dabei das Verhältniss der Stärken der beiden sich durchdringenden Ströme beliebig geändert werden.

Beispielsweise wurden unter Anwendung einer Akkumulatorbatterie als Stromquelle, mit eingeschalteten Glyzerinwiderständen die in der nachstehenden Tabelle enthaltenen Zahlenwerte erhalten. Es bedeuten: N_a die Dicke des Dunkelraums am Drahtnetz in Millimetern, N_i die Dicke desselben an der Durchbruchstelle des blauen Strahls, K die Dicke des Dunkelraums der kugelförmigen Elektrode, i die Stärke des Stromes zwischen Kugel und Kugel in Milliampere, n die Stromstärke zwischen Netz und Kugel. Ein Stern bedeutet, dass das Glimmlicht schwach, zwei Sterne, dass es kaum sichtbar war.

K	Na	Ni	i	n.
75*	202	156	15,6	0,4
72	93	65	7,6	1,5
80	55	35	22,8	2,2
92	120	70	1,6	0,5
? **	295	275	0,1	0,1
89*	136	90	1,5	0,5
95	53	24	10,8	1,1
78	20	5	20,7	1,5
98**	240	194	0,1	0,1
98	70	51	3,55	0,45
95	44	30	11,3	0,7
117	53	48	1,79	0,01
100	10	8	8,1	0,2
80	0?	0?	19,7	0,3
76	115	83	2,2	0,6

Es ist sogar möglich gegenseitig sich durchdringende Entladungen mit nur 2 Elektroden zu erhalten. Solche entstanden z. B. in einem Entladungsgefäß, bestehend aus einem Luftkapazitätsrezipienten, auf dessen Rand zunächst ein Blechring mit dem Messingdrahtnetz, sodann ein Glasring von 9 mm Dicke und alsdann ein Metallteller aufgekittet wurden (Fig. 6). Der Metallteller diente als eine Elektrode, das Drahtnetz als zweite. Die Entladung erforderte so hohe Spannung, dass durch Einsetzen des unteren Theils in eine mit Oel gefüllte Schale das Uebergehen von Funken zwischen den beiden Elektroden an der Innenseite verhindert werden musste. Als Elektrizitätsquelle diente eine Hochdruckinfluenzmaschine mit 60 Scheiben. War der Teller positiv, so sah man auf ihm an einer Stelle positives rothliches Glimmlicht und darüber unmittelbar (ohne Dunkelraum) dem Drahtnetz aufsitzend blaue Glimmlichtstrahlen, welche einem Magneten in die Richtung der Kraftlinien gezogen wurden. War der Metallteller Kathode, so ging von seiner Mitte sogleich ein hellleuchtender dünner Stiel aus, welcher sich beim Vortreten durch das Drahtnetz zu einem röthlichen Büschel breitete. Bei Einwirkung eines Magneten wurde ein Theil des Büschels, der somit aus Glimmlichtstrahlen bestand, in die

Richtung der magnetischen Kraft abgelenkt, der Rest blieb verändert und bestand somit aus Kanalstrahlen. Die direkte Entladung geht in diesem Fall in dem Zwischenraum zwischen Teller und Netz über und erzeugt einen Dunkelraum, welcher diesen Zwischenraum vollständig ausfüllt. Eine zweite Entladung




Fig. 6.




Fig 7.

geht durch diesen Dunkelraum in Form des feinen Lichtfadens durch die Anode hindurch zu den Wänden des Rezipienten von hier zurück zur Anode. Diese erscheint in Form des dünnen Lichtfadens, weil sie den Dunkelraum durchdringen muss.

Wurde in den Metallteller in der Mitte ein 5 mm weites Loch gebohrt und auch auf der freien Seite ein Luftpumpenrezipient aufgekittet (Fig. 7), so sah man, wenn der Teller positiv

Das Netz negativ gemacht wurde, zwischen beiden einen kaum 1 mm dicken hell leuchtenden Faden auftreten, welcher sich durch die Oeffnung des Bleches als bläulicher Kathodenstrahl in der Axe des Gefässes fortsetzte, auf der Wand einen hellen Phosphoreszenzfleck erzeugend, und nach der entgegengesetzten Richtung, durch eine Masche des Drahtnetzes, als hellleuchtender Kanalstrahl von der Färbung des positiven Lichtes. Bei Annäherung eines Magneten zeigte sich nur eine Verstärkung der Intensität des Kanalstrahls, dagegen nicht die geringste Ablenkung; umgekehrt war das Kathodenstrahlenbündel gegen den Magneten äusserst empfindlich und konnte leicht so weit abgelenkt werden, dass es die Blechscheibe (Anode), aus deren Oeffnung es herausgetreten war, nahe der Oeffnung traf und die Oxydhaut derselben zu lebhaftem Leuchten brachte. Liess man den Magneten in schräger Richtung wirken, so wickelte es sich um die durch seinen Ursprung in der Oeffnung des Bleches verlaufende magnetische Kraftlinie zu einer feinen, etwa 3 cm weiten Spirale, von 1—2 Windungen (bei grösserem Luftdruck mehr), welche da, wo sie die Glaswand traf, einen hellgrünen Phosphoreszenzfleck erzeugte. Im Innern der Spirale zeigte sich ausserdem ein anderes Bündel Kathodenstrahlen, oder Glimmlichtstrahlen, welches genau die Richtung der Kraftlinie verfolgte und bei genügender Verstärkung der magnetischen Kraft, wobei die Spirale plötzlich verschwand, allein übrig blieb, augenscheinlich durch den Widerstand der längeren Bahn der Spirale zu Grunde.

Ausser diesen beiden Kathodenstrahlenbündeln trat aus der Oeffnung auch noch ein langes bis zur Gefässwand reichendes, aber sehr lichtschwaches Bündel von Kanalstrahlen aus, anscheinend eine Verlängerung des gelben Kathodensaums, welches ebenso wie das hellleuchtende nach der entgegengesetzten Richtung verlaufende Kanalstrahlenbündel vom Magneten abgelenkt wurde. Bei vermindertem Vakuum verschwand es, dagegen gesellte sich dem intensiven von der Anode fortgerichteten Kanalstrahlenbündel ein schwächer leuchtendes Glimmstrahlenbündel, welches ebenso wie das auf der Anodenseite vom Magneten beeinflusst in die Richtung der magnetischen Kraftlinien gezwängt wurde. Auffallend war, dass mit steigendem Vakuum der Lichtfaden zwischen beiden Platten immer geringere

Dicke annahm, das Kathodenstrahlenbündel steifer und Phosphoreszenzlicht heller wurde, während gleichzeitig Spannungs-differenz der Elektroden ausserordentlich an. Denkt man sich die Kathodenstrahlen durch fortgeschle negative Partikelchen hervorgerufen so lässt sich in diesen leicht begreifen, dass dieselben beim Durchfliegen des d Raumes zwischen beiden Platten, in Folge des ausserord hohen Potentialgefälles in diesem Raume, falls ihre Masse Verhältniss zur Ladung sehr klein ist, eine ungeheuer schwindigkeit annehmen und somit einen phosphoreszenzerreg Strahl bildend aus der Oeffnung heraustreten müssen; scheint mir die Annahme solcher Partikelchen, welche mit Strahlen fortschreiten, zur Erklärung nicht durchaus nothwendig zu sein, da auch nach der älteren (Faraday'schen) Theorie ein solcher Strahl, negativer Elektrizität durch eine Oeffnung der Anode hindurch möglich sein muss, weil bei dem raschen Fortschreiten der Entladung, welche mit einer der Lichtgeschwindigkeit vergleichenden Geschwindigkeit erfolgt (l. c. 142), die elektrostatischen Kraftlinien für das Fortschreiten nicht massgebend sein können².

7. Einfluss der Elektrodenform.

Die oben in Figur 1 gezeichneten Kurven gelten für eine kugelförmige Kathode, an deren Oberfläche die Stromdichte überall dieselbe ist. Wurde unter denselben Umständen als Kathode das den Querschnitt des Eis ausfüllende Drahtnetz gebraucht, so erschien der Dunkelraum wesentlich grösser und die Kurven nahmen ungefähr den in Figur 2 gezeichneten Verlauf. Ersetzt man das Drahtnetz durch ein Blech würde etwa die gleichen Resultate zu erwarten sein.

¹ Siehe O. L., Entladungen, S. 518 u. S. 58, Fig. 52.

² Vergl. hierzu O. L. Wied. Ann. 7. Taf. 1, Fig. 74 a—g, Taf. 75—81 u. s. w. Vielleicht erklären sich durch solche aus Oeffnungen hervorgehenden dringende Entladungen auch die Beobachtungen von A. Schuster (O. L. Entladungen S. 127 und J. J. Thomson, Die Entladung der Elektrizität durch Gase, S. 72), welche wesentlich zur Ausbildung der electrolytischen Entladungstheorie beigetragen haben. Ferner zeigt sich eine grosse Aehnlichkeit mit den bei punktförmigen Elektroden zu beobachtenden Erscheinungen, siehe z. B. O. L. Entladungen, S. 310, Fig. 187.

geben haben. Hieraus ist nun keineswegs zu schliessen, dass in einem ebenen Blech der Dunkelraum unter gleichen Verhältnissen dicker sei als an einer Kugel, es muss vielmehr in Betracht gezogen werden, dass die Oberfläche der ebenen Kathode ungefähr fünfmal der kugelförmigen betrug, somit die Stromdichte letzterer fünf Mal grösser war und demgemäss der Dunkelraum entsprechend geringere Dicke annehmen musste. Soll ein Einfluss der Elektrodenform konstatiert werden, so muss bei konstanter Stromdichte beobachtet werden.

Der Vergleich der Kurven ergibt, dass wahrscheinlich die Dunkelraumdicke an konvexen Elektroden von der Krümmung ziemlich unabhängig ist, solange diese nicht übermässige Grösse annimmt.¹ An einer Spitze sollte die Stromdichte ein Maximum und folglich die Dicke des Dunkelraums ein Minimum werden. Es trifft keineswegs zu, im Gegentheil zeigt sich an Spitzen eine abnorme Vergrösserung des Dunkelraums². Der Grund ist wohl darin zu suchen, dass die Anhäufung der negativen Elektrizität an der Spitze besonders reichliche Ansammlung positiver Ionen bedingt.

Umgekehrt erweist sich an konkaven Kathoden oder solchen mit einspringenden Winkeln (wie z. B. l. c. Fig. 10 Taf. 3) die Dicke des Kathodenraums in der Vertiefung geringer, vermuthlich weil sich die elektrostatischen Kraftlinien und somit die positiven Ionen nach den Seitenwänden der Höhlung hinziehen. Die Stromdichte muss also an den tiefsten Stellen am grössten und mit der Dicke des Dunkelraums eine noch geringere werden.

Im Innern einer röhrenförmigen Kathode hat der dunkle Raum äusserst geringe Dicke, die Röhre erscheint vollständig rothem positivem Licht erfüllt³.

Goldstein (1876) empfiehlt desshalb, um besonders helle, Spektralbeobachtung geeignete Entladungen zu erhalten, eine 3/4 cm weite Blechröhre als Kathode zu benutzen.

Im Zusammenhang mit dem Verhalten von Hohlkathoden

¹ Dass an der den ganzen Gefässquerschnitt ausfüllenden ebenen Kathode der Dunkelraum auch bei gleicher Stromdichte grösser war als bei einer Kugel, erklärt sich durch die Behinderung der positiven Ionen auf die Rückseite der Kathode zu gelangen.

² Siehe O. L. Entladungen, Taf. VII, Fig. 1 c.

³ Vergl. O. L. Entladungen, Taf. V Fig. 4.

steht, dass auch eine solche verstärkte Helligkeit beobachtet wird, wenn die Kathode aus zwei getrennten gegen ein geneigten Theilen besteht.

Goldstein (1876) sagt: „Zum Schluss deute ich nur merkwürdige Wirkung an, welche zwei einander zugekehrte Flächenelemente einer oder verschiedener Kathoden selbst bei geringen Entfernungen von einigen Centimetern noch auf einander ausüben. Die Helligkeit des Lichtes wird auf den einander zugekehrten Seiten z. B. von ebenen Blechen, ausserordentlich verstärkt — trotzdem die einander zugekehrten Seiten Ströme entgegengesetzter Richtung aussenden — auf den von einander abgewandten Flächen wird die Helligkeit vermindert.

Sehr frappant ist auch die starke Verengung, welche die zweite Schicht des Kathodenlichts an den einander zugekehrten Flächen erleidet“.

Ähnliche Beobachtungen bei zwei einander gegenüberstehenden Kathoden machte Wehnelt.¹

„Bei sehr grossem gegenseitigen Abstand der Kathoden strömt sich von der Anode her positives Licht in den Raum zwischen beiden und floss dort gleichmässig in die beiden Glimmlichtschichten über. Wurden die Elektroden genähert, so wurde das positive Licht herausgedrängt und lag als weisser Ring genau in der Mitte beider Kathoden, dicht an der Glaswand. Näherte man die Kathoden noch weiter, so begannen die dunkeln Räume gegenseitig zusammenzudrücken, bis bei noch grösserer Annäherung auch noch das Glimmlicht zur Seite herausgedrängt wurde, und sich die Summationsfläche ausbildete, welche, wie die gewöhnliche Beobachtung dieser Erscheinung zeigte, aus deflektirten und dadurch nach aussen drängenden Kathodenstrahlen besteht“.

Besonders auffallend ist das Verhalten von Hohlkathoden bei grösserer Tiefe, bei sehr niedrigen Drucken.²

Eine solche Kathode erscheint von einem weiten Dunkelraum umgeben, durch welchen sich aus der Tiefe der Elektrode ein dünner blauer Strahl durchzieht, ganz wie bei zwei sich gegenüberdringenden Entladungen.³

¹ Wehnelt, Wied. Ann. 65, 533, 1898.

² Siehe O. L., Drude's Ann. S. 25, Fig. 74, Tafel 2.

³ Vergl. auch O. L. Entladungen, S. 344, Fig. 219.

In der That dürfte es sich hier wirklich um einen solchen Fall handeln, da der Theil der Entladung von grosser Intensität, welcher aus der Tiefe kommt, genöthigt ist durch den Dunkelraum hindurchzudringen, der von den übrigen Theilen der Elektrode erzeugt wird.

Es versteht sich von selbst, dass unter solchen Umständen der Satz von dem senkrechten Austreten der Kathodenstrahlen nicht mehr gültig sein kann. So schreiben bereits E. Wiedemann und G. C. Schmidt¹: „Ist das Metall von verdünnten Gasen umgeben, so können die sich um die Kathode entwickelnden dunkeln Räume bewirken, dass die Richtung des Eintritts des Stromes in die Kathode nicht mehr die senkrechte, sondern eine wesentlich andere wird, dann treten auch die Kathodenstrahlen nicht mehr senkrecht an der Kathode aus; z. B. ist bei Hohlkathoden der Fall, wie Goldstein (Berliner Monatsberichte 22. Januar 1870, S. 117) nachwies. Auch bei anderer Ableitung entstehende dunkle Räume können ähnlichen²“.

Wehnelt³ äussert sich: „Das Kathodenstrahlenbündel wird mit abnehmendem Druck immer schmaler, mit völligem Verlöschen desselben setzt die Disruptiventladung ein. Wahrscheinlich wird die positive Entladung durch an den Wänden stehende sekundäre Räume zusammen gedrängt auf den in der Mitte noch frei gelassenen Raum, weshalb die Kathodenstrahlen in der Mitte der Elektrode austreten. Die sekundären dunkeln Räume beeinflussen sich gegenseitig nicht in gleicher Weise wie die eigentlichen dunkeln Kathodenräume, welche sich gegenseitig gegenseitig zusammen drücken“³.

¹ E. Wiedemann und G. C. Schmidt, Wied. Ann. 62, 610, 1897.

² Wehnelt, Wied. Ann. 65, 530, 1898.

³ Meiner Ansicht nach ist es unnöthig sekundäre Dunkelräume zur Erklärung heranzuziehen. Dass die Kathodenstrahlen als explosive Entladungen aufzufassen sind, die den Dunkelraum gewissermassen durchbrechen, ist ein Isolator, habe ich früher daraus geschlossen, dass man ähnliche Strahlenbündel erhält, wenn man den Dunkelraum durch einen wirklichen Isolator z. B. ein Glimmerblatt ersetzt. (Siehe O. L. Entladungen, S. 344, 219).

8. Einfluss der Kanalstrahlen.

Ausser den bisher besprochenen Faktoren schienen früh Versuchen zufolge¹ auf die Ausbildung des Dunkelraums die Kanalstrahlen von Einfluss zu sein. Bei dem mehrfach besprochenen grossen Ei mit Netzkathode und Kugelanode war nämlich beobachtet, dass unter anscheinend gleichbleibenden Verhältnissen der Dunkelraum mit der Zeit stark zunahm, während bei umgekehrter Stromrichtung, wobei nicht wie im vorigen Fall die eine Hälfte des Gefässes mit intensiv leuchtenden Kanalstrahlen erfüllt war, indem das Netz nun als Anode diente, nur keine Vergrösserung des Dunkelraums beobachtet wurde, sondern im Gegentheil ein Rückgang der bereits eingetretenen Vergrösserung.

Der nächst liegende Gedanke der Erklärung war der, im ersten Fall eine „Selbstevakuierung“ der Röhre sich gefunden hatte, welche im zweiten Fall in Folge der Erhitzung des Drahtnetzes durch die Glimmstrahlen wieder rückgängig wurde. Solche Selbstevakuierung, bei Röntgenröhren als „Herauswerden“ bekannt, hatte schon Plücker² beobachtet. Er sprach, indem er von der Herstellung möglichst hoch evakuirter auf Veranlassung von Geissler hergestellten Röhren spricht: „Die besten dieser Röhren lassen die direkte Entladung des Röntgenkorff'schen Apparates anfänglich mit weisslichem Licht zwar durch, die Entladung wird aber bald eine intermittirende und hört nach ein oder zwei Minuten ganz auf“.

Solche Röhren, welche den direkten Strom nicht mehr durchgehen lassen, können nach Plücker auch bei noch starker Verdünnung zum Leuchten gebracht werden, wenn man sie äusseren Elektroden versieht³: „Schliesst man den Strom wieder direkt an die Elektroden an, so geht derselbe wieder einige Minuten hindurch, das Leuchten hört aber bald wieder auf und der Strom ist unterbrochen. Dasselbe Experiment kann man beliebig wiederholen“.

Plücker vermuthet, dass bei mit Luft gefüllten Röhren der Sauerstoff absorbiert wird und der übrig gebliebene Stickstoff

¹ O. L., Drude's Ann. 7, 20, 1902.

² Plücker, Pogg. Ann. 105, 69, 1858.

³ Plücker, Pogg. Ann. 105, 70, 1858.

nicht mehr hinreiche um Träger des Stromes zu sein. Bei einer mit schwefliger Säure gefüllten Röhre gelang es ihm durch Erhitzen der Enden die Leitungsfähigkeit wieder herzustellen. Er sagt (l. c. S. 72): „Die Bestandtheile der schwefligen Säure hatten sich mit Platin in wenig stabiler Weise verbunden und wurden durch Einwirkung von Wärme von diesem wieder getrennt“. Den Beweis für die Auffassung sieht er darin, dass sich der Versuch mehrfach wiederholen liess. Bei einer Wasserstoff enthaltenden Spektralaröhre von Morren deutete er die Erscheinung durch Absorption des Wasserstoffgases durch das von der Elektrode zur Glaswand übergeführte Platin¹.

Ebert² bemerkt gelegentlich der oben erwähnten Messungen: Bei den sehr niederen Drucken beeinflusste mitunter eine Erscheinung die genaue Messung nicht unerheblich, welche ich eine „Selbstevakuations“ des Vakuumapparates nennen möchte. Unter dem Einflusse der Entladung selbst veränderte sich der Gasinhalt auf einer Weise, welche einer fortschreitenden Evakuations entsprach; die Dicke der Dunkelräume wuchs während des Stromdurchgangs, obwohl vor dem Beginne dieser Versuche bei tiefen Drucken immer ganz besonders lange gewartet wurde. Ferner stieg die Spannung, dergleichen der Wattkonsum im Entladungsapparate, obwohl die Stromstärke fortwährend sank. Dabei war an dem Manometer direkt fast nie eine wirkliche Druckverminderung nachweisbar“.

Bei den in Frage stehenden eigenen Untersuchungen schien nun eine solche Evakuations nicht die Ursache zu sein, einerseits weil das Wachsthum des Dunkelraums in keinem Verhältnisse stand zu der geringen am Manometer beobachteten Druckveränderung und doch nach den bisherigen Erfahrungen angenommen werden musste, dass Druckänderungen nur einigermaßen proportionale Dickenänderungen bewirken könnten, ferner deshalb, weil in einem gleichgrossen, durch eine verhältnissmässig weite Röhre mit dem ersten in Verbindung stehenden Ei mit kugelförmigen Elektroden, in welchem anscheinend nothwendig der Druck der gleiche sein musste, der Dunkelraum während des Anwachsens desselben im ersten Ei nahezu ganz ungeändert blieb.

¹ Plücker, Pogg. Ann. 106, 47, 1862.

² Ebert, Wied. Ann. 69, 210, 1899.

Der Umstand, dass die eigenthümliche Erscheinung gerade dann zeigte, wenn die Kanalstrahlen besonders reich auftraten, schien vielmehr auf eine spezifische Wirkung der Strahlen hinzuweisen, welche auch nach den bis dahin liegenden Untersuchungen erwartet werden konnte, wenn Dunkelraum wirklich durch Anhäufung positiver Ionen bedingt.

Bereits E. Wiedemann und G. C. Schmidt¹ fanden, Gase, die von Kanalstrahlen durchsetzt werden, elektrische Schwingungen absorbiren. Kanalstrahlen, welche auf Kathode fallen oder durch eine Netzkathode hindurch gedrückt das Entladungspotential in hohem Grade herab. Transversalentladungen gingen mit grosser Leichtigkeit hindurch. Statische Ladungen wurden, wie auch Arnold², beobachtete hohem Grade durch Kanalstrahlen zerstreut. Bei Auftreffen Kanalstrahlen auf eine Transversalkathode zog sich der dazwischen umgebende dunkle Raum sehr stark zusammen, und zwar von allen Seiten. Besonders stark war der Einfluss, wenn die Transversalelektroden einander so nahe standen, dass der dunkle Raum der Kathode die Anode umhüllte.

Diese Beobachtungen schienen auf eine Verwandtschaft zwischen Kanalstrahlen mit den Kathodenstrahlen hinzuweisen, man versuchte deshalb, sie ähnlich wie diese als Ionenströme aufzufassen. Sie sollten nämlich erzeugt werden durch die nach Auflösung der negativen Elektronen übrig bleibende relativ grosse positiven Theilchen, welche natürlich in entgegengesetzter Richtung sich bewegen müssen. Diese Ansicht gründet sich hauptsächlich auf eingehende Versuche von W. Wien³.

Mit vollem Recht hat nun aber hiergegen in neuester Zeit Goldstein⁴ Einspruch erhoben, weil bei den Versuchen Wiens das Induktorium, um nur Ströme einer Richtung zu erhalten, stets ein 2 cm langer Funke in freier Luft eingeschaltet war, der natürlich durch die auftretenden statischen Ladungen der Gefässwände und angeregte elektrische Schwingungen mannigfachen Complicationen Anlass geben musste. Insbesondere bestreitet Goldstein, die magnetische Ablenkbarkeit der Kan-

¹ E. Wiedemann und G. C. Schmidt, Wied. Ann. 62, 470, 1897.

² W. Arnold, Wied. Ann. 61, 325, 1897.

³ W. Wien, Wied. Ann. 65, 440, 1898 und Drudes Ann. 5, 421, 1900.

⁴ Goldstein, Verhandlungen, d. deutsch. phys. Ges. 1901, S. 204.

strahlen, womit auch meine eigenen Versuche, welche auch bei Anwendung kräftiger Magnete nie eine solche erkennen liessen, gut übereinstimmen.

Ferner gelang es Goldstein mit Sicherheit nachzuweisen, dass sich die Kanalstrahlen nicht wie die Elektronentheorie annehmen muss, gegen die Kathode hin, sondern von derselben fort bewegen.

Er äussert sich darüber: „Man benutzt z. B. als Kathode in einem etwa 4 cm weiten Rohr eine Nickelscheibe von 5—10 mm Durchmesser und stellt einen Draht oder ein Glasstäbchen von einigen Millimetern Dicke als Schattenobjekt auf, evakuiert in Wasserstoff bis zu geeigneter Dichte und biegt die gewöhnlichen Kathodenstrahlen durch den Magneten zur Seite. Dann sieht man, dass die magnetisch nicht deformirbaren rosa Kanalstrahlen von der Kathode bis zum Niveau des Schattenobjektes eine zusammenhängende Lichtmasse bilden, die die Röhrenweite ausfüllt; hinter dem Objekt aber liegt im rosa Licht ein scharf begrenzter schwach divergenter Schattenraum. Unzweifelhaft liegen hier Strahlen mit Eigenschaften der Kanalstrahlen vor, die sich von der Kathode fort ausbreiten.“

Dass die Kanalstrahlen durch die Entladung der Kathode bedingt sind, scheint auch daraus hervorzugehen, dass sie sich von der Kathode aus auch nach vorn (d. h. durch das negative Glimmlicht nach der Anodenseite hin) ausbreiten, wie Goldstein¹ dadurch nachweisen konnte, dass er das negative Glimmlicht mittelst eines Magneten entfernte (vergl. auch Fig. 7).

Sind nun aber die Kanalstrahlen nicht Ströme positiv elektrisirter Theilchen, so entfällt auch der oben angedeutete Grund anzunehmen, dass sie einen besonderen Einfluss auf die Bildung des Dunkelraums haben müssten. In der That hat die eingehendere Untersuchung gelehrt, dass die beobachteten raschen und grossen Aenderungen des Dunkelraums lediglich darauf zurückzuführen sind, dass bei hoher Verdünnung der Dunkelraum, selbst bei gleichbleibender Stromstärke, mit Erhöhung des Vakuums ganz unverhältnissmässig rasch wächst und unter den in Frage stehenden Verhältnissen noch sehr viel rascher wachsen musste, weil eben in Folge dieser Ver-

¹ Vergl. auch Goldstein, Berl.-Sitzber. 39, 691, 1886.

grösserung des Dunkelraums der Strom nicht konstant blieb, sondern bis zu ganz aussergewöhnlich kleinen Werthen herging. Dass das angeschlossene zweite Ei keine Vergrösserung des Dunkelraums ergab, fand seine Erklärung darin, dass Druckausgleich zwischen diesen beiden Gefässen bei so hohen Verdünnungen trotz der Weite der Verbindungsröhre, zumal da eine kleine Undichtigkeit vorhanden war, ganz unvorhergesehen lange Zeit in Anspruch nahm, die nach Stunden zählte.

Hatte sich in Folge der Selbstevakuierung der Dunkelraum soweit ausgedehnt, dass die Entladung selbst bei 2000—3000 V Spannung nicht mehr zu Stande kam, so gelang es leicht durch Lufteinlassen den früheren Zustand wieder herzustellen, wo der Druck von etwa 0,01 mm auf 0,07 mm stieg. Da der Inhalt des Eies etwa 70 l betrug, mussten ungefähr 5—6 cl Luft eingeströmt sein. Im Laufe einiger Stunden war die Luftmenge wieder verschwunden und musste abermals neu eingelassen werden. Durch Dauerversuche wird es also sicher werden müssen zu erfahren, wohin diese beträchtlichen Luftmengen verschwinden (insbesondere auch, wenn an Stelle von Luft andere Gase eingelassen werden) und ob etwa das Verschwinden mit dem Auftreten der Kanalstrahlen in ursächlichem Zusammenhang steht.

Auch eine solche Beziehung ist indess durchaus unwahrscheinlich, da vergleichende Versuche mit Messingnetz- und Aluminiumkugel-Kathode ergeben haben, dass die Selbstevakuierung unter sonst gleichen Umständen in beiden Fällen gleichem Grade und mit gleicher Schnelligkeit erfolgt, obschon im zweiten Fall die Kanalstrahlen nur als schwacher gelber Saum auftraten.

Man kann also sagen, dass sich bisher keine Anhaltspunkte ergeben haben, dass die Ursache der Vergrösserung des Dunkelraums in etwas anderem zu suchen ist, als in der noch ungeklärten Selbstevakuierung des Gefässes.

9. Schluss.

Aus vorstehenden Untersuchungen lassen sich insbesondere folgende Schlüsse ziehen:

1. Die Lichterscheinungen in evakuierten Gefässen, speziell das blaue negative Licht und das rothe positive Licht werden als

hiesslich durch einen Strom negativer Elektrizität hervorgerufen, welcher, wie das magnetische Verhalten zeigt, aus der Kathode tritt und in die Anode einmündet. Ein gleichzeitig auftretendes entgegengesetzt verlaufender positiver Strom ist nicht vorhanden.

2. Als Ursache dieses Stromes ist die Dissoziation von Gasen in kleinere entgegengesetzt elektrische Theile (Elektronen, Ionen) anzusehen, von welchen sich die negativen an der Anode entladen können, während die positiven ihre Ladung nur schwierig an die Kathode abgeben, so dass sich um diese eine mehr oder minder ausgedehnte Hülle positiv elektrischen Gases bildet, welche anscheinend die Ursache des dunkeln Kathodenstromes ist.

3. Leuchten des Gases tritt höchst wahrscheinlich da auf, wo Dissoziation der Moleküle oder Atome stattfindet, insbesondere an der Grenze des Dunkelraums, weil dort (obschon sich dies mit Messungen nicht hat konstatiren lassen) das Potentialgefälle den Ladungsgradienten erreicht oder übertrifft. Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Entladung scheint dort, vermuthlich in Folge des Energieverbrauchs, eine plötzliche Verminderung zu erfahren, die Stromlinien, falls die Entladung im magnetischen Felde stattfindet, statt in der Richtung der magnetischen Kraftlinien fortzuschreiten (wie anfänglich), plötzlich ihre Richtung ändern und nunmehr, soweit es das Potentialgefälle und der Raum gestatten, annähernd senkrecht zu den Kraftlinien weiter schreiten.

Das
Petroleum des Rheinthales

VON

C. Engler

Geheimerath und Professor der Chemie.

Geschichtliches.

Noch aus der Zeit, in welcher das Elsass einen Theil des deutschen Reiches bildete, fast zwei Jahrhunderte, bevor es von Frankreich an sich gerissen wurde, besitzen wir aus dem Jahre 1498 einen Bericht von Wimpheling über den Erdölbrunnen von Pechelbronn. Hiernach war diese Quelle von Alters her bekannt und hatte den Namen einer Pechquelle, des „Pechelbronnens“, ohne Zweifel daher erhalten, dass dort eine Wasserquelle continuirlich ein fast pechschwarzes dickes Erdöl mit zu Tage förderte. Schon im 16. Jahrhundert sollen nach Daubrée¹ die benachbarten Landleute dieses Oel gesammelt und theils zum Brennen in Ampeln, theils als Wagenschmiere verwendet haben. Ein schon 1735 auf der Mühle von Merkweiler, zwischen Sulz und Pechelbronn, wohnender griechischer Arzt, Eryn d'Erynys, erfasste sich zum ersten Mal eingehend mit dem Vorkommen von Erdöl und Asphalt bei Pechelbronn und Lobsann und entdeckte auch unweit der Quelle ölhaltigen Sand. Herr de la Sablonnière erwarb 1745 das Recht der Gewinnung des Pechelbronner Bitumens, führte Bohrungen aus und fand Oel, worauf er dasselbe ausbeutete und in einer kleinen Fabrik verarbeitete. Im Jahr 1763 trat Le Bel als Gesellschafter ein, übernahm das

¹ Daubrée, „Descript. géol. et min. du Dép. Bas Rhin“, Strassburg 1852. Siehe ferner Andreae „Abhandlungen zur geol. Spezialkarte von Elsass-Lothringen II, Heft 3, Strassburg 1884. van Werveke, Zeitschr. f. prakt. Geol. III, 98; IV, 41. Le Bel „Notice sur les Givements d. Pétrole à Pechelbronn“, Colmar 1885. Flicke & Bleiker „Récherches s. l. terrains bitumineux d'Alsace“. Colmar 1885. Hoeffel „Hist. Balsami mineralis alsatici“. Argentorat 1734. Eryn d'Erynys „Disputat. sur l'asphalte ou ciment nat.“, Paris 1721. A. Herzog in Elsässer Chronik. Rösslin „Tractat. supra allegat. im 16. Jahrh.“. Joh. Dolk „Hannawischer Erdbalsam, Petroleum etc.“ 1625. A. Libavius, Singularium, cont. VIII.

Werk 1766 allein, worauf es unter steter Erweiterung des Betr bis 1. Januar 1889 im Besitze dieser Familie verblieb. genanntem Jahr ging es von J. A. Le Bel, dem durch seine wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiete der Stereochemie rühmlich bekannten Forscher, an die derzeitige Aktiengesellschaft „Pechelbronner Oelbergwerke“ über. Bis Ende der 60er Jahre wurde das Oel durch Schachtbetrieb ausgebeutet,¹ worauf man zu Bohrungen schritt, die sehr bald an einzelnen Stellen überraschend günstige Resultate, kräftige Oelfontainen, ergaben und zur Errichtung einer grossen Petroleum-Raffinerie unmittelbar mit dem Oelbrunnen führten.

3 Kilometer nördlich von Pechelbronn liegt das Asphalt-Lobsann, woselbst 1789² ebenfalls Bitumen entdeckt wurde. Doch wurde hier hauptsächlich nur Asphalt gewonnen. Schwabweiler, 5—6 Kilometer südöstlich von Pechelbronn gelegen, wurde 1830 das Bitumen konstatiert und 1838 dort eine Quelle aufgeschlossen; doch arbeitete man auch hier zunächst mittelst Schachtbetrieb.

Nachdem man im Revier von Pechelbronn wiederholt städtische Oelquellen erbohrt hatte, regte es sich auch an anderen, besonders den benachbarten Orten des Unterelsass, so dass nach Jasper 1889 schon 40 Konzessionen auf Gewinnung von Erdöl erteilt waren, deren Zahl sich rapid vergrösserte.

Zur Zeit sind es hauptsächlich 3 Gesellschaften, welche das Erdöl des Unterelsass westlich und östlich der Linie Sulz ²/Walburg-Hagenau im Grossen ausbeuten und deren Betriebsumfang sich aus folgenden Produktionszahlen für rohes Erdöl der letzten Jahre ergibt. Es produzierten im Jahr 1901:

Pechelbronner Oelbergwerke	140 880 M.Ctr
Elsässer Petroleum-Gesellschaft Walburg- Biblisheim	46 050 „
Gute Hoffnung in Dürrenbach	14 000 „
Zusammen 1901	200 930 M.Ctr
„ 1900	225 960 „

¹ Grodnitzky, Inauguraldissertation, Karlsruhe 1884.

² Jasper, Das Vorkommen von Erdöl etc., Strassburg 1890. Höpfer gibt das Jahr 1756 für Entdeckung des Bergtheers in Lobsann an („Erdöl und seine Verwandten“ 1888).

Die Elsässer Petroleum-Gesellschaft verlegte ihre früher zu Dramstein (Pfalz) befindliche Raffinerie vor einigen Jahren nach Blisheim in die Nähe ihrer Oelfelder.

Trotz zahlreicher Unternehmungen und Bohrungen hat schon in Jahren eine Steigerung der Elsässer Erdölproduktion nicht stattgefunden und es scheint, dass das jetzt erschlossene Revier eine sehr grosse Ausdehnung nicht besitzt. Wichtig ist, dass aber doch keine Abnahme eingetreten ist; besonders Pechelbronn ist immer reichlich mit Oel versehen.¹

Es wäre zu wünschen, dass Bohrungen auf Erdöl in dem alten tertiären Becken des Rheinthals in weiterem Umfang als bisher vorgenommen würden und es darf mit Freuden begrüsst werden, dass seit einigen Jahren auch nordöstlich von Pechelbronn, auf der Linie Weissenburg—Karlsruhe in der Rheinpfalz Bohrungen im Gange sind, von denen bis jetzt einige wenigstens Gasausbrüche und Oelspuren geführt haben. Auch im Oberelsass, bei Altkirch, ist schon auf Erdöl gebohrt worden; man hat dort zwar Erdöl gefunden, doch nicht in grösseren Mengen.

Chemische Beschaffenheit der Bitumina des Rheinthals.

1. Das Erdöl des Elsass. Wenn man die Erdöle verschiedener Vorkommen unterscheidet in solche mit vorwiegend gesättigten Kohlenwasserstoffen der Methanreihe, wozu die pennsylvanischen gehören, und in solche mit vorwiegend Naphtengehalt der unter 100° siedenden Theile, zu welcher letzteren die Oele von Baku zu zählen sind, so muss das Erdöl von Pechelbronn und, soweit bis jetzt bekannt, das ganze Elsass den ersteren zugetheilt werden. In hiesigen Laboratorium gelang es insbesondere Pentan, Hexan, Heptan, Octan und Nonan zu isoliren, und das Verhalten gegen konzentrirte Schwefelsäure zeigt, dass die Olefine nur in geringerer Menge vertreten sind. Ebenso wurden kleine Mengen von Naphthen, Terpenen und Benzolhomologen (Pseudocumol und Mesitylen) nachgewiesen. An festem Paraffin enthält das Pechelbronner Oel 1–2 p.C., welches bei der Raffination auch als Nebenprodukt gewonnen wird.

¹ Gegenüber der Produktion an Rohpetroleum des Jahres 1900 in Russland mit 98 Mill. M.Ctr., in Nordamerika mit 83 Mill. M.Ctr. ist die Oelgewinnung im Elsass eine immerhin noch sehr geringe.

Besonders charakterisirt ist aber das Pechelbronner Schwabweiler Oel durch seinen hohen Sauerstoffgehalt, welcher bei ersterem bis auf 4,6 p.C. bei letzterem auf 6,5 p.C. ansteigt, was im Zusammenhang steht mit einem ausnehmend hohen Grade des Rohöls an Asphalt und an Pech, deren scharfe Trennung nach besonderer Methode im hiesigen Laboratorium Herr Flückiger durchgeführt hat.

Nach G. Krämer² enthält das elsässer Erdöl 0,134 p.C. Schwefel, das ist weniger als im Rohöl von Ohio, Terra di Lavoro (1,3 p.C.) u. a., aber mehr als in denen von Pennsylvanien, Galizien, Baku (0,06 p.C.) u. a. nachgewiesen.

Der Stickstoffgehalt des elsässer Rohöls ist schon vor langer Zeit von Boussingault³ bestimmt worden. Dieser fand in einem schweren Oel von Pechelbronn 1,1 p.C., in einem Oel von Schwabweiler 0,4 p.C. Stickstoff. Da die chemische Natur der Stickstoffverbindungen für die Beurtheilung seiner Abstammung von Wichtigkeit war, so wurde im hiesigen Laboratorium durch Fr. Mac-Garvey⁴ die stickstoffhaltige Substanz isolirt und analysirt. Sie ergab die folgenden Resultate:

Kohlenstoff	81,55—81,52 p.C.
Wasserstoff	10,09—9,99 p.C.
Stickstoff	7,92

Die Substanz stellt ein gelbliches Oel dar, das sich in Salpetersäure leicht löst, mit Quecksilberchlorid, Platinchlorid, und Goldchlorid Doppelsalze liefert und ausgesprochenen Pyridingecharakter zeigt, sonach aller Wahrscheinlichkeit nach der Klasse der Pyridinbasen angehört. Nach seinem Siedepunkt, der, noch nicht konstanzir, zwischen 250 und 290° schwankt, müssen hochmolekulare Verbindungen vorliegen, etwa $C_{11} H_{17} N$, welcher Körper 80,98 p.C. C, 10,42 p.C. H, 8,58 p.C. N. verlangt.

Bekanntlich unterscheiden sich die verschiedenen Erdöle ihrer Natur nach besonders dadurch, dass sie die einzelnen Bestandtheile, oder richtiger ganze Gruppen von Bestandtheilen in relativ sehr verschiedenen Mengen aufweisen. So enthalten die nordamerikanischen und galizischen Rohöle

¹ Siehe Engler. „Das Deutsche Erdöl“. Gekr. Preisschrift, Berlin 1885.

² Sitz.-Ber. d. Ver. z. Bes. d. Gew.-Fl. 1885, 296.

³ Compt. rend. 96, 1452.

⁴ Inauguraldissertat. Karlsruhe 1896, 16.

wiegend Kohlenwasserstoffe der gesättigten Methanreihe bis zu erheblichen Mengen fester Paraffine, die Erdöle von Baku grosse Mengen Naphtenkohlenwasserstoffe, und gewisse californische Oele sind reich an Kohlenwasserstoffen der Benzolreihe. Wie schon oben erwähnt, herrschen in den unter 300° siedenden Theilen der elsässer Rohöle die Methankohlenwasserstoffe vor, Diese Oele schliessen sich also ihrer chemischen Natur nach den pennsylvanischen und galizischen Oelen an. Aber auch diese drei Oeltypen zeigen wieder sehr grosse Verschiedenheiten in der relativen Menge niedriger und höher siedender Kohlenwasserstoffe der Methanreihe. So sieden unter 300° von pennsylvanischem Rohöl 75—90 p.C., von galizischem 40—60 p.C. von Pechelbronner Springquellenöl ca. 40 p.C. Von diesem bei den derzeitigen Bohrungen resultirenden Pechelbronner Quellenöl ist das früher durch Schachtbetrieb gewonnene und aus anderen Horizonten stammende Schachtöl völlig verschieden. Dasselbe beginnt erst über 200° zu sieden und spaltet nach Le Bel bei der Destillation Kohlenwasserstoffe der Olefinreihe ab.

Da nur die unter 300° siedenden Theile auf Leuchtöl verarbeitet werden können, so ist klar, dass sich für diesen Zweck nur das elsässer Springquellenöl eignet; das Schachtöl ist dazu zu hochsiedend, liefert aber dafür, nachdem das Paraffin durch Ausfrieren abgeschieden ist, sehr gutes Maschinenöl.

2. Die Erdölgase von Pechelbronn. An zahlreichen Stellen in der Umgebung Pechelbronns entströmen dem Boden brennbare Gase, welche häufig gleichzeitig mit Salzwasser auftreten. An manchen Stellen erfolgt der Austritt ohne scheinbaren Zusammenhang mit Erdöl und ist dann zumeist nicht sehr kräftig, doch gleichmässig, oft mit intermittirendem, plötzlich stärkerem Hervorquellen des Gases; immer aber treten mit dem Springquellenöl grosse Mengen Gas mit zu Tage, entweichen auch noch nachträglich aus dem schon geförderten Oel unter starkem Aufschäumen und bedingen dadurch für die ganze Umgebung grosse Feuersgefahr.

Die Gase wurden im hiesigen Laboratorium analysirt; ich lasse die erhaltenen Resultate des Vergleichs mit der Zusammensetzung des Gases der im Bienwald erbohrten Gasquelle wegen hier nochmals folgen. Beide Arten Gas, das mit Salz-

wasser auftretende (I und II), sowie das den Bohrlöchern (III), wurden untersucht.

	I	II	III
Methan	73,9	68,2	77,3 Vol. p.
Olefine	4,0	3,4	4,8 " "
Kohlensäure	2,2	2,9	3,6 " "
Kohlenoxyd	3,0	3,7	3,45 " "
Sauerstoff	—	4,3	1,9 " "
Stickstoff	16,9	16,9	8,95 " "

In dem Salzwassergas No. II und dem Erdölgas No. III Sauerstoff enthalten, der wahrscheinlich von Luft herrührt, sich dem Gas vor seinem Austritt beigemischt hat. Bringt Sauerstoff und ebenso den Stickstoff, dessen alleinige stammung als Rest von Luft allerdings zweifelhaft ist, der v. mehr auch aus den Rohstoffen des Erdöls herrühren kann, Abzug, so zeigen die Gase folgende Zusammensetzung:

	I	II	III
Methan	88,9	87,2	86,8 Vol. p.
Olefine	4,8	4,4	5,4 " "
Kohlensäure	2,7	3,7	4,0 " "
Kohlenoxyd	3,6	4,7	3,8 " "

Die Zusammengehörigkeit der beiden Gasarten, des Salzwassergases und des Erdölquellengases, die ja auch von vorn herein anzunehmen war, geht aus einem Vergleich der Analysen ohne Weiteres hervor.

Als auffallende Erscheinung darf die Anwesenheit relativ bedeutender Mengen Kohlenoxyd hervorgehoben werden. Dies ist aus den zum Vergleich hier wiedergegebenen Analysen von Bunsen und Schmitt zu ersehen, dass auch die kaukasischen Erdölgase nennenswerthe Mengen Kohlenoxydgas enthalten, während nach Phillips¹ allerdings die amerikanischen Erdölgase völlig frei davon sind. Genannte Forscher fanden:

	I	II	III
Methan	92,5	93,1	92,2 Vol. p.
Olefine	4,1	3,3	4,3 " "
Kohlenoxyd	0,9	2,3	3,5 " "
Wasserstoff	0,9	1,0	— " "
Stickstoff	2,1	0,5	— " "

¹ Transact. of the Americ. Philos. Soc. Bd. 18, 1893 Mai.

Es wurden bis zu 4,44 p.C. Kohlenoxyd gefunden.

Wenn Phillips behauptet, Kohlenoxyd entstehe erst bei 0° und es sei nicht möglich, dass der natürliche Bildungsprozess des Erdöls bei so hoher Temperatur vor sich gegangen Kohlenoxyd könne desshalb nicht vorhanden sein, so ist gegenüber darauf aufmerksam zu machen, dass das Kohlen-
l der Erdölgase sich nicht durch Reduction aus Kohlen-
e gebildet haben muss, dass vielmehr eine Reihe anderer
esse, die bei erheblich niedrigeren Temperaturen ver-
en, seine Bildung herbeigeführt haben können. Es sei nur
die Bildung von Kohlenoxyd bei wenig über 200° durch Er-
m gewisser Ketone erinnert¹, sowie an zahlreiche andere
etzungen, die schon unter 200° beträchtliche Mengen Kohlen-
l ergeben². Blättriger Lignit entwickelt schon beim Erhitzen
 50° kohlenoxydhaltiges Gas. Die Bildung von Kohlenoxyd
Fettstoffen bei Temperaturen, die sehr wohl bei der Erdöl-
ung in Betracht gezogen werden dürfen, ist sonach keines-
s ausgeschlossen und die Anwesenheit von Kohlenoxyd bildet
halb kein Argument gegen die Richtigkeit der Theorie der
lung des Erdöls aus thierischen Fettresten.

1. Das Petroleum aus den Muscheln des Kalkes,
s. a., von Roth-Malsch. Wenn man auf der Linie Bruchsal-
elberg auf Station Roth-Malsch die Bahn verlässt und sich
: Malsch den Vorhügeln des Gebirgszuges zuwendet, so stösst
: bei Durchquerung der Felder auf zahlreiche Steinbrüche, die
der Weise abgebaut werden, dass die ein bis mehrere
er mächtige Kalksteinschicht unter den einzelnen Aeckern
ausgearbeitet, die Humusschicht wieder an Ort und Stelle
acht und so der Acker nur tiefer gelegt wird. Allmählich ist
ast das ganze dortige Lias-Terrain ausgehöhlt und tiefer gelegt
len. Schon seit langer Zeit ist bekannt, dass der Kalkstein
entlich in den tieferen Lagen zahlreiche Versteinerungen führt,
enen Petroleum in kleineren Mengen vorkommt. Der Freund-
keit des Herrn Professor Futterer habe ich es zu danken,
: ich auf zahlreiche Stellen, die derartige Versteinerungen
ten. aufmerksam wurde.

¹ Engler & Löw, Ber. d. D. chem. Ges. Bd. 26, 1438.

² Engler & Grimm, ibid. Bd. 30, 2921.

Unter den Versteinerungen des Muschelkalkes treten besonders reichlich hervor: Muscheln, dabei vorwiegend *Gryphaea arcuata* und *Rhynchonella*, sowie Ammoniten (*Am. Bucklandi*, *spiratilis* etc.), die indessen nur zum weitaus kleinsten Theil Petroleum enthalten. Oft jedoch trifft man beim Zerschlagen des Kalksteins auf einzelne Muscheln und Ammoniten, deren Wohnkammern mit Erdöl theilweise oder ganz angefüllt sind.




Fig. 1.

welches beim Zerschlagen herumspritzt oder ausfliesst. Beistehende Abbildungen zeigen in natürlicher Grösse solche Versteinerungen, deren Hohlräume mit Erdöl angefüllt waren, und zwar bedeutet Fig. 1 eine mittelgrosse *Gryphaea*, in der Mitte durchgeschlagen, Fig. 2 ein weiteres Exemplar, nur seitlich offen. Häufig kommen die mit Petroleum gefüllten kleineren *Rhynchonella*-Muscheln, seltener dagegen erdölführende Ammoniten vor.

Dieses Muschel-Petroleum ist schon äusserlich von verschiedener Beschaffenheit, unterscheidet sich auch hinsichtlich spezifischen Gewichts und Flüchtigkeit. Bis jetzt konnte ich in Gemeinschaft mit E. Albrecht 3 Sorten der chemischen Analyse unterziehen.¹ Oel I entstammt theilweise den abgebildeten Muscheln.

¹ Zeitschr. f. Angew. Chem. 1901, Heft 37.

scheln, theilweise einem grossen Ammoniten, war dunkel von Farbe, dickflüssig, spezifisch schwer und schon eine Zeit lang mit Luft in Berührung, Oel II war dem Muschelkalk frisch entnommen, noch ziemlich dünnflüssig, Probe III das einem Muschel-



Fig. 2.

hohlraum direkt entnommene gelbe, durchsichtige, dünnflüssige und leicht flüchtige Oel. Die Resultate der Analyse waren:

	I			II	III
Kohlenstoff. . .	87,22	87,66	87,20	86,73	86,59
Wasserstoff. . .	12,65	12,33	12,45	12,95	12,92
	<u>99,87</u>	<u>99,99</u>	<u>99,65</u>	<u>99,68</u>	<u>99,51</u>

Auf qualitativem Wege liessen sich Stickstoff und Schwefel nachweisen, doch kann ihre Menge nach dem Ergebniss obiger Analysen unter allen Umständen eine nur sehr geringe sein.

Diese Resultate der Analysen von Muschelöl stimmen im Allgemeinen überein mit der von Markownihoff und Oglobin¹ konstatirten Zusammensetzung des Erdöls von Baku:

¹ Ber d. D. Chem. Ges. Bd. 16, 1874.

	I	II	III
Kohlenstoff	86,65	87,01	86,89
Wasserstoff	13,35	13,22	13,18

Es gelang aber auch noch, die charakteristischen Bestandtheile der meisten rohen Erdöle: Asphalt, Pech und festes Paraffin dem Petroleum mit Sicherheit nachzuweisen, so dass ein Zweifel der Identität dieses Muschelöls mit gewöhnlichem Petroleum ausgeschlossen ist.

Meine ursprüngliche Ansicht, das in den Wohnkammern Petrefakten vorhandene Erdöl entstamme direkt den Resten Lebewesen, die sich vor Zeiten in den Wohnkammern derselben aufgehalten hatten, lässt sich nicht aufrecht erhalten, denn einmal ist die Menge des Oeles im Verhältniss zu der in den betreffenden Kadavern enthaltenen organischen Thiersubstanz zu grosse, und dann ist es auffallend, dass sich oftmals auch in anderen, nicht von Wohnkammern der Muscheln etc. umschlossenen Hohlräumen des Muschelkalks, z. B. auf Kluftflächen ebenfalls Petroleum findet.

Man muss sich deshalb die Ansammlung des Petroleums in den Versteinerungen dadurch erklären, dass es durch enormen Druck der einst den Lias überlagernden mächtigen Sedimente der ganzen Juraserie aus dem umgebenden bituminösen Gestein im Lauf einer wahrscheinlich sehr langen Zeit ganz allmählich in die Hohlräume — gleichgiltig ob Wohnkammern oder andere Höhlungen — hineingepresst worden ist, und damit ist vielleicht auch eine weitere Erklärung dafür gegeben, wie in anderen Fällen das natürliche Petroleum aus ganzen bituminösen Gebirgsschichten durch starken Druck in benachbartes poröses Gestein, wie Sandstein, oder Sand hineingepresst wurde, wobei nicht ausgeschlossen scheint, dass im vorliegenden Fall die in nächster Nähe befindlichen sehr bitumenreichen Posidonomyenschiefer, Lias ϵ , mit jenen Petroleum-Einschüssen in Zusammenhang stehen. Zur Kräftigung dieser Auffassung sei an die Versuche von A. Stelcr erinnert, wobei Petroleum aus einer damit getränkten Thonschicht unter einem Drucke von 10 Atmosphären vollständig in eine darunter befindliche Sandschicht gepresst wurde. Andererseits

¹ Zeitschr. f. pr. Geologie 1901, 379.

muss aber auch konstatirt werden, dass gerade diejenigen Schichten des Lias α , also die untersten, welche die Petroleum haltenden Petrefakten aufweisen, auch besonders reich an Versteinerungen sind, wodurch man darauf hingewiesen wird, auch eine Uebertragung aus unmittelbarer Nähe anzunehmen.

Petroleum des Liaskalks von Niedereggenen. Zwischen Schliengen und Badenweiler tritt Lias α zu Tage, welcher abgebaut wird und der ebenso wie derjenige von Roth-Malsch von Muscheln durchsetzt ist, deren Wohnkammern reichliche Mengen eines dickflüssigen Petroleums enthalten. Dasselbe tritt oftmals in solchen Mengen auf, dass es an frischabgesprengten Flächen herunterläuft und aufgesammelt werden kann.

4. Das Bitumen des Liasschiefers (Posidonomyenschiefer) von Langenbrücken und von Boll-Reutlingen. In Rücksicht auf die Möglichkeit des Zusammenhanges der Petroleum-einschlüsse in den Hohlräumen des Lias α mit dem bitumenreichen Schiefer des Lias ϵ , vor allem aber auch wegen der naheliegenden Möglichkeit des Ueberganges solchen Bitumens in Erdöl habe ich in neuerer Zeit auch die eingehende Untersuchung des Liasschiefers von Ubstadt—Langenbrücken in Angriff genommen. Da aber derselbe Schiefer (Lias ϵ) in grösserer Ausdehnung und noch reicher an Bitumen bei Boll und Reutlingen in Württemberg zu Tag tritt, es sich in beiden Fällen also um dieselben geologischen Schichten handelt, wurde für die Untersuchungen insbesondere das Reutlinger Material gewählt, für dessen Beschaffung ich Herrn Dr. Zwiesel in Reutlingen, dem vortrefflichen Kenner der dortigen geologischen Verhältnisse, zu ganz besonderem Danke verpflichtet bin. Die spezielle Durchführung der Versuche hat Herr A. Flachs im hiesigen chemischen Laboratorium übernommen.

Der Schiefer beider Fundstätten, in Baden und in Württemberg, ist übrigens so reich an Bitumen, dass man früher an beiden Orten, bei Ubstadt und bei Reutlingen, Fabriken zur Destillation desselben auf Mineralöl angelegt hatte, welche nur deshalb sich nicht weiter entwickeln konnten und eingingen, weil vom Jahr 1860 ab das amerikanische Erdöl die anderen Mineralöle vom Markte verdrängte.¹ Aus dem Ubstadter Schiefer

¹ Siehe bei Dorn „Der Liasschiefer etc.“ Tübingen 1877.

wurden 5—7 p.C. öliges Destillat erhalten, während der Reutlinger Schiefer nach unseren Versuchen bis über 10 p.C. davon ausserdem $2\frac{1}{2}$ p.C. Gase, ergibt.

Nachdem ich mich durch Vorversuche von der Identität des Bitumens des Lias ϵ bei Langenbrücken und bei Reutlingen überzeugt hatte, gelangte ich zu grösseren Mengen desselben dadurch dass Herr Direktor Wernecke die Freundlichkeit hatte, für mich eine grössere Sendung Reutlinger Schiefer in den grossen Apparaten der Mineralölwerke zu Gerstewitz mittelst Benzols extrahiren zu lassen, wofür ihm auch an dieser Stelle aufrichtiger Dank ausgesprochen sei.

Das nach Verdunsten des Benzols aus dem Schiefer extrahirte Bitumen besitzt braunschwarze Farbe und bei mittlerer Zimmertemperatur salbenartige Consistenz, wird aber bei wenig höherer Temperatur flüssig und zeigt bei 17° das spec. Gew. 0,9714.

Die Analyse des Bitumens ergab die folgenden Resultate:

	I	II	III	Mittel
Kohlenstoff . . .	80,83	80,69	—	80,77 p.C.
Wasserstoff . . .	11,08	11,11	—	11,10 „
Stickstoff . . .	1,22	1,27	1,49	1,32 „
Schwefel . . .	1,13	—	—	1,13 „
Sauerstoff (Diff.) .	—	—	—	5,68 „

Von Wichtigkeit war es nun, um den Zusammenhang des Langenbrücker und Reutlinger Schieferbitumens mit Petroleum zu prüfen, festzustellen, ob in dem Bitumen auch die charakteristischen Nebenbestandtheile des natürlichen Erdöls — Asphalt, Pech und Paraffin — enthalten sind, und in zweiter Linie, ob es gelingt, dieses Bitumen in Petroleum umzuwandeln?

Nach einer von Herrn Alexander Flachs ausgearbeiteten Trennungsmethode, welche auf den älteren Methoden von mir und Böhm, sowie von Holde sich aufbaut, gelang es uns, den ersteren Nachweis in einwandsfreier Weise zu liefern.

Der Asphalt bildet ein tiefschwarzes Pulver, welches erst bei 140 — 145° erweicht und in Benzol vollständig löslich, in Ligroin unlöslich ist. Die Analyse desselben ergab:

	I	II	Mittel
Kohlenstoff	78,68	79,01	78,85 p.C
Wasserstoff	—	8,59	8,59 „
Stickstoff	1,34	1,38	1,36 „
Sauerstoff incl. Schwefel . .	—	—	11,20 „

Um einen Vergleich mit dem Asphalt des natürlichen Petroleums zu erlangen, wurde ein Asphalt von Destillationsrückständen aus Pechelbronner Erdöl nach gleicher Methode ausgeschieden und analysirt, wobei erhalten wurden:

Kohlenstoff	81,75 p.C.
Wasserstoff	7,27 „
Stickstoff	1,84 „
Sauerstoff incl. Schwefel . .	9,14 „

Hieraus ergibt sich zu den übereinstimmenden sonstigen Eigenschaften der beiden Asphalte auch noch die allgemeine Uebereinstimmung in ihrer chemischen Zusammensetzung.

Das Pech des Bitumens bildet ebenfalls eine tiefschwarze Masse, die bei gewöhnlicher Temperatur spröde, bei schwacher Erwärmung weich und elastisch ist. Es löst sich in Ligroin vollständig auf, nicht in Alkohol. Die Analyse ergab:

Kohlenstoff	84,92 p.C.
Wasserstoff	10,85 „
Sauerstoff	4,23 „

Auch diese Eigenschaften und Resultate stimmen in der Hauptsache mit denjenigen des Pechs aus Pechelbronner Erdöl überein. Ausserdem existirt eine nahe Beziehung mit dem von Reicher¹ aus galizischem Erdwachs gewonnenen „Ozokerol“.

Das Paraffin wurde vom Schmelzpunkt 44—45° erhalten, ist in viel Alkohol löslich und von krystallinischer Struktur; es enthält nach der Analyse:

Kohlenstoff	85,54 p.C.
Wasserstoff	14,49 „

Ein bei Ausscheidung der vorstehend beschriebenen drei Stoffe erhaltenes Oel wurde vorerst nicht näher untersucht, besteht aber nach seinem Gesamtverhalten aus einem Gemisch von Kohlenwasserstoffen.

¹ Inauguraldissertation, Bern 1888.

Als ganz besonders bemerkenswerth verdient aber hegehoben zu werden, dass, wenn man das Liasschiefer-Bit nach unserer Methode¹ unter Ueberdruck destillirt, dasselbe fallend leicht zu $\frac{2}{3}$ seines Gewichts ein Destillat liefert, we in seinen wesentlichsten Eigenschaften mit Petroleum übereinsti. Daneben entstehen brennbare Gase, Wasser und als Rück (ca. 16 p.C.) Asphalt und Pech.

Das aus Bitumen gewonnene Erdöl ist dünnflüssig, schlichbraun gefärbt, in dünner Schicht durchsichtig und von stgrünlicher Fluorescenz; spec. Gewicht bei 15°: 0,8742. Normal-Destillation ergab folgende Produkte:

Siedebeginn bei 60°.

Von 60—100°	4,0	Vol. p.C.
„ 100—150°	14,8	„ „
„ 150—200°	11,9	„ „
„ 200—250°	15,0	„ „
„ 250—300°	15,5	„ „
Ueber 300°, Differenz .	38,8	„ „

Aus dem unter 200° siedenden Theil des Destillates kon bis jetzt die folgenden Bestandtheile isolirt werden:

Kohlenwasserstoffe der Methanreihe: Pentan, Heptan, Octan und Nonan, festes Paraffin (8,45 p.C.) vom Schmpunkt 50—54°.

Ungesättigte Kohlenwasserstoffe: Olefine etc. wu sowohl mittelst Borom als auch durch Absorption mit Schw säure bestimmt. Deren Menge stieg von 32 Vol. p.C. in Frac 60—100° auf 60 Vol. p.C. in Fraction von 150—200°, wobei d Zunahme des spec. Gewichtes nachgewiesen werden konnte, beim längeren Stehen eine Selbstpolymerisation dieser Kohlenwasserstoffe eintritt, wodurch bekanntlich die Bildung der natürlichen Petroleum enthaltenen Schmieröle erklärt werden kann.

Von aromatischen Kohlenwasserstoffen konnten Benzol und Toluol nachgewiesen werden, doch sind jedenfalls auch noch höhere Homologe anwesend.

Die sämmtlichen vorstehend nachgewiesenen Bestandtheile des Druckdestillates aus Bitumen sind auch im natürlichen Erdöl

¹ Ber. d. D. Chem. Ges. Bd. 21, 1818.

thalten, und ihre Anwesenheit beweist deshalb auch die nahen Beziehungen zwischen Bitumen und Erdöl.

Die Menge Erdöl, welche nur allein aus diesen in ihrem Umfang schätzungsweise bestimmten Posidonomyenschiefern des Landes bei Ubstadt-Langenbrücken und bei Boll-Reutlingen entnommen könnte, sobald dieselben durch Hebungen und Senkungen und dabei eintretende Verwerfungen und Eintauchen in tiefere wärmere Zonen unter die Bedingungen des Druckes und der Temperatur zur Umwandlung in Petroleum gelangen, lässt sich auf Tausende von Millionen Centnern schätzen und beträgt jedenfalls mehr als die Petroleumfelder der Karpathen (Galizien) schätzungsweise aufweisen, nicht zu rechnen die gewaltigen Massen von bituminösen Schichten, die unserer Wahrnehmung entgehen.

Dass übrigens auch an anderen Orten das Petroleumvorkommen mit dem Vorhandensein von bituminösen Schichten in engem Zusammenhang steht, ist auch schon von Anderen hervorgehoben worden. Besonders Professor Szajnocha¹ in Krakau hat neuerdings diesen Zusammenhang eingehend für das galizische Petroleum begründet und dabei auf das Bitumen der gewaltigen Abagerungen der Menilitschiefer der Karpathen hingewiesen. Durch meine freundliche Vermittlung war es mir möglich, mit Dr. Rankenstein den Bitumengehalt einer Reihe solcher karpathischer Schiefer festzustellen, wobei folgende Gehalte an Bitumen gefunden wurden:

Schiefer von						
	Kotaczyce	Krosienko bei Krosno	Strzytka b. Dniasha	Tartarow	Skopow a. Saufluss	Delatyn a. Prut
Bitumen	1,8	2,2	7—8	8,2	8,5	9,1 p.C.

Auch dieses Bitumen, ein Restproduct vormaliger Lebewesen, bildet einen gewaltigen Vorrath an einem Material, aus dem sich unter geeigneten Bedingungen jederzeit Petroleum bilden kann.

Betrachtungen über die Bildung des Petroleums im Rheinthal.

Durchschlagende Gründe sprechen dafür, dass sich das Petroleum des Rheinthalles ebenso wie dasjenige der meisten übrigen

¹ „Naphta“ 1899.

**Fundstätten aus den Fettresten einer untergegangenen Fa
gebildet hat.**

Die Begründung dieser Hypothese, welche zuerst Leopold von Buch aufgestellt und neuerdings namentlich Hoefer durch Heranziehung geologischer Befunde vertreten wurde, habe ich in einer Reihe von Abhandlungen,¹ gestützt auf zahlreiche Experimente, welche die Ueberführbarkeit thierischer, auch pflanzlicher, Fettstoffe in Petroleum zeigen, gegeben. Es kann hier auf diese ausführlichen Arbeiten nicht nochmals zurückgegriffen werden; eine drängte Zusammenstellung der wichtigsten Sätze, zu denen auf Grund langjähriger Studien und einer an die zitierten Arbeiten angeschlossenen wissenschaftlichen Diskussion über den Chemismus jenes natürlichen Bildungsprozesses gekommen bin, möge genügen.

1. Das Petroleum ist aus der Fettsubstanz und abgestorbener Lebewesen entstanden, nachdem die übrige organische Substanz derselben durch Fäulniss und Verwesung sich zersetzt hatte. Ausser Fettstoffen kommen noch Wachs, Harze und ähnliche Stoffe, indessen nur zurü tretend, in Betracht.

2. Zu den Fettresten hat fast ausschliesslich marines Lebewesen beigetragen, und zwar a. die gewöhnliche marine Fauna, Fische, Saurier, Weichthiere etc.; b. nieder organisierte Lebewesen, besonders die Mikrofauna und das Plankton des Meeres, wobei pelagische Foraminiferen, Radiolarien, Globigerinen, Pteropoden, Diatomeen etc. vor Allem in Betracht kommen.

3. Binnenpflanzenreste, welche man früher der Petroleumbildung zu Grunde legte, spielen nur ganz ausnahmsweise eine Rolle, doch nicht durch ihre spezifisch pflanzliche Zellsubstanz, sondern zu Folge Ansammlung von Fett, Wachs, Harz etc. in denselben.

4. Die Umwandlung der Fettstoffe in Erdöl hat sich un
sehr verschiedenen äusseren Bedingungen des Druckes, der Te

¹ Ber. d. Deutsch. chem. Ges. Bd. 21, 1816; 22, 592; 26, 1449; 28, 2530, 2858, 2365, 2908, 2921; 33, 7. Chem Ind. 1895, Nr. 1 u. 2. 1902, Nr. Zeitschr. f. Ang. Chem. 1901, Nr. 36, 37. Chem. Zeitg. 1901, Nr. 99. Jou of the Americ. Chem. Soc. Bd. 15 Nr. 7. Internat. Petrol. Congress, Pa 1900, II Rep.

eratur und in sehr verschieden langen Zeitperioden vollzogen und war demgemäss je nach Umständen ein rascher oder, wie wohl meistens, ein nur ganz allmählich verlaufender Prozess, dessen erstes Stadium aber wahrscheinlich die Ausscheidung freier Fettäuren durch Wasser gewesen ist.

5. Die langsame Umwandlung des Fettes in Erdöl zwingt zur Annahme von Zwischenprodukten.

6. Das Bitumen ist als ein solches Zwischenprodukt anzusehen, welches theilweise schon fertige Erdölbestandtheile, insbesondere festes Paraffin, Asphalt, Pech, auch schon flüssige Kohlenwasserstoffe enthält; es geht durch Druckdestillation leicht in Petroleum über.

7. Die Erdöle verschiedener Fundstätten enthalten im allgemeinen dieselben Bestandtheile, d. h. gesättigte Kohlenwasserstoffe der Methan- und der Naphten-Reihe, Olefine, Terpene und zahlreiche noch ungesättigtere Kohlenwasserstoffe, namentlich Benzol und seine Homologen Toluol, Xylol, Cumol etc., ferner sauerstoffhaltige Verbindungen, wie organische Säuren (Petrolsäuren), Ketone, Alkohole etc., Asphalt und Pech, endlich immer auch geringe Mengen schwefelhaltiger Körper und stickstoffhaltiger Basen (Pyridinkörper).

8. Die verschiedenen natürlichen, scheinbar so sehr verschiedenen Petroleumsorten unterscheiden sich hauptsächlich nur durch die relative Menge dieser Bestandtheile.

9. So wie schon die Aenderung der äusseren Bedingungen bei Druckdestillation Druckdestillate ganz verschiedener Zusammensetzung aus ein und demselben Fettstoff ergibt, so ist auch die grosse Verschiedenheit der einzelnen natürlichen Erdölsorten in der Hauptsache nur durch die verschiedenen Bildungsbedingungen — des Druckes, der Temperatur und der Zeit — verursacht und nur in untergeordnetem Grade durch die Fette, Harze oder das Wachs verschiedener Abstammung.

Es darf konstatirt werden, dass jetzt — abgesehen von noch wenigen Vertretern der Emanationstheorie — die namhaftesten Forscher auf dem Gebiet der Genesis des Erdöls, so vor allem Schöfer, Stahl, Zaloziecki, Szainocha u. A., darin miteinander übereinstimmen, dass es den Fettresten mariner Lebewesen entstammt und nur Krämer, allerdings einer der hervorragenden

Kenner der Chemie und Abstammung des Petroleums, weicht insofern noch ab, als er den Prozess in Binnenseen verlegt, die in Erdeinsenkungen durch die aus den Gebirgen herabströmenden Regenwassermassen gebildet haben und in denen Diatomeen wucherten, deren Fett- bzw. Wachsreste es aber dann eben waren, aus denen das Erdöl entstand.

Abgesehen jedoch davon, dass auch nach dieser letzten Auffassung die Fettreste längst untergegangener und in der übrigen organischen Substanz zersetzter Lebewesen, das Material abgegeben und dass vielleicht da oder dort sich kleine Petroleumlager auf diesem Wege gebildet haben, lassen sich die Abstammung der Hauptmassen des Erdöls aus dem Meer durchschlagende Gründe anführen¹, dass man sehr wohl den gesuchten Vorgang in die Worte zusammenfassen darf: aus dem Meeresfett hat sich das Petroleum gebildet.

Welche Lebewesen dazu das meiste Fett geliefert haben muss noch als unentschieden gelten, denn während die Einen vorwiegend die marine Fauna dazu heranziehen, legen Andere grosses Gewicht auf die marine Flora; zumal, wenn man noch die Diatomeen, diese mikrobischen „Pflanzenthiere“, man sie früher bezeichnete, der letzteren zuzählt.

Das Wahrscheinlichste ist, dass für die Bildung des Erdöls diese Faktoren in Betracht gezogen werden müssen und dass an den verschiedenen Orten, an denen wir dasselbe vorfinden, es überall aus denselben Lebewesen entstanden ist. Im Allgemeinen aber sprechen, wie vor Allem Höfer nachgewiesen, geologische Gründe dafür, dass das Oel mariner Fauna stammt, wobei, wie schon oben bemerkt, nicht sowohl die Makro- als vor allem auch die Mikro-Fauna, und besonders Plankton, herangezogen werden muss. Fast jede Differenz der Konzentration des Salzwassers zweier miteinander in Kommunikation stehenden Seen muss mit der Zeit die Bildung einer Bitumenablagerung zur Folge haben dadurch, dass das eine Becken gegenüber dem anderen einen alles Leben abtötenden sogenannten azoischen Behälter darstellt. So sieht man alljährlich zur Laichzeit in der Bucht des Adjidaria am Kaspischen Meer Millionen Fischen zu Grunde gehen und allmählig von Wüstenstaub bedeckt

¹ Siehe u. a. Ber. d. deutsch. Chem. Ges. 1900 p. 7 u. f.

den, weil die Thiere des salzärmeren Wassers des grossen es in dem salzreicheren Wasser der Bucht nicht leben können. n einer ähnlichen Stelle im Norden von Amerika wird mir aerdings berichtet. Vornehmlich grössere oder kleinere Buchten ten sonach Bedingungen für Bitumen- und Petroleumbildung, bei auch an zeitweise Abschnürungen und Wiederfüllung solcher chten vom Hauptmeer im Sinne von Stahl oder von hsenius gedacht werden muss. Auf solche azoisch wirkende enzustellen zwischen Süsswasser und Meerwasser im ehemaligen einthalbecken macht besonders auch van Werveke aufmerksam.

Nach den Untersuchungen von Andrussow gibt es aber auch freien Meer sogenannte azoische Stellen, in denen alles hinein- angende thierische Leben zu Grunde geht, auch bildet sich in deren Meeren, wie allem Anschein nach z. B. dem rothen Meer ch Ueberproduktion der dort so stark entwickelten Meeresfauna einzelnen Stellen gewissermassen unter unseren Augen Erdöl.

Von grösster Bedeutung aber dürften für die Ansammlung n Bitumen die zuerst von Zaloziecki betonten Meeres- ömungen gewesen sein, die in früheren Epochen eine viel össere Rolle gespielt haben müssen und durch welche an ruhigen tellen des Meeres, vor allem also wieder in Einbuchtungen, osse Flächen mit abgestorbenen Resten der Makro- und Mikro- ana des Meeres sich bedeckten, mit Schlamm und Sand sich rmischten und bituminöse Sedimentärschichten bildeten.

Dass andererseits auch aus niederorganisirten Pflanzen, so besondere aus den Diatomeen, auf welche Otto N. Witt erst hinwies, in der Art und Weise wie sich dies Stahl denkt, abgeschnürten Meeresbuchten, Erdöl sich gebildet haben kann, soll ht in Abrede gestellt werden, ja es ist nicht ausgeschlossen, ss auch in offenen Buchten des Meeres solche Diatomeenwuche- ngen zur Bildung von Bitumenablagerungen geführt haben. mer aber bleibt es das Meeresfett, welches wir zur ldung des Erdöls heranziehen müssen, dessen Um- andelbarkeit in Erdöl wir zuerst experimentell nach- wiesen und auf dessen Heranziehung zur Erdölbildung ir zuerst als unumgänglich hingewiesen haben.

Auch hinsichtlich des Rohmaterials, aus dem sich das Petro- um des Rheinthals mit Wahrscheinlichkeit gebildet hat, zeigen st alle Beobachtungen, dass ein inniger Zusammenhang besteht

zwischen seinem Vorkommen und dem Vorhandensein von geologischen Schichten, die reich sind an fossilen Einschlüssen untergegangener Lebewelt, namentlich sind es petrefaktenreiche Sedimente des Lias und Tertiärs, auf die man hingewiesen.

Es erwächst daraus für den vorliegenden Fall die Frage, ob das Petroleum den beiden genannten geologischen Formationen entstammt, oder ob es nur aus einer der beiden entstanden sein könnte.

Dass das Petroleum nur aus Bitumen des Tertiärs entstanden sein könnte, ist von vornherein ausgeschlossen, denn thatsächlich wird wiederholt Petroleum in Einschlüssen des Lias aufgefunden, in die es aus dem viel jüngeren Tertiär unmöglich hätte gelangen können. Alle Wahrnehmungen sprechen weitestens dafür, dass dieses Petroleum den Liasschichten selbst entstammt.

Kann aber vielleicht das Erdöl des Rheinthals allein aus dem Lias entstanden und nur durch Dislokation in das Tertiär Hauptfundstätten gekommen sein? Eine solche Möglichkeit ist sicherlich von vornherein nicht ausgeschlossen, denn da die tertiären Ablagerungen im allgemeinen über dem Lias liegen, kann sehr wohl bei starkem Gebirgsdruck das Petroleum nach unten gepresst worden und in höher liegende poröse Tertiärschichten gelangt sein. Dabei fällt sicherlich auch die Thatsache mit ins Gewicht, dass Petroleum im Tertiär sich hauptsächlich an solchen Stellen findet, an denen es durch Bewegungen in den unterliegenden Formationen starke Verwerfungen erfahren hat, besonders in den Parallelspalten der Vogesen; auch ist mehr Oel an Stellen konstatiert worden, an denen das Tertiär Muschelkalk aufsitzt, niemals aber in Buntsandstein, der sich kein Oel liefern, dasselbe aber auch nicht von darunter liegenden Schichten empfangen kann, Verhältnisse, auf die besonders Piedboeuf¹ hinweist.

Durch meine in Gemeinschaft mit A. Flachs ausgeführten Versuche wurde der Nachweis erbracht, dass das Bitumen des Lias beim Erwärmen unter starkem Druck auffallend leicht in völlig dünnflüssiges Petroleum übergeht. Es kann als sehr wahrscheinlich gelten, dass starker Druck und Zeit allein dasselbe bewirken, wozu beim Experiment im Laboratorium auch noch Erwärmung nöthig ist. Jedenfalls können auch

¹ Piedboeuf, Petrol. Central-Europa's, Düsseldorf 1883 p. 37.

von kleine Temperaturerhöhungen, wie sie bei dem abwechselnden Heben und Senken der Gebirgsschichten und bei Überlagerung durch mächtige Sedimente, welche die Geoisothermen steigen lässt, angenommen werden dürfen, für eine solche Umwandlung ausreichen, zumal da bei eintretenden Senkungen und Verwerfungen der Gebirgsschichten ganz enorme Druckwirkungen auftreten müssen. Und dass in der That in den Regionen des Lias α z. B. von Roth-Malsch solche enorme Drucke herrscht haben, lässt sich schon daraus erkennen, dass das Einpressen des Erdöls in die Wohnkammern der Muscheln und Ammoniten, oder in andere Hohlräume des Gesteins einen derartigen ausserordentlichen Druck zur Voraussetzung hat. Dieser hohe Druck ist auch daran kenntlich, dass das Oel beim Aufplatzen dichter Stücke des Kalksteins aus den dadurch offenen kleinsten Muscheln oftmals geradezu mit Gewalt herausstritzt. — Der gewaltige Druck der in allen Petroleumlagern herrscht, so in Amerika, Galizien und bei Baku, durch den Petroleum-Fontänen von über 100 m Höhe herausgetrieben und Steine in Bohrlöchern von 500 und mehr Meter Tiefe über 200 m in die Luft emporgeschleudert werden, ist ein deutlicher Beweis dafür, dass in den Petroleum-führenden Schichten ganz enorme Druckverhältnisse obwalten.

Jedenfalls ergeben diese Betrachtungen, dass es nicht bloss wohl möglich, sondern sehr wahrscheinlich ist, dass wenigstens in vielen Fällen das Petroleum aus den unterliegenden kohlensauren Liasschichten in die überliegenden lockeren und porösen Tertiärschichten emporgepresst wurde, was nicht ausschliesst, dass auch im Tertiär selbst Erdölbildungen vor sich gegangen sind.

Ueberhaupt findet sich ja Petroleum in den verschiedensten, von den jüngsten bis zu den ältesten Formationen: in Galizien z. B. im jungen Tertiär, in Pennsylvanien in den alten Schichten des Silur und Devon; Anwesenheit von Bitumen und Druck, event. massige Wärmegenügen als Vorbedingungen für den Bildungsvorgang.

Unter allen Umständen steht aber fest, dass das Vorkommen des Petroleums im Elsass ausschliesslich an das ältere Tertiär, das Oligocän, gebunden ist und überall da, wo Petroleum gesucht wird, geht man deshalb ganz richtig von dieser Formation aus, nicht bloss im Elsass, sondern auch in Baden.

Tertiäre Ablagerungen finden sich auf beiden Seiten Rheinthals, zumeist an der Lehne der beiden grossen Gebirgsgaben gegen das Rheinthal zu, von sehr verschiedener, zumeist jedoch nicht sehr grosser Ausdehnung: auf der linken Seite auf Linie Montbéliard - Masmünster - Mülhausen - Colmar, dann stärkeren Resten von Hagenau-Weissenburg bis Neustadt a. d. Mos., die sich mit wenig Unterbrechungen bis zu dem Hauptdepot Mainzer Beckens fortsetzen. Viel geringer ist die Tertiärbildung auf der rechten Rheinseite vertreten, wo wir in Baden nennenswertere Ablagerungen nur bei Lörrach-Haltingen, Kirchhofen, Freiburg, bei Ubstadt und bei Grosssachsen, ausserdem kleinere Schollen haben.

Ein Unterschied zeigt sich aber auf beiden Rheinseiten darin, dass man im Elsass schon an sehr vielen Stellen Tertiär Petroleum gefunden hat, während dasselbe auf badischer Seite bis jetzt noch fehlt. Von Oelfunden des Elsass sind zu erwähnen diejenigen von Hirzbach und Hirsingen, Altkirch, vor Allem aber die zahlreichen und in Ausbeute begriffenen Aufschlüsse westlich und östlich der Linie Hagenau - Sulz u./W.-Weissenburg, bei den Orten Pechelbronn, Schwabmünchen, Ohlungen, Biblisheim, Merkweiler, Dürrenbach, Walburg im Oberstrittener Gebiet, worüber schon weiter oben berichtet ist. In ganz erheblicher Ausdehnung kommen ausserdem bitumenreiche, ebenfalls dem Oligocän angehörige Fischschichten vor, so namentlich — nach freundlicher Mittheilung des Hrn. Oberbergrath Braubach in Strassburg — bei Altkirch, Bußweiler O.-E., Ottingen (Kreis Altkirch) und bei Obersteinbrunn, Rautweiler, Dietweiler, Geisspitzen, Uffheim und Niedermagen des Kreises Mülhausen. Eine Reihe von Fundorten von Elsass ist verzeichnet ausserdem Piedboeuf¹, so in der Gegend von Schlettstadt bei Bergheim, St. Bilt, Roderen, Echery bis St. Cloud über der Grenze, auch bei Mutzig und Molsheim, wobei es jedoch nur um ganz geringfügige Ausbeute handeln kann.

Die erwähnten tertiären Ablagerungen, die vielfach nur in kleinen Schollen vorhanden sind, bilden die Reste tertiärer Schichten, welche einstmals wahrscheinlich das ganze Rheinth

¹ a. a. O. p. 36 (Karte).



Brennende Naturgas-Quelle bei Büchelberg.

bedeckten und die sich aus dem Tertiärmeer des Rheinthales abgesetzt hatten.

Hat man bis jetzt grössere Aufschlüsse von Petroleum hauptsächlich erst in dem Vorlande der Vogesen gemacht, so ergibt sich aus den vorstehenden Ausführungen dennoch die Möglichkeit, dass auch in der Ebene des Rheinthales, mehr dem Rheinstrom zu, ebenfalls Petroleum sich findet. In erster Reihe an denjenigen Stellen, an denen tertiäre Erhebungen vorhanden sind und nachgewiesen werden können, lässt sich, gleichgiltig, ob das Tertiär das Petroleum nur aus anderen Schichten aufgenommen oder selbst gebildet hat, Petroleum erwarten.

Es kann desshalb in Rücksicht darauf, dass für Deutschland weitere Petroleumquellen sehr erwünscht sein müssen, nur dankbar begrüsst werden, dass der sehr unternehmende Fabrikbesitzer Carl Ringwald aus Emmendingen im pfälzischen Bienwald etwa in der Mitte der Linie Weissenburg-Karlsruhe, 7 Kilometer Luftlinie von beiden Orten entfernt, in welcher Richtung sich eine tertiäre Schwelle von Weissenburg her in das Rheinthale hineinzieht, Bohrungen auf Petroleum ins Leben gerufen hat, die bis jetzt zwar kein Oel, wohl aber bedeutende Gasausbrüche mit Spuren ergeben haben. Auf Anrathen Prof. Sauer's hat man mit den Bohrungen im Jahr 1897 in der Nähe des Dorfes Büchelberg begonnen. Diese Bohrungen gingen nicht tief genug, ergaben indessen fast stets mehr oder weniger erhebliche Gasausbrüche. Vom Jahr 1899 ab ging man auf Anrathen des Landesgeologen Thürrach mit tieferen Bohrungen vor. Das erste zweier Bohrer erreichte in der Nacht vom 11. zum 12. Dezember 1900 bei einer Tiefe von 290 m eine Gasansammlung von solcher Spannung, dass das Gas mit grösster Gewalt durch das Bohrloch herausgetrieben wurde und sich an einer oben im Bohrthurm hängenden Laterne entzündete, bevor es möglich gewesen wäre, den Ausbruch durch Verschluss des Bohrloches zu hemmen. Der Bohrthurm brannte ab und nur mit grosser Mühe gelang es, die anfänglich viele Meter hoch aus dem Bohrloch emporschlagende Flamme nach zwei Tagen zu löschen (siehe die Tafel). Etwa 14 Tage lang drang das Gas mit grosser Gewalt hervor, ohne bis heute völlig aufzuhören.

Das von mir an Ort und Stelle aufgesammelte Gas zeigte die folgende Zusammensetzung:

	I	II	
Methan	79,6	79,8	Vol. p.C.
Aethan	3,17	2,9	" "
Olefine	—	—	" "
Kohlensäure	Spuren	Spuren	" "
Sauerstoff	2,3	2,7	" "
Stickstoff	14,4	14,6	" "

Vergleicht man mit diesen Analysen diejenigen der Er-
gase von Pechelbronn, so lässt sich die nahe verwandtschaftl.
Beziehung beider nicht verkennen, zumal wenn man beri-
sichtigt, dass bei den viel früher ausgeführten Analysen mit
Pechelbronner Gasen gemäss damaliger Untersuchungsmeth.
das Aethan theilweise oder ganz als Olefin gefunden werden mu-
und eine genaue vergleichende Prüfung auf Kohlenoxyd n
ausgeführt werden konnte.

Das Bohrloch wurde später auf 760 m niedergetrieben, er-
wohl bei 350 m Oelspuren, jedoch aber keine grössere Menge
ebenso auch ein anderes Bohrloch nicht, mit dem man auf
bis 580 m niederging. Aber auch hier zeigten sich ziemlich sta-
Gasausbrüche sowie auch Oelspuren.

Zur Zeit wird ein Bohrloch bis auf 1000 m niedergetrie-
und man kann nur wünschen, dass diesem energischen Vorge-
Erfolg beschieden sein möge.

Entstammen die Jura-Ablagerungen mit den bitumenreic-
Schichten des Lias α und ϵ der Zeit, in welcher noch ganz S-
westdeutschland einen Theil des Meeres bildeten, das besond-
in der Periode des Lias einen ungewöhnlichen Reichthum
mariner Fauna aufwies, so hat man sich zu vergegenwärtig-
dass in der auf den Jura folgenden Epoche der Kreide
dieses Lias- und das ganze Jurameer grossentheils verschwun-
war und dass sich an der Stelle des heutigen Schwarzwald-
und der Vogesen und über das ganze jetzige Rheinthal hin-
von der Maas bis gegen Regensburg eine gewaltige continent-
Erhebung wölbte, durch die sich das Fehlen der Kreide
diesem Gebiete erklärt. Nun aber begann der Einbru-
etwa in der jetzigen Längsachse des Oberrheines und es bild-
sich eine langgestreckte Bucht, die von Norden her bis in
Gegend von Basel und Belfort sich landeinwärts erstreckte u-
deren obere Ufer durch die nicht eingesunkenen Theile d

Schwarzwaldes und der Vogesen, weiter oben durch den Jura gebildet waren.

Auch in diesem mit dem offenen Meer im Norden noch in voller Kommunikation stehenden Tertiärmeer entwickelte sich wieder eine üppige Flora und Fauna und es bildeten sich theilweise sehr bituminöse Ablagerungen, wie sie sich namentlich im ältern Oligocän z. B. in den Fisch-Schiefern der Kreise Altkirch und Mülhausen, noch heute zeigen. Vom ältesten Tertiär, dem Eocän, finden sich noch nennenswerthe Reste im Mainzer Becken und bei Altkirch, während das nächstältere Oligocän an zahlreichen Stellen der Lehnen der beiden Gebirgszüge rechts und links des Rheines erhalten ist. Meeressand, der die Grundlage bildet und Septarienthon¹ sind die charakteristischen Merkmale dieser älteren Tertiärzeit, in welcher die gesammte reiche Lebewelt der langgestreckten mit Salzwasser erfüllten Meeresbucht mariner Natur war. Von Pflanzenresten ist nach Höfer in den in Frage kommenden Schichten nichts zu finden.

Indem sich aber allmählig das rheinische Schiefergebirge erhob und nördlich des Mainzer Beckens sich quer vor die Oeffnung des Tertiärmeeres legte, dasselbe mehr und mehr von dem nördischen Meer abschnürte, während der Rhein bei dem langsamen Hebungsprozess seinen Lauf in der Hauptsache beibehielt, in das mehr und mehr sich erhebende Schiefergebirge sich einwühlend, kam es zum vollständigen Abschluss des Rheinthalsees gegen das Meer, das salzige Wasser wurde allmählig ausgesüsst und schliesslich durch zufließende Süßwasser ersetzt; es bildete sich brackisches Mischwasser mit dem charakteristischen Cyrenenmergel, und in der letzten Tertiärzeit ein vollständiger Süßwassersee, der sich allmählig ausfüllte und trockenlegte: das jetzige Rheinthal mit dem dasselbe durchfließenden Rheinstrom und dem Durchbruch bei Bingen zum Meer.

Dabei hat man sich vorzustellen, dass der zur Bildung des Tertiärmeeres und des jetzigen Rheinthalles führende Einbruch keineswegs plötzlich, sondern nur sehr allmählig, im Verlauf von Jahrtausenden, vor sich ging und dass dieser Prozess an einzelnen Stellen zu sehr verschiedenen Zeiten und mit verschiedenen Ge-

¹ Siehe bei Lepsius „Das Mainzer Becken“, Darmstadt 1883 p. 31, 76, 78 u. f.

schwindigkeiten erfolgte. Auch die Absturztiefen sind sehr verschieden. Der Absturz erfolgte in der Weise, dass beiderseits die jetzigen Gebirgszüge des Schwarzwaldes und der Vogesen als Horste stehen blieben und dass sich die diesen vorliegenden Schichten senkten, theilweise ganz in die Tiefe stürzten, theilweise aber auch an den Verwerfungen in höheren Lagehängen liegen blieben, wie dies z. B. auch die zahlreichen noch vorhandenen Ablagerungen des Jura und der Trias zeigen. Jedenfalls hat sich in der Mitte der Einsenkung eine tiefe Furche gebildet, die sich später mit Diluvial- und Alluvialgeröll anfüllte, dessen Tiefe grösstentheils noch nicht ergründet ist. Auch der grösste Theil des Tertiärs, insoweit dasselbe nicht weggewaschen war, ist dadurch bedeckt. Das Rheinthal bildet sonach einen tiefen Graben, in welchen die Gebirgsmassen, die früher Schwarzwald und Vogesen verbanden, eingesunken sind und in dessen Tiefe sich alle Sedimentärschichten, wenn auch stark verworfen und theilweise zertrümmert, wieder finden, die die Elemente der beiderseitigen Gebirgszüge bilden. Auch Tertiärmassen finden sich dabei, wie wiederholte Bohrungen im Rheinthal ergeben haben.

Noch aber herrscht keine Ruhe; die zahlreichen Erdbeben sind Symptome des weiterschreitenden Wechsels in der Gestaltung der Erdoberfläche, neue Senkungen und Faltungen entstehen, neue Hebungen finden statt, und ebenso, wie es nicht ausgeschlossen ist, dass weitere Nachforschungen neue Lager von Bitumen und Petroleum in einzelnen zur Zeit verdeckten tertiären, vielleicht auch in anderen lockeren Gebirgsmassen auffinden lassen, ebenso ist es möglich, dass durch zukünftige Dislokationen und dadurch hervorgerufene gewaltige Gebirgsdrucke neue Petroleumvorräthe aus den noch vorhandenen bituminösen Schichten gebildet werden, die porösen Gesteine durchtränken und dann zu Tage treten.

Erasmus Darwin

von

Dr. Walther May

Privatdozent der Zoologie an der Technischen Hochschule.

Eines der merkwürdigsten Beispiele für die Vererbung geistiger Eigenthümlichkeiten bieten Erasmus und Charles Darwin. Es ist dies Beispiel um so interessanter, als hier die Vererbung nicht vom Vater auf den Sohn, sondern vom Grossvater auf den Enkel erfolgte. Eine kurze Analyse der Werke Erasmus Darwins wird die weitgehende Geistesverwandtschaft zwischen Grossvater und Enkel erkennen lassen. Ehe ich aber zu dieser Analyse übergehe, will ich einige Worte über den Lebensgang des Grossvaters vorausschicken.

Erasmus Darwin wurde im Jahre 1731 auf dem Landgute Eton Hall in der Grafschaft Nottingham geboren. Er studirte Medizin in Cambridge und Edinburg, denselben Universitäten, auf denen später sein grosser Enkel seine theologischen und medizinischen Studien absolviren sollte. Nach Erlangung des Baccalaureats liess er sich in Nottingham als Arzt nieder, da er aber dort keine genügende Praxis erhielt, so siedelte er bald nach Lichfield in der Grafschaft Staffordshire über, wo er ein angesehenener und beliebter Arzt wurde. Hier verheirathete er sich auch, und von den fünf Söhnen, die dieser Ehe entsprossen, wurde einer der Vater Charles Darwins. Elf Jahre nach dem Tode seiner ersten Frau verheirathete sich Erasmus zum zweiten Male und nahm dann seinen Wohnsitz in Derby, wo er 1802 im Alter von 71 Jahren starb.

Erasmus Darwin zeigte schon in früher Jugend eine starke Neigung zu dichterischer Thätigkeit und zu mechanischen Künsten, zwei Geistes Eigenschaften, die sich nicht auf seinen Enkel vererbt haben. Ueberhaupt sollen beide Männer in mancher Hinsicht sehr verschieden gewesen sein, wie sie sich denn auch in ihren Gesichtszügen nicht glichen. Gemeinsam dagegen war beiden die starke spekulative Ader, die lebhaft e Einbildungs-

kraft, die Neigung zum Verallgemeinern und Theoretisiren. Doch bestand hier auch wieder der Unterschied, dass bei Charles Darwin diese Neigung viel mehr durch exakte Beobachtungsthätigkeit gezügelt und in Schranken gehalten wurde als bei Erasmus Darwin. Charles Darwin vereinigte in sich die lebhafteste Einbildungskraft seines Grossvaters und das ausgezeichnete Beobachtungsvermögen, den strengen Thatsachensinn seines Vaters.

Der gemeinsame spekulative Zug führte Grossvater und Enkel vielfach zur Behandlung derselben Probleme. Mit Recht konnte Ernst Krause¹, der Biograph des Erasmus, sagen, dass sich jedem einzelnen Werk des Enkels wenigstens ein Kapitel in den Werken des Grossvaters an die Seite stellen lässt. Die Behandlungsart war freilich bei beiden oft sehr verschieden, besonders insofern, als Erasmus Darwin einen grossen Theil seiner Ansichten und Lehren in poetische Form gekleidet hat. Gleich sein erstes naturphilosophisches Werk ist ein sogenanntes Lehrgedicht. Es betitelt sich „Der botanische Garten“ und zerfällt in zwei Theile, von denen der erste „Die Oekonomie der Vegetation“ 1791, der zweite „Die Liebe der Pflanzen“ bereits 1788 erschien. Die Veranlassung zu diesem Gedicht war folgende: Erasmus Darwin hatte in einem kleinen, schattigen, von einem Bache durchflossenen Thälchen in der Nähe Lichfields einen botanischen Garten und eine Kaltwasserheilanstalt angelegt. Eine Freundin machte ihn darauf aufmerksam, wie sehr sich dieses Idyll zu einer poetischen Verherrlichung eignen würde. Darwin folgte dieser Anregung und schrieb das erwähnte Gedicht. Es ist ein Lehrgedicht nach Art des berühmten Werkes von Lucretius Carus „De natura rerum“, dem auch das Titelmotto entnommen ist. Unter und hinter dem Texte finden sich aber zahlreiche Anmerkungen in Prosa, die das im Gedichte Gesagte weiter ausführen. Das Werk fand einerseits eine sehr günstige Aufnahme, andererseits forderte es die poetische, naturphilosophische und politische Kritik stark heraus. Man spottete über die beschreibende und malende Poesie nicht weniger als

¹ Vergl. Ernst Krause, Erasmus Darwin und seine Stellung in der Geschichte der Descendenztheorie. Mit seinem Lebens- und Charakterbilde von Charles Darwin. Leipzig, Ernst Günther's Verlag, 1880. Diesem Buche sind auch die von Becker und Kösting übersetzten poetischen Citate entnommen.

über die originellen naturphilosophischen Ideen, und weil Darwin die französische Revolution in seinem Gedichte verherrlicht hatte, parodirten deren Gegner seine Ansichten in einem Spottgedicht: „The Loves of the Triangles“.

Das Gedicht Darwins beginnt mit einer Einleitung in Prosa, in der der Verfasser seinen naturphilosophischen Standpunkt zu rechtfertigen sucht. „Es mag hier am Orte sein“, schreibt er, „manche der folgenden Vermuthungen über einige Gegenstände der Naturphilosophie im Voraus in Schutz zu nehmen, weil sie nicht durch genaue Untersuchung oder beweisende Experimente unterstützt werden. Indessen sind in den Theilen der Philosophie, wo unsere Kenntniss noch unvollkommen ist, ausschweifende Theorien nicht ohne ihren Nutzen, insofern sie zur Ausführung schwieriger Experimente oder zur Verfolgung geistreicher Schlüsse Muth machen, sei es nun, um sie zu befestigen oder um sie zurückzuweisen.“ Diese geistreichen Worte über die Bedeutung der wissenschaftlichen Theorien erinnern an manche Aussprüche Charles Darwins über denselben Gegenstand.

Der erste Theil des Gedichtes zerfällt in vier Gesänge, in denen die Entstehung und Entwicklung der Welt sowie das Walten der Naturkräfte des Feuers, der Erde, des Wassers und der Luft im Allgemeinen geschildert wird. Der Inhalt entspricht also wenig dem Titel „Die Oekonomie der Vegetation“.

Zunächst erscheint die Göttin der Botanik im botanischen Garten bei Lichfield und stattet dem Genius loci einen Besuch ab. Sie wird von den vier Elementargeistern huldigend begrüßt:

„Sie naht die Göttin! durch die leise Luft
Rauscht ihr Gefährt in Morgenroth und Duft.
Ein jedes Rad umfängt ein blühnder Kranz;
Es strahlet das Geschirr in Seidenblumenglanz;
Die Goldgebisse Blumenkelche säumen,
Und Knospen schwellen auf den rothen Zäunen.
Der Muschelwagen auf die Erde sinkt,
Ein Silberton von Rad und Axe klingt.
Worauf die Göttin ihrem Thron entsteigt
Und göttlich schön im Blütenfeld sich zeigt.
Des Lenzes Hauch, der Vögel Sängerchor
Fliegt ihr zur Seite, schwebt ihr nach und vor,
Und zu den sanften Tönen ihrer Leier
Singt Wald und Feld der Liebe Frühlingsfeier.

Der Erde Gnomen wecken ihre Tritte,
 Sie steigen auf, umtänzen ihre Schritte,
 Die Sylphen nahen fröhlich durch die Lüfte,
 Ihr Goldhaar weht, die Flügel fächeln Düfte,
 Es tauchen Nymphen aus der blauen Fluth
 Und Feuergeister aus des Ostens Gluth.“

Die Göttin wendet sich dann an die vier Elementargeister und schildert ihren Antheil an dem Leben und der Entwicklung der Welt. Der erste Gesang ist an die Feuernymphen, der zweite an die Gnomen oder Erdgeister, der dritte an die Wassernymphen, der vierte an die Sylphen oder Luftgeister gerichtet.

Der Gesang an die Feuernymphen hat die Entstehung der Welt aus dem Urfeuer zum Gegenstand und behandelt ausserdem die allgemeinen Erscheinungsformen des Feuers, des Lichtes und der Wärme. Er beginnt mit den Worten:

„Urfeuerynmyphen! Hebrer Vesta Schaar!
 Mit Silberpfeil im goldnen Lockenhaar —
 Ihr schwebtet durch des Urweltchaos Nacht,
 Dem Licht die Augen öffnend. Froh erwacht
 Natur, die junge, dann, als Gottes Liebe
 Im finstern Abgrund weckt die Werdetriebe:
 „Es werde Licht!“ und des Allmächtigen Wort
 Drang durchs erstaunte, nächtge Chaos fort:
 Durchs Weltall schiesst erweckt des Aethers Strahl,
 Der Stoff ballt sich zu Sonnen ohne Zahl,
 Um jede Sonne schwingen sich die Erden,
 Und Monde, die in Gluth geboren werden,
 Die mit Gewalt geschleudert, weit ab fliegen,
 Doch bald sich in elliptische Bahnen schmiegen.
 Nun rollet Welt um Welt und Kreis um Kreis,
 Im Gleichgewicht hält jedes sein Geleis,
 Den Perlen gleich am lichten Kleidersaum
 Der Gottheit, durch den unbegrenzten Raum.“

In gleicher Weise besingt Darwin das Zurücksinken der Welt in das Chaos:

„Rollt hin, ihr Sterne, messt den Schritt der Zeit,
 So lang euch Jugend Glanz und Schimmer leihet,
 Doch nah und näher rückt ihr euch leise,
 Und immer enger werden eure Kreise.
 Blumen des Himmels! ihr müsst auch vergehn,
 Den Schwestern gleich, die auf dem Felde stehn.
 Vom hohen Himmel Stern auf Sterne fallen,

Auf Sonnen Sonnen und Systeme prallen.
 Ihr Licht verlischt, und dunkel stürzen nieder
 In eines Chaos Nacht die Sterne wieder.
 Doch aus dem Wrack des Weltensturzes steigt
 Auf's Neu das Leben, neue Formen zeigt
 Natur, die ewge, die auf Flammenschwingen
 Dem Weltenbrand sich phönixgleich entringen.“

Der zweite Gesang handelt von der Entwicklung der Erde. Sie wird aus einem Vulkan der Sonne herausgeschleudert. Durch stärkere Reibung an der einen Kraterwand erhält sie eine stärkere Drehung und sphäroidale Gestalt. Durch Abkühlung entsteht ein fester Kern, auf dem sich das Wasser als Urmeer niederschlagen, leichtere Gase bilden eine Atmosphäre. Im Urmeer steigen Inseln auf, dann Kontinente. Der Mond wird aus einem Erdkrater ausgeworfen, erstarrt vollkommen und verliert seine Atmosphäre.

Im dritten Gesang schildert Darwin den Kreislauf und die Wirkungen des Wassers: Wolkenbildung, Quellen, Flüsse, Meer, Eis, Gletscher. Hier berührt er bei Besprechung der verstorbenen Seethiere zum erstenmal das Thema von der Umwandlung der Arten. Es erscheint ihm merkwürdig, dass die meisten ausgestorbenen Seethiere, z. B. die Ammonshörner, nicht mehr lebend, die Fossilien nicht fossil gefunden werden. Er fragt daher: „Wurden die Ammoniten zerstört, als die Kontinente sich erhoben? Oder vernichteten einige Thiergattungen durch die anwachsende Macht ihrer Fresser? Oder leben sie noch heute in unzugänglichen Tiefen der See? Oder wechseln einige Thiere schrittweise ihre Gestalten und werden neue Arten?“

Der vierte und letzte Gesang beschäftigt sich mit den Erscheinungen der Luft, den Winden und Klimaten. Die zarten Winde der Luft bauen auch den Pflanzenleib auf, und jetzt erst tritt von der „Oekonomie der Vegetation“ die Rede. Die darauf folgenden Erörterungen bilden den Uebergang zu dem zweiten Theil des Lehrgedichtes, der „Liebe der Pflanzen“.

Er enthält im Wesentlichen eine Schilderung des Geschlechtslebens der Pflanzen in Einzelgemälden. Dabei werden aber auch, namentlich in den Anmerkungen, viele andere Erscheinungen der Pflanzenbiologie erörtert, und diese sind es, die uns hier vorzugsweise interessieren. Besonders eingehend berücksichtigt Darwin die Schutzmittel der Pflanzen gegen schädliche Einflüsse, gegen

Feinde und zudringliche Gäste. Die Wachs- und Harzabsoungen der Blätter dienen zum Schutz gegen Kälte und ätherische Oele und Gifte, Dornen, Stacheln, Borsten und Haare schützen die Pflanzen vor dem Gefressenwerden Thiere. „Ein sonderbarer Umstand“, schreibt Darwin, „bei die grossen Stechpalmen in Needwood-Forest, sie sind bis gefähr zur Höhe von 8 Fuss mit dornigen Blättern bew und haben dann oben kahle Blätter, als wüssten sie, dass l und Rindvieh ihre höheren Zweige nicht erreichen kön Ferner verhindern die Wasserbecken, die die Blätter der W karde bilden, und die Leimringe am Blütenstiel der Pech das Hinaufkriechen von Insekten:

„O blutge Nelke, sammt den schönen Schwestern,
Mordkundig stellt ihr Schlingen nicht seit gestern!
Habt acht! ihr muntern Völkchen glanzbeflügelt,
Dass ihr die Lust nach jenem Liebchen zügelt,
Wenn jene drei Sirenen euch entzücken,
Mit Worten, Lächeln, Winken euch berücken,
Seid ihr — geleimt! Vergebens eure Waffen!
Der Stacheln, Füsse, Flügel Kraft erschlaffen.
Seid auf der Hut! Sucht schnell euer stilles Heim,
Sonst zahlt mit Leben ihr für Honigseim!“ —

Auch die Einrichtungen der insektenfressenden Pfl zum Fang der Insekten hält Erasmus Darwin für Mittel den Honig der Pflanzen gegen die Angriffe der Insekte schützen. Als Beispiele führt er den heimischen Sonnen und die amerikanische Venusfliegenklappe an. Unter dem Gesichtspunkt betrachtet er die Insektenähnlichkeit Orchideenblüthen, z. B. der Ophrysarten. Es erklärt sich Auffassung aus seiner irrthümlichen Meinung, dass die Blü möglichst auf Selbstbefruchtung angewiesen seien und der E die Bedeutung eines Nahrungs- und Reizmittels für die schlechtsorgane der Pflanzen habe. Den Nutzen der Inse für die Kreuzbefruchtung der Blüthen, den später sein E so überzeugend nachgewiesen hat, erkannte Erasmus Da noch nicht. Trotzdem war ihm die Anpassung der honigraubel Insekten an die Blüthen nicht unbekannt, und er besch genau Bau und Funktion des Rüssels vom Windigsschwär der speziell dazu eingerichtet scheint, den Honig der Geissblüthe trotz der langen Blumenröhre zu erreichen.

Dem Kenner der Werke Charles Darwins wird hier die Fülle der Naturerscheinungen auffallen, mit denen sich Erasmus und Enkel beschäftigten. Noch frappirender wird der Umstand, wenn wir die folgenden klaren Auseinandersetzungen Erasmus Darwins über die biologische Bedeutung der Farben im Thierreiche lesen: „Bei Insekten und vielen kleineren Thieren tragen ihre Farben dazu bei, sie vor den grösseren, denen sie zur Beute dienen, zu verbergen. Raupen, die auf Blüthen weiden, sind allgemein grün, Erdwürmer erdfarben, Schmetterlinge, die Blumen besuchen, sind wie diese gefärbt, Vögel, die sich im Buschwerk aufhalten, haben grünliche Rücken, die dem Laube und die Brust hell gefärbt wie der Himmel, durch die sie für den Habicht weniger sichtbar werden, mag er über oder unter ihnen dahinfliegen. Jene Vögel, die sich unter Blumen aufhalten, wie der Distelfink, sind mit lebhaften Farben geschmückt. Die Lerche und das Rebhuhn haben die Farbe der trockenen Vegetation oder der Erde, auf der sie aufhalten. Frösche wechseln ihre Farbe mit dem Schlamm des Gewässers, die sie besuchen, und die, welche auf Bäumen sitzen, sind grün. Fische, die im Wasser schwimmen, und Vögel, die in der Luft schweben, tragen auf dem Rücken die Farbe des fernen Grundes und auf der Brust die des Himmels. In den kälteren Zonen werden viele Thiere im Winter, solange der Schnee liegt, weiss. Daraus erhellt klar, dass in den Farben der Thiere Absicht liegt.“ —

Ein weiteres, mit dem Darwinismus zusammenhängendes Thema, das Erasmus Darwin in seinem Lehrgedicht berührt, ist die der rudimentären Organe. Er erwähnt als solche die antheralen Staubblätter mancher Pflanzen und bringt sie in Analogie mit den Schwingkölbchen der Zweiflügler, die er als Rudimente der Hinterflügel betrachtet. Auch die Zitzen an den Brüsten der menschlichen Thiere rechnet er hierher. Alle diese Bildungen sind nach Darwin Merkmale eines in einem langen Zeitraum vorangegangenen Wechsels der Organismen, wodurch bewirkt wurde, dass sie neuen Wegen des Nahrungserwerbs anzupassen. „Vielleicht“, schreibt er, „alle Erzeugnisse der Natur in einem Fortschritt zu grösserer Vollkommenheit begriffen — eine Idee, bestätigt durch die neuen Entdeckungen und Schlüsse hinsichtlich der fortschreitenden Bildung der festen Theile unserer Erd-

kugel und entsprechend der Würde des Schöpfers Dinge“. —

Ein zweites Werk des Erasmus Darwin, die Hauptarbeit seines Lebens, erschien in den Jahren 1794—1798 unter Titel: „Zoonomie oder Gesetze des organischen Lebens“. Es ist ein voluminöses fünfbändiges Buch, das im wesentlichen Physiologie und Pathologie des Menschen enthält, aber mit reichen Ausblicken auf das thierische Leben im Allgemeinen. So handelt ein Kapitel des ersten Bandes vom Instinkt. Darwin sucht hier zu beweisen, dass die sog. instinktiven Handlungen den Thieren nicht durch eine höhere Macht eingepflanzt wurden, sondern dass sie durch Uebung, Ueberlegung und Erfahrung allmählich erworben worden sind. Gewisse Fähigkeiten, die Thiere gleich nach der Geburt ausüben können, haben sie aber durch Uebung im Mutterleib erlernt. So die Kälber des Geistes. Der Embryo führt im Fruchtwasser Bewegungen aus, die Schwimmbewegungen ähnlich sind. Das Schwimmen der Kälber ist aber ihrer Art zu gehen ähnlich, daher können sie bald nach der Geburt gehen. Das Schwimmen des Menschen gleicht dagegen dem des Frosches und ist von seiner Art zu gehen verschieden, daher braucht er viele Monate, das Gehen zu lernen. Auch das Hinunterschlucken der Nahrung lernt der Fetus bereits vor der Geburt, indem er das Fruchtwasser hinabschluckt.

Die meisten Instinkte aber werden erst während des Lebens erworben. Dahin gehört z. B. die Furcht der Thiere vor Menschen. Diese ist nicht eine übernatürliche Eingebung, sondern eine durch Erfahrung erworbene seelische Eigenthümlichkeit. Dies geht daraus hervor, dass die Thiere in Gegenden, wo sie keine Gelegenheit haben, den Menschen kennen zu lernen, keine Furcht vor ihm zeigen, so die Füchse in Sibirien, die Vögel der Falklandsinseln.

Als einen weiteren Beweis für die erfahrungsmässige Entwicklung der Instinkte führt Darwin an, dass die Pferde in den weiten Moorländereien von Staffordshire den Stachelginster fressen vermögen, indem sie ihn mit einem Vorderfuss so fest stampfen bis die Stacheln gebrochen sind. In den fruchtbaren Gegenden aber sind die Pferde nicht dazu im Stande, die Stacheln ihre Mäuler blutig, wenn sie durch Hunger oder Einsamkeit verleitet werden, Ginster zu fressen.

Auch der Wandertrieb der Vögel ist ein erworbener Instinkt. Die Wanderungen sind nicht nothwendig und könnten so gut durch einen Winterschlaf ersetzt werden. Die Vögel auf ihren Wanderungen denselben Fährlichkeiten ausgesetzt, die Menschen auf ihren Schifffahrten, und man könnte mit dem Recht behaupten, die Schifffahrten der Menschen seien ein blindes Verhängnis. Dieselben Vogelarten wandern in einigen Ländern aus, in andern dagegen nicht.

Von dem gleichen Gesichtspunkt aus ist die Fähigkeit der Vögel zu betrachten, die geeignetste Jahreszeit zum Eierlegen zu wählen. Die wilden Vögel legen ihre Eier im Frühling. Dies aber kein blinder Instinkt ist, ergibt sich daraus, dass Hausvögel, die jederzeit Nahrung und Schutz finden, ihre Eier das ganze Jahr hindurch legen.

Nicht weniger sind die Kunsttriebe der Thiere durch Uebung und Erfahrung erworbene Fertigkeiten. Die Nester derselben Art sind nicht immer von demselben Material und derselben Art, wofür Darwin zahlreiche, theils selbst, theils von andern angeführte Beispiele anführt. Die vom Menschen aufgezogenen Vögel sind ungeschickt im Nestbau, weil sie wenig Gemeinschaft mit andern ihrer Art haben. Der Kuckuk baut bald ein Nest, bald legt er seine Eier in die Nester anderer Vögel. Wäre uns die Geschichte der gesellig lebenden Insekten, der Ameisen, Bienen und Wespen bekannt, so würden wir finden, dass ihre Kunst ebenso allmählich durch Erfahrung und Ueberlieferung erworben wurden wie unsere eigenen Künste. Dass das Honigwabenbau eine erworbene Fähigkeit ist, geht daraus hervor, dass nach Barbados gebrachten Bienen nach dem ersten Jahr nicht mehr Honig zu bereiten, weil sie es nicht mehr für nützlich halten.

Aus allen diesen Betrachtungen ergibt sich, dass Erasmus Darwin im Wesentlichen derselben Auffassung über den Instinkt war wie später sein Enkel, nur dass er der Erfahrung des einzelnen Individuums ein grösseres Gewicht beilegte als der Erfahrung der Generation, die Charles Darwin als Bedingung für die Entstehung der Instinkte angesehen hat.

Auch dafür, dass der Instinkt nicht unfehlbar ist, führt Darwin Beispiele an. Er erinnert an die Insekten, die

in künstliches Licht fliegen, das sie für Tageslicht halten, an die Fleischfliegen, die durch den Geruch verlockt, ihre an die Aasblume legen, wo dann die ausschlüpfenden J verhungern müssen. —

In dem Kapitel über den Instinkt erörtert Erasmus D noch eine andere Frage, die später von seinem Enkel in (besondern Werke behandelt worden ist, nämlich den Aus der Gemüthsbewegungen bei den Menschen und Thieren. leitet ihn hauptsächlich aus den ersten Empfindungen Bewegungen des Neugeborenen ab. Das neugeborene empfindet Freuden und Schmerzen, und mit diesen Empfind sind bestimmte Muskelbewegungen verbunden, eine Verbind die das ganze Leben über bestehen bleibt. Wenn die Empfindung wiederkehrt, wiederholt sich auch dieselbe Bewe die somit zum äussern Ausdruck der Empfindung wird.

Nach diesem Prinzipie erklärt Darwin zunächst den Aus der Furcht. Das Neugeborene kommt aus einem hohen Temper grad plötzlich in einen niedern, es zittert vor Frost, seine l wird durch die Kälte bleich, gleichzeitig entleert es Blase Mastdarm. Diese unangenehmen Empfindungen sind verbu mit Furcht vor ihrer Wiederholung. Daher äussert sich s die Furcht durch Zittern, Blässe und Entleerung von Blase Darm.

Aehnlich erklärt sich der Ausdruck des Kammers. Mündung des Thränenganges wird beim Neugeborenen durc verhältnissmässig kalte und trockene Luft und durch unangen Gerüche gereizt, diese unangenehme Empfindung verbindet mit dem Erguss von Thränen. Daher sind Kummer und W zeitlebens verbunden.

Aber die Thränendrüse des Neugeborenen wird auch c angenehme Gerüche gereizt, besonders durch den Geruch Muttermilch. Dieser Geruch hat einerseits die zärtliche Nei des Kindes zur Mutter, andererseits den Erguss von Thr zur Folge. Daher sind später zärtliche Liebe und Dankba ebenfalls mit Weinen verbunden.

Auch die Thiere haben Ausdrucksformen für das zärt Vergnügen. Die Lämmer wedeln mit dem Schwanz, die Ks „spinnen“. Jene entledigen sich ihrer harten Exkreme, v sie zu saugen anfangen durch Hin- und Herbewegen

Schwanzes, daher wird dieses bei ihnen der Ausdruck des zärtlichen Vergnügens. Die Katzen strecken die Pfoten nach der Mutterbrust aus, und indem sie beim Saugen den Athem einziehen, entsteht ein schnurrendes Geräusch. Daher schnurren sie, wenn sie in zärtlicher Stimmung sind, strecken die Pfoten aus und ziehen sie wieder zurück.

Vom „zärtlichen Vergnügen“ unterscheidet Darwin das „heitere Vergnügen“. Dieses äussert sich durch Lächeln. Wenn das Kind saugt, so umfasst es mit dem Mund die Zitze. Durch den Genuss der Milch wird es vergnügt, dann erschlafft der Schliessmuskel des Mundes in Folge Ermüdung, die antagonistischen Gesichtsmuskeln treten in Thätigkeit und bringen Lächeln hervor. Dies ist daher der Ausdruck der Heiterkeit.

Endlich versucht Darwin auch die Empfindung der Schönheit auf dasselbe Prinzip zurückzuführen. Beim Liegen an der Mutterbrust fühlt das Kind eine behagliche Wärme, sein Geruchssinn wird angenehm affizirt durch den Geruch der Milch, sein Geschmackssinn durch den Geschmack der Milch, Hunger und Durst werden gestillt, und der Gefühlssinn wird angenehm erregt durch die Sanftheit und Glätte der Mutterbrust. Gleichzeitig erhält das Kind eine Vorstellung von der gerundeten Form der Mutterbrust, indem es sie mit den Händen umfasst, mit den Lippen berührt, mit den Augen bewacht. Wenn wir daher später ähnliche gerundete oder wellige Formen wahrnehmen, z. B. in einer Landschaft die Wellenform der sich erhebenden und wieder abfallenden Oberfläche oder in einer antiken Vase, einer Statue oder irgend einem andern Werk des Pinsels oder Meissels, so empfinden wir ein Wohlbehagen, das alle unsere Sinne affizirt, und wir nennen den Gegenstand „schön“. —

Den Ausdruck der Gemüthsbewegungen betrachtet Erasmus Darwin als das erste Verständigungsmittel der Thiere untereinander, als die erste Sprache. Aus dieser natürlichen Sprache ist die künstliche Sprache des Menschen erst allmählich entstanden. Aber auch viele Thiere, namentlich die gesellig lebenden, besitzen eine künstliche Sprache. Darwin führt verschiedene Beispiele dafür an.

Die mütterliche welsche Henne versteckt sich beim Anblick eines Hühnerhabichts ins Gras. Ihre Jungen thun aus Nachahmung dasselbe. Bei dieser Handlung stösst die Mutter einen

gewissen Laut aus. Wenn die Jungen nachher diesen hören, auch ohne dass sie die Mutter sehen, so wissen sie, er zu bedeuten hat und ducken sich ins Gras. Dass dies natürliche, sondern eine künstliche Sprache ist, scheint Daraus hervorzugehen, dass eine Henne diese Sprache mit gleicher Leichtigkeit jungen Enten lehrt, die sie aus untergeschobenen Eiern ausgebrütet hat.

Auch das Bellen der Hunde ist wahrscheinlich eine künstliche Sprache. Denn nach Berichten von Reisenden bellten Hunde auf der Insel Juan Fernandez nicht, erst als man europäische Hunde unter sie brachte, fingen sie an, diesen nachzuahmen, aber anfangs auf eine besondere Art, als ob sie es lernten, was ihnen nicht natürlich war. Nach Linné bellen Hunde in Südamerika die Fremden nicht an. Die nach Europa gebrachten Hunde sollen nach drei bis vier Generationen bellen aufhören und bloss heulen wie die eingeborenen Hunde.

Von demselben Gesichtspunkt aus ist der Gesang der Vögel zu beurtheilen. Junge Nachtigallen, die unter andern Vögeln ausgebrütet sind, sollen nicht eher singen, als bis sie durch die Gesellschaft anderer Nachtigallen unterrichtet sind. —

Im zweiten Band der „Zoonomie“ interessiert uns besonders das Kapitel „Von der Erzeugung“. Erasmus Darwin eröffnet darin zunächst die Rolle der beiden Geschlechter bei der Entwicklung des Foetus und nimmt Stellung zu dem berühmten Streit der Spermatiker und Ovulisten. Er glaubt mit den Spermatikern, dass der männliche Samenfaden allein den Embryo darstellt, das weibliche Ei dagegen nur zur Ernährung des Embryos dient. Diese Idee sei schon allegorisch in der Erzählung der Bibel von der Bildung der Eva aus einer Rippe des Adam angedeutet.

Konnte sich Darwin in Bezug auf diese Frage dem Einflusse seiner Zeit nicht entziehen, so nimmt er dagegen in Bezug auf ein anderes, damit in Zusammenhang stehendes Problem eine sehr fortgeschrittene Stellung ein. Er wendet sich in eingehender Kritik gegen die damals noch herrschende Präformationslehre, nach der der künftige Organismus im Samen oder Ei bereits vollständig vorgebildet sein sollte. Er weist vor allem auf die grossen Veränderungen hin, die die thierische Form erfährt. Der Organismus der Thiere durchläuft vor der Geburt

verschiedenartigsten Stufen, er erleidet nach der Geburt die bedeutungsvollsten Umwandlungen. Die Metamorphosen der Insekten und Frösche sind äusserst mannigfaltig. Durch Domestikation werden die verschiedensten Rassen der Pferde, Hunde, Rinder, Kaninchen und Tauben erzeugt. Klimatische Einflüsse verändern den Pelz vieler Thiere, so dass sie im Sommer und Winter ein verschiedenes Kleid tragen. Die Art der Thätigkeit verändert den Menschen; Schmiede, Weber, Portechaisenträger sind an der Bildung ihrer Glieder zu erkennen. Alle diese grossen Veränderungen der thierischen Form würden unmöglich sein, wenn der Organismus nur durch Ausdehnung von Keimen entstünde, die wie die Becher eines Taschenspielers ineinandergeschachtelt sind. Sie lassen sich nur durch Neubildung, durch Epigenesis erklären.

Erasmus Darwin denkt sich den ersten Anfang der embryonalen Entwicklung als ein einfaches lebendes Filament. Dieses liegt sich zu einem Ring zusammen, der nährenden Partikel aufnimmt und so zu einer lebenden Röhre wird. Diese bildet dann nach und nach die verschiedenen Organe. Wenn man die grosse Aehnlichkeit des inneren Baues bei allen warmblütigen Thieren, bei Säugethieren, Vögeln und Amphibien bedenkt, so kann man sich des Schlusses nicht enthalten, dass sie alle auf ähnliche Art aus einem einzigen lebenden Filamente entstanden sind. Bei einigen hat dieses Filament Hände und Finger erhalten, bei andern Krallen, bei andern Schwimmhäute, bei noch andern ganze oder gespaltene Hufe. Bei den Vögeln hat es Flügel gebildet statt der Arme und Federn statt der Haare. Bei manchen Thieren bildet es Hörner statt der Zähne im vordern Theil der Kinnlade, bei andern Hautzähne, bei noch andern Schnäbel. Alles dies geschieht in derselben Weise wie aus der kiemenathmenden Quappe der lungenathmende Frosch wird.

Dieselben Gründe, die Darwin für die Epigenesis anführt, macht er auch für die allmähliche stammesgeschichtliche Entwicklung zunächst der warmblütigen Thiere geltend. Mit welcher Klarheit er fünfzehn Jahre vor Lamarck den Grundgedanken der Descendenztheorie entwickelte, geht aus folgenden Sätzen hervor: Denkt man nun nach diesem über die grosse Aehnlichkeit der Bauart der warmblütigen Thiere nach, bedenkt man die grossen Veränderungen, die sie vor und nach der Geburt leiden, erinnert

man sich, in welchem geringen Zeittheilchen manche oben beschriebenen Veränderungen der Thiere vorgegangen sollte es dann wohl zu kühn sein, sich vorzustellen, dass in grossen Zeitraum, seitdem die Erde existirt hat, viell Millionen Zeitalter vor dem Anfang der Geschichte des Mens sollte es wohl zu kühn sein, sich da vorzustellen, dass warmblütigen Thiere aus einem einzigen lebenden Filan entstanden sind, das die erste grosse Ursache mit Anima begabte, mit der Kraft neue Theile zu erlangen, begleitet neuen Neigungen, geleitet durch Reizungen, Empfindungen, W und Assoziationen und das so die Macht besass, durch seine eingepflanzte Thätigkeit sich zu vervollkommen, diese Ver kommenungen durch Zeugung der Nachwelt zu überlie Eine Welt ohne Ende!“

Darwin bleibt aber bei der Anwendung der Abstammu lehre auf die warmblütigen Thiere nicht stehen. Es sche ihm genügende Gründe vorhanden, dass auch die kaltblüt Thiere, die Fische, ferner die Insekten und Gewürme, ja so die Pflanzen aus demselben lebenden Filamente entstanden s Es gibt Uebergangsformen zwischen den kaltblütigen und wa blütigen Thieren, die von beiden etwas gemein haben, wie W fische, Robben und Frösche. Die Insekten erleiden im L ihres Lebens Aenderungen, die untereinander noch verschied sind als ihre Abweichungen von den warmblütigen Thieren. Würmer unterscheiden sich durch die Einfachheit ihres B von den übrigen Thieren, dieser kann aber nicht als Grund e gesonderten Ursprungs angeführt werden. Die Pflanzen end betrachtet Darwin gewissermassen als Thiere niederer Art, er bereits in einem früheren Kapitel der Zoonomie „vegetabilischen Leben“ zu beweisen versucht hatte.

Er vergleicht dort das System der Wurzeln mit dem Sys der Milchgefässe, die Saftgefässe im Frühjahr mit den Gefä des Mutterkuchens, die Blätter der Landpflanzen mit den Lun die Blätter der Wasserpflanzen mit den Kiemen, die Samen den Eiern der Thiere. Staubbeutel und Narben sind wa Thiere, an ihrem Mutterstamm wie Korallenpolypen befest sie haben eigene Bewegungen, fühlen die Leidenschaft der Lie indem sie sich zur Zeit der Befruchtung einander nähern t werden wie Bienen und Schmetterlinge durch Honig ernäl

Bäume sind mit Thierstöcken zu vergleichen, ein Baum ist eine Anhäufung von vielen lebenden Knospen wie ein Korallenriff eine Anhäufung von vielen lebenden Polypen. Die verschiedenen Sekretionen der Pflanzen, wie Harz, Wachs, Ölen in derselben Weise erzeugt, wie die Sekrete der thierischen. Die Pflanzen können wie die Thiere durch Reizungen Bewegungen veranlasst werden, so die Sinnpflanze, die Venus-schlinge, die Staubblätter der Berberitze. Sie besitzen auch einen Grad von Willenskraft, wie aus ihren Schlafbewegungen erhellt, denn der Schlaf besteht in einem zeitweisen Aufheben der Willenskraft. Auch die ringelförmige Bewegung der Ranken des Weinstocks und anderer rankender Pflanzen sowie das Bestreben der Pflanzen, sich nach dem Lichte zu kehren, beweisen die Existenz eines vegetabilischen Willens. Ja, sogar Sinnesorgane und Nerven dürfen den Pflanzen nicht abgesprochen werden. Sie haben Organe zur Unterscheidung der verschiedenen Reize von Wärme, Licht und Feuchtigkeit, an den Wurzeln das Organ der Geruchart und selbst ein Geruchsorgan. Deshalb müssen sie auch Ideen von manchen Eigenschaften der Welt ausser sich und von ihrer eigenen Existenz haben.

So abenteuerlich diese Ansichten Erasmus Darwins auch erscheinen mögen, so lässt sich doch eine gewisse Analogie mit modernen Ideen und speziell mit solchen Charles Darwins nicht verkennen. Dieser wurde durch seine Forschungen über das Bewegungsvermögen der Pflanzen und über insektenfressende Pflanzen zu ähnlichen Ansichten über das vegetabilische Leben geführt wie sein Grossvater. Am Schluss seines Vortrags über das Bewegungsvermögen der Pflanzen meint er, es sei unmöglich von der Aehnlichkeit zwischen den Bewegungen der Pflanzen und denen der niederen Thiere nicht überrascht zu sein. Die Spitze des Würzelchens vergleicht er geradezu mit dem Gehirn der Thiere. In einem Brief an Decandolle spricht er von der Freude, die es ihm immer mache, die Pflanzen auf der organischen Stufenleiter zu erheben. Und an den Botaniker Lamarck schrieb er: „Ich werde zu der Ansicht geführt, dass die pflanzliche Substanz in organischem Zusammenhang bestehen muss, nahe analog der Nervensubstanz der Thiere.“

Diese innige Verwandtschaft zwischen pflanzlichen und thierischen Organismen war es, die Erasmus Darwin veranlasste,

für beide einen gemeinsamen Ursprung anzunehmen, alle lebewesen als verschiedene Stufen einer grossen Entwicklungsaufzufassen. Er begnügte sich aber nicht damit, die Existenz dieser Entwicklung zu beweisen, sondern suchte die Ursachen der stammesgeschichtlichen Veränderungen zu gründen. Er sieht diese in drei grossen Strebungen der Organismen: dem Verlangen nach dem ausschliesslichen Besitz eines Weibchens, dem Verlangen nach Nahrung und dem Verlangen nach Sicherheit.

Durch das Verlangen nach dem ausschliesslichen Besitz eines Weibchens erlangten einige Thiere Waffen für den schlechtlichen Kampf, so der Eber eine dicke hornige Haut an den Schultern und Hauer im Maule, der Hirsch ein Geweih scharf zum Verwunden und gegabelt zur Abwehr der Stösse des Gegners, der Hahn Sporen an den Füßen. Die Endursache mit diesen Waffen geführten geschlechtlichen Kämpfe scheint zu sein, dass das lebhafteste und stärkste Männchen die Art pflanzt, die dadurch verbessert wird.

Durch das Verlangen der Thiere nach Nahrung entstanden solche Organe, die dem Nahrungserwerb dienen, so die Nase des Schweines zum Wühlen, der Rüssel des Elefanten um die Zweige niederzubiegen, die raue Zunge des Hornvaches zum Abstreifen des Grases, die starken Schnäbel der Papageien zum Aufbeissen der Nüsse, die langen Schnäbel der Schnecken zum Durchbohren der sumpfigen Erde, die breiten Schnäbel der Enten zum Durchsehen des Wassers. Alle diese Dinge scheinen mehrere Generationen hindurch nach und nach durch das ständige Bestreben der Kreatur, dem Nahrungsbedürfniss zu nügen, gebildet worden zu sein und sich mit beständiger Verbesserung auf die Nachkommen fortgepflanzt zu haben.

Durch das Streben nach Sicherheit endlich entstanden die langen Hinterläufe des Hasen, die Flügel der Vögel und Fledermäuse, die harten Panzer der Schildkröte, die Schalen der Seeigel, die Schutzmittel der Blüten gegen Honigraub, die symmetrischen Färbungen, überhaupt alle Organe zur Flucht, zum Schutz und Trutz.

Es geht aus diesen Ausführungen hervor, dass Erasmus Darwin das Selektionsprincip, das sein Enkel zur Erklärung der Artumwandlungen aufstellte, noch nicht erkannte. Doch war sich der Bedeutung des Kampfes ums Dasein, des wichtigsten

tors der Selektion, bereits bewusst. In seinem im Jahre 1800 erschienenen Werk „Phytologie oder die Philosophie des Feld-Gartenbaues“, das gewissermassen eine Ergänzung zur „Ökonomie“ bildet und eine umfassende Darstellung der Land-Gartenwirthschaft enthält, sagt er in Bezug auf diesen Punkt: „Die stärkeren schnellen Thiere verschlingen die schwächeren mit Gnade und Barmherzigkeit. Solcher Art ist die Lage der natürlichen Natur, deren erstes Gesetz in den Worten ausgedrückt werden könnte: friss oder werde gefressen, wodurch sie ein grosses Schlachthaus oder einem ungeheuren, alles umgebenden Schauplatz von Gefrässigkeit und Ungerechtigkeit gleich erscheint. Wo finden wir eine wohlwollende Idee, die inmitten so vielen anscheinenden Elends trösten könnte?“ Diese Frage antwortet Darwin: „Raubthiere überfallen und tödten weit leichter die Alten und Schwachen, die Jungen werden durch ihre Eltern vertheidigt . . . durch diese Einrichtung erhält das Lustgefühl in der Welt . . . alte Organisationen werden in junge umgewandelt.“ —

In poetischer Form hat Erasmus Darwin seine entwickelungs-geschichtlichen Ansichten noch einmal zusammengefasst in seinem Gedicht „Der Tempel der Natur oder der Ursprung der Gesellschaft“, das kurz nach seinem Tode, im Jahre 1803, erschien. Es beginnt mit einer Vertheidigung der Lehre von der Urzeugung:

„Gehorsam nur dem eignen Triebe: Werde!
Wächst elternloses Leben aus der Erde.“

Aber nur für die niedersten Organismen ist eine solche Urzeugung anzunehmen:

„Zuerst gebar das küstenlose Meer
Der niedern Wesen unermesslich Heer,
In Perlenhöhlen, mikroskopisch klein,
Auf schlammigem Grunde regt sichs zart und fein;
Durch Reihen von Geschlechtern blühen sie dann
Zu neuer Kraft und Gliederpracht heran,
Und Wesen ohne Zahl daraus entspringen,
Mit Blättern, Flossen, Füssen oder Schwingen.“

Diese allmähliche Entwicklung der Lebewelt und ihre Anpassung an die verschiedenen klimatischen Verhältnisse wird im letzten Gesang des Gedichtes geschildert.

Der dritte Gesang behandelt die Entwicklung des menschlichen Geistes, als deren Hauptmoment Darwin die Ausbildung der Hand zum Greiforgan ansieht:

„Der stolze Mensch am schwächsten wird geboren,
Hat scharfe Augen nicht, noch feine Ohren,
Noch Hörner auf dem Haupt, noch Federpracht,
Doch ihm ersetzt Vernunft der Andern Macht.
Der Himmel gab ihm Feingefühl der Hand,
Ein solcher Sinn ist keinem Thier bekannt.“

Ein anderes wichtiges Moment ist der Nachahmungstrieb, dem Kunst, Sprache, Wissenschaft und Moral ihren Ursprung verdanken:

„Ideen, klar durch Aug und Hand gewonnen,
Ziehn schnell das Herz in Leiden oder Wonne,
Worauf Nachahmungstrieb, die listige Macht,
Die alles Aeussere nachbildet, erwacht,
Und ruhlos thätig schenkt der Welt zumal
Sie Kunst und Sprache, Wissen und Moral.“

Als das Grundprincip der Moral betrachtet Darwin Nächstenliebe:

„Hoch schrieb Natur ob ihres Tempels Pforte
In goldnen Lettern diese heiligen Worte:
Stets hilfsbereit bei fremdem Unglück thu,
Was dir gethan einst wünschen könntest du!
Weit Winde, tragt dies göttliche Gebot,
Folgt, Völker, Herrscher, ihm in Freud und Noth.“

Auch auf die niederen Kreaturen will Darwin dies Gebot gedehnt wissen, wie aus seiner kleinen Schrift über Erziehung hervorgeht. Dort sagt er: „Mitgefühl oder Sympathie für Leiden Anderer sollte aber auch auf die gemeinen Kreaturen ausgedehnt werden, auch Insekten muthwillig zu vernichten, zu tödten, von einem rücksichtslosen Sinn oder einem verhärteten Herzen. Wer denkt bei diesen Worten nicht an die Erzählung von Enkels, dass er als kleiner Junge eine Zeit lang nur tote Insekten gesammelt habe, weil er es für sündhaft hielt, die Thiere des Sammelns wegen zu tödten!

Der vierte und letzte Gesang des Darwinschen Lehrgedichtes behandelt wieder den Kampf ums Dasein und seine ethische Bedeutung:

„Luft, Erd und Meer — falls tief zu schaun es gilt —
 Sind nur Ein Grab, Ein weites Blutgefild.
 Der Hunger kämpft, die Todespfeile fliegen
 Im Schlachthaus Welt, wo alle sich bekriegen.
 Ja, Flora selbst, die heitre, kann nicht siegen
 Ohn wilden Streit, dem Tausende erliegen,
 Das Kraut, der Strauch, der Baum aufstrebend ringen
 Nach Luft und Licht, sich unterdrückend dringen
 Sie himmelwärts; hinab die Wurzel streben,
 Um feuchte Nahrung kämpfend für ihr Leben.
 Als Schmeichlerin umstrickt des Epheus Ranke
 Den Baum, den sie erstickt, die geile, schlanke.
 Vom Mancinella träufelt giftiger Thau
 Und fällt versengend nieder auf die Au.
 Hoch streben Stengel auf mit schattgem Laub,
 Streun Mehlthau auf das Korn und giftigen Staub,
 Und unersättlicher Insekten Horden
 Die holde Blüthe sammt der Knospe morden“.

Doch ohne diesen Kampf ums Dasein würde jede einzelne
 sich ins Unendliche vermehren:

„Würd der Vermehrung einer Art nichts wehren,
 Bald fehlt ihr Raum in Ländern, Luft und Meeren“.

Versöhnend wirkt hier nur der Gedanke, dass aus dem
 vergehenden, Schwachen und Alten immer neues, frisches
 hervorspriesst:

„Die hohen Berge, die das Land umkränzen,
 Felsinseln, Riffe, die das Meer begrenzen,
 Der Sand selbst auf der weiten Wüste Brust
 Sind Monumente vorger Lebenslust.
 Kündets der Welt! Wie die Erzeugungskraft,
 Den Tod besiegend, neues Glück erschafft,
 Wies Leben überall sich mehrt mit Macht,
 Natur der Zeit Zerstörungskraft verlacht.
 Schreibts hoch mit goldnen Lettern: Diese Welt
 Ist ihres gütigen Schöpfers Ruhmeszelt“. —

Durch diese Uebersicht über Erasmus Darwins Werke glaube
 gezeigt zu haben, dass sich viele bedeutungsvolle Anklänge
 die Arbeiten seines Enkels darin finden. Diese Thatsache
 scheint um so interessanter, als sich kein direkter Einfluss der
 Werke des Grossvaters auf die Geistesrichtung des Enkels nach-
 weisen lässt. Charles Darwin hat zwar in seinem sechzehnten
 und siebenzehnten Lebensjahr die Zoonomie seines Grossvaters

gelesen, aber ohne dass sie irgend eine Wirkung auf ihn geäussert hätte, obgleich er damals das Buch sehr bewunderte. Als er aber nach zehn bis fünfzehn Jahren wieder las, war er enttäuscht, weil ihm das Missverhältniss zwischen den Thaten und der Spekulation darin allzu gross erschien. Wenn überhaupt ein Einfluss durch die Zoonomie stattgefunden hat, kann dieser nur ein ganz allgemeiner gewesen sein. Ganz ausgeschlossen ist, dass Charles Darwin durch die Lektüre der Zoonomie zu irgend einer seiner speziellen Untersuchungen angeregt worden ist. Denn es lassen sich für alle seine Untersuchungen besondere Veranlassungen nachweisen, die weit abliegen.

Viel grösser als der unmittelbare Einfluss der Werke Grossvaters auf den Enkel war wohl die vererbte Neigung zur Beschäftigung mit naturphilosophischen Problemen. Wir haben hier ein ausgezeichnetes Beispiel für das Gesetz der unbrochenen oder latenten Vererbung. Natürlich wird das Verdienst Charles Darwins durch die Anticipationen seines Grossvaters nicht im mindesten geschmälert. Erasmus Darwin wäre heute ziemlich vergessen, wenn nicht sein Enkel sein Erbe angetreten und es erworben hätte gemäss dem Worte Goethes:

„Was du ererbt von deinen Vätern hast
Erwirb es, um es zu besitzen“.

Bericht

über die

handlungen der ersten internationalen seismologischen
Konferenz in Strassburg

VON

Dr. K. Futterer

Professor an der Technischen Hochschule

†Vorstand der Erdbebenkommission des Naturwissenschaftlichen Vereins zu Karlsruhe.

In Strassburg fanden vom 11.—13. April die Sitzungen der ersten Konferenz der permanenten seismologischen Kommission des VII. internationalen Geographentages (1899) statt, zu denen die Kaiserliche Reichsregierung einen Vertreter entsandt hatte, und an welchen ausser zahlreichen deutschen Mitgliedern Russland, Ungarn, Oesterreich, Dänemark, Italien, Schweiz, Belgien und Japan durch Delegirte vertreten waren.

Von verschiedenen anderen Forschern auf seismologischem Gebiete, welche an der Versammlung nicht theilnehmen konnten, waren Begrüssungsschreiben und Erklärungen zum Programm eingelaufen.

Die Erdbebenkommission des hiesigen Naturwissenschaftlichen Vereines war durch ihren Vorstand, Professor Dr. Futterer und Herrn Professor Leutz vom Realgymnasium, der im Besonderen die auf der Erdbebenhauptstation aufgestellten Instrumente zu studiren vorhatte, mit Beistimmung der Grossh. Regierung in Strassburg vertreten.

Schon im Jahre 1899 war von Professor Dr. G. Gerland ein von einer Anzahl von bedeutenderen deutschen Geographen mitunterzeichneter Aufruf zur Gründung einer „Internationalen seismologischen Gesellschaft“ ergangen, deren Begründung und Berathung der Statuten, nachdem viele Beitrittserklärungen aus allen Ländern erfolgt waren, einen Hauptgegenstand der Berathungen in Strassburg bildete; ausserdem waren die Vorträge über die Organisationen der Erdbebenforschungen in den verschiedenen Ländern, die eine solche schon längere Zeit besitzen und unter denen Italien und Japan an der Spitze stehen, sowie die Mittheilungen über die Erfahrungen mit den verschiedenen Konstruktionen von seismographischen Apparaten von grösstem Interesse und Werthe.

Es würde zu weit führen, auf Alles einzugehen, was während der sechs abgehaltenen, die Vor- und Nachmittage füllenden Sitzungen verhandelt wurde; ein ausführlicher Bericht und die Veröffentlichung der Protokolle wird von Seiten der Kaiserlichen Hauptstation für Erdbebenforschung in Strassburg in nicht ferne Zeit erfolgen. Hier mögen nur einige der wesentlichsten Punkte hervorgehoben werden.

Zunächst wurde nach der Begrüssung der Konferenztheilnehmer durch den Direktor der Kaiserlichen Hauptstation und nach vollzogener Wahl der Geschäftsleitung eine Spezialkommission für den Statutenentwurf der internationalen seismologischen Gesellschaft eingesetzt, deren Vorschläge in einem revidirten Entwurf zusammengefasst und am letzten Sitzungstage im wesentlichen unverändert und einstimmig angenommen wurden.

Als Zweck der Gesellschaft ist die Förderung aller Aufgaben der Seismologie bezeichnet, die nur durch das Zusammenwirken zahlreicher, über die ganze Erde vertheilter Erdbebenstationen gelöst werden können. Als Mittel dazu dienen Beobachtungen nach gemeinsamen Grundsätzen, periodische Konferenzen und die Errichtung einer Centralstelle für die Sammlung und zusammenfassende Bearbeitung der Beobachtungsergebnisse. Der Name der Vereinigung wird nicht mehr „Internationale seismologische Gesellschaft“, sondern „Internationale seismologische Association“ lauten und der Beitritt als Mitglieder ist für die Leiter der Erdbebenstationen und Institute, die an der Erdbebenforschung Interesse nehmen, an die Bedingung gebunden, gewisse Beobachtungsergebnisse in dem für die Zusammenfassung vereinbarten Umfange und nach verabredetem Schema regelmässig an die Centralstelle zu senden.

Die Vertreter der Stationen und Erdbebenkommissionen sowie die übrigen Mitglieder der Association treten als Generalversammlung, die im Anschluss an den internationalen Geographenkongress stattfinden soll, zusammen. Ein mit der ständigen Leitung betrauter Ausschuss besteht aus 5 Mitgliedern, die in der Generalversammlung zu wählen sind, verschiedenen Nationen angehören müssen und auch den Leiter der Centralstelle einbegreifen. Der Generalsekretär dieses Ausschusses erstattet in jeder Generalversammlung einen Bericht über die Kasse und über die Lage der Association. Für die Einzelberathung der Statuten

all eine Versammlung der Delegirten der Staaten, die sich dazu bereit erklären, zusammentreten. Der Vertreter des Kaiserlichen Reichsamtes des Innern, Herr Geh. Regierungsrath und vortragender Rath im Ministerium des Innern, erklärte als Kommissar der Reichsverwaltung, dass die Regierung grossen Antheil an der Gründung dieses internationalen Unternehmens nimmt und dass sie durch das auswärtige Amt allen Staaten Mittheilung von der Konferenz gemacht und um Entsendung von Delegirten ersucht habe. Auch die Beschlüsse dieser Konferenz sollen den auswärtigen Staaten mitgetheilt werden und die Vertreter der einzelnen Staaten, selbst wenn sie nicht als offiziell beauftragte Delegirte auf der Konferenz erschienen, sollen ihre Regierungen über die Zwecke und Beschlüsse derselben informiren, um deren thätige Beihilfe zu erlangen. Eine von der Centralstelle ausarbeitende Denkschrift, welche Beiträge der Leiter seismologischer Institute und Erdbebenkommissionen enthält, soll aufklären darüber, was in jedem einzelnen Lande zu thun nöthig ist. Auf Antrag von Professor Forel (Lausanne) wird ferner einstimmig beschlossen, dass das deutsche Reich ersucht werden soll, die Führung zu übernehmen und dass die Strassburger Kaiserliche Erdbebenhauptstation beauftragt werde, die Centralstelle zu bilden.

Dieser für die deutsche Forschung sehr ehrenvolle, einstimmige Beschluss wurde noch erweitert durch die Erklärung, dass alle anwesenden Mitglieder sich bereit erklärten, die Centralstelle zu unterstützen.

Die auf dem internationalen Geographenkongresse 1899 gegründete, permanente Kommission, die 28 Mitglieder zählte, löst sich nach den gefassten Beschlüssen auf und es wird, um die Verbindung mit dem internationalen Geographenkongress zu erhalten, eine neue Kommission gewählt, die aus den Mitgliedern:

Professor F. A. Forel, Morges bei Lausanne,
 Geh. Regierungsrath Professor Dr. Helmert, Potsdam,
 Oberbergrath Ed. von Mojsisovics, Wien,
 Professor Dr. Lewitzky, Dorpat (Jurjew),
 Direktor Palazzo, Rom und
 Professor Dr. Gerland, Direktor der Kaiserlichen Hauptstation
 für Erdbebenforschung, Strassburg
 bestehen soll.

Schon in der Begründung der vorläufigen Statuten der bildenden internationalen Gesellschaft hatte Professor Gerke betont, dass die Selbständigkeit der einzelnen seismologischen Institute und Organisationen ganz unberührt bleiben soll; in Centrale soll nur das Material in eine einheitliche Form gebracht vollständig gesammelt und allgemein der Erdbebenforschung zugänglich gemacht werden. Kleine, lokale Erdbeben ohne allmeineres Interesse können nur in ihren Elementen von Centralstation in den Berichten wiedergegeben werden; es bleibt aber den einzelnen Stationen überlassen, für das eigene Land die weitere Kreise im Lande interessirenden, lokalen Erdbeben in besonderen ausführlichen Berichten darzustellen.

Der Association erwachsen folgende ständige Ausgaben, durch Beiträge der sich betheiligenden Staaten zu decken wären. Die Entschädigung für den Generalsekretär, die Kosten der Publikationen und für wichtige Forschungen, ferner die Errichtung von Stationen in uncivilisirten Ländern nöthigen Mittel.

Die Publikationen der Centralstelle sollen in Jahresberichten erfolgen, die auf den in viertel- oder halbjährigen Abständen einzusendenden Berichten der einzelnen Beobachtungsstationen beruhen; die Uebersicht soll nach der Zeitfolge der Erdbeben gegeben werden; wo es möglich ist, soll auch eine Zusammenstellung der in bestimmten, durch die besonderen geologischen Verhältnisse charakterisirten Arealen auftretenden Erdbeben gegeben werden. Die Centralstelle soll auch auf Augenmerk auf die Konstruktion neuer, und die Verbesserung schon vorhandener Apparate richten, vor Allem aber darauf hinwirken, dass einheitliche Beobachtungsmethoden auf allen Stationen über die ganze Erde zur Anwendung kommen, da dadurch die Vergleichbarkeit der Resultate allein ermöglicht wird.

Speciell für die mikroseismischen Forschungen müssen hoch empfindliche, von eigenen Schwingungen möglichst freie Instrumente mit grosser Schwingungsdauer verlangt werden. Die Fortbewegung des Registrirpapiere ist möglichst einheitlich zu wählen und das Triebwerk soll von der Zeitmarkirung unabhängig sein. Die Korrektion der Normaluhr soll immer bis auf etwa 1 Sekunde bekannt sein. Ein Schema ist entworfen, das für alle einzutragenden Daten Rubriken enthält; die Centralstelle sammelt diese Berichte und fasst sie chronologisch nach Erdbeben geordnet

zusammen, wobei die Stationen von der Länge 0 (Greenwich) aus im Osten vorgehend aufgeführt werden sollen.

Wie die Seismographen gleichartig sein sollen, so sind auch die Beobachtungen auf den O-Meridian und die Zeit von Greenwich zu beziehen, und auch die astronomische Zeiteintheilung, die von 0 Uhr Mittags bis zum andern Mittag von 0 Uhr bis 24 Uhr abzählt, soll in den Berichten der Einzelstationen an die Centralstation, um dieser die zeitraubenden Reduktionsarbeiten zu erleichtern, angewandt werden; die einzelnen Stationen können sich jedoch für sich bei der bürgerlichen Zeiteintheilung des Tages bleiben, soweit ihnen das zweckmässig erscheint.

Es können naturgemäss nicht alle Stationen gleichmässig mit denselben Instrumenten Beobachtungen machen; für die Untersuchung von Fernbeben genügen weit auseinander liegende, mit hochempfindlichen Instrumenten ausgerüstete Stationen in geringer Zahl; während für lokale Schüttergebiete mehr Stationen nöthig sind, die aber einfachere Instrumente führen können, die nur die Zeit des Eintrittes, Dauer und Intensität einer Erschütterung angeben müssen. Solche Stationen zweiten Ranges haben für die Vorgänge bei lokalen Schüttergebieten eine hohe Bedeutung, aber leider ist die Frage nach der geeigneten Einrichtung derselben mit Instrumenten viel schwieriger zu lösen, als für die Beobachtung der mikroseismischen Bewegungen, für deren Registrierung ausgezeichnete, aber theure Instrumente zur Verfügung stehen, die keiner wesentlichen Umgestaltung mehr bedürfen. Dafür müssen auch noch weitere Erfahrungen gesammelt und geeignete Seismometer konstruirt werden, und auch das soll zum Arbeitsgebiete der Centralstation gehören.

Waren das im Wesentlichen die Resultate bei den der Association und den allgemeinen Aufgaben der Association gegebenen Berathungen, so hatte für die deutschen Mitglieder die Sitzung die höchste Bedeutung, welche der Regierungskommissar der Reichsregierung für die Vertreter der deutschen Staaten auf dem Abend des zweiten Verhandlungstages zusammenberufen hatte.

In einer vom Kaiserlichen Reichsamt des Innern schon früher veranlassten, dem Reichstage vorgelegten Denkschrift waren die ersten Vorschläge über die Gründung einer Erdbebenhauptstation in Strassburg i. E. enthalten, die als Grundlage für die weitere Ausgestaltung dienen; in derselben war ausgeführt, dass eine

grössere Anzahl von Stationen in den verschiedenen Theilen Deutschlands errichtet werden soll, dass Stationen erster Ordnung mit mehreren und hochempfindlichen Instrumenten an geeigneten Punkten errichtet, und in den dazwischen gelegenen Gebieten Beobachtungen mit einfacheren Seismometern vorgenommen werden sollten. In jedem Lande sollen die Berichte an einer Hauptstation gesammelt, auf die von der Internationalen Association gewählten Grundwerthe reducirt, und der Centralstation am Ende jedes Jahres eingesandt werden. Der Vorschlag der Kaiserlichen Regierung in Uebereinstimmung mit dem Kultusministerium, Kuratorium für die Centralstation in Strassburg einzusetzen, dem alle deutschen Bundesstaaten vertreten und ein Mal im Jahre zusammenkommen sollen, um den Zusammenhang zwischen den einzelnen Staaten zu festigen, wird lebhaft begrüsst; es wird ferner der Direktor der Centralstation in Strassburg beauftragt eine Denkschrift über die Organisation der Erdbebenforschung in Deutschland auszuarbeiten, zu denen die Vertreter der einzelnen Staaten die Beiträge über die in ihrem Lande wünschenswerthen Einrichtungen liefern. Das Kuratorium setzt die Orte der Hauptstationen fest, zwischen denen dann das Netz der kleinen Beobachtungsstationen weiter auszubauen ist. Es wird ein allgemeines Programm aufgestellt werden, dessen Ausführung schrittweise unter Benützung aller zu erwartenden Erfahrungen vor sich gehen soll.

Der Schwerpunkt dieser Beschlüsse liegt darin, dass durch das Kaiserliche Reichsamt des Innern die Denkschrift den einzelnen Regierungen der Bundesstaaten vorgelegt wird und dieselben zur Mitarbeit eingeladen werden, ferner auch darin, dass durch das auswärtige Amt auch die ausländischen Regierungen von den Anträgen und Vorschlägen in Kenntniss gesetzt werden, um die Organisation der Internationalen seismologischen Association zu fördern.

Es ist jedenfalls mit Freude zu begrüssen, dass Deutschland die führende Rolle übernehmen wird und zwar mit der Zustimmung der Vertreter auch der Länder, in welchen bisher die seismologische Forschung am meisten gepflegt wurde und die grössten Fortschritte zu verzeichnen hat: Japan und Italien, welche die Führung hätten beanspruchen dürfen.

Es erübrigt noch, um ein vollständiges Bild der in Strassburg gepflogenen Verhandlungen und Diskussionen zu geben, auf die inhaltsreichen Vorträge berufener und erfahrener Forscher einzugehen, wenn auch für spezielleres Studium auf den stielten Bericht der Konferenz, in welchem die Vorträge erörtern werden, verwiesen werden muss.

Zuerst gab Professor Dr. E. Rudolph (Strassburg) einen Überblick über die Ausbreitung und Organisation der makrosmischen Beobachtungen, welche die Ausdehnung, die Häufigkeit und den Zusammenhang der Erdbeben mit tektonischen Verhältnissen hauptsächlich zum Gegenstande haben.

Italien hat wohl nach dieser Richtung die besten Einrichtungen; auch in Japan ist der Beobachtungsdienst entwickelt kaum in einem anderen Lande; auf den Philippinen und in Ceylon sind gute Beobachtungen gemacht worden, und neuerdings haben sich auch Australien und Neuseeland angeschlossen. In England sind nicht weniger als 30 Milne'sche Pendelapparate an verschiedenen Punkten aufgestellt. Auch Griechenland hat einen organisirten Beobachtungsdienst, und es hat sich gezeigt, dass Erdbeben dort noch häufiger sind als in Japan. In den Ausländern ist der Anfang der Beobachtungen gemacht und Oesterreich hat die k. Akademie der Wissenschaften schon 1895 eine Kommission für Erdbebenforschung begründet, die reichliche Berichte veröffentlichte.

In der Schweiz, wie in Württemberg und Baden haben sich geologische Institute und Naturwissenschaftliche Vereine der Erdbebenforschung angenommen. Auch Skandinavien hat Einrichtungen getroffen; in Sachsen war die Erdbebenforschung mit der geologischen Landesanstalt durch dessen Leiter verknüpft und hat bemerkenswerthe Resultate erzielt.

Spanien und Portugal haben nur wenige Stationen, die erst nach dem grossen Erdbeben von 1884 eingerichtet wurden.

In Amerika besteht zwar eine Erdbebenkommission, die aber bisher nur wenig von sich hat hören lassen, Kalifornien ist aber ausgenommen. In Mexiko fehlt eine Organisation, so in ganz Südamerika mit Ausnahme von Chile.

Nicht alle die genannten Beobachtungsstationen sind gleichartig; viele beschränken sich auf unsichere, persönliche Beobachtungen, die weder Eintrittszeit der Erschütterung noch deren

Dauer genau ermitteln lassen. Für gute Organisation sind als Beispiele Japan und Italien anzuführen, die über seismisch wichtige Gebiete eine Anzahl von Stationen erster Ordnung mit empfindlichen Instrumenten und zweiter Ordnung mit einfacheren Seismometern vertheilt haben, zu denen noch die zahlreichen persönlichen Einzelbeobachtungen Ergänzungen bringen.

Eine Vervollständigung dieses Vortrages gab am zweiten Tage Professor Dr. Weigand (Strassburg) in seinen Mittheilungen über die Ausbreitung der mikroseismischen Beobachtung. Eine Weltkarte zeigte durch verschiedenfarbige Punkte die Stationen an, welche die Seismographen von Milne (37 Instrumente auf 1 Stationen) Rebeur, Vicentini, Omori, Ehlert und Wiechert zu Beobachtung benutzen. Es zeigt sich, dass noch grosse unwichtige Gebiete der Erde ganz solcher Stationen entbehren z. B. das Innere Südamerikas, wo nur vier solche Stationen an den Küsten im Norden, im Osten und zwei auf der Westküste liegen.

Auch das Innere Afrikas hat noch nirgends eine Station; solche müssten zunächst auch in Dänemark, im Norden Skandinaviens und an dessen Westküste, in Griechenland, auf St. Helena und auch im Nordosten Nordamerikas und dem Südwesten Südamerikas begründet werden.

In Asien ist nördlich vom 40° nördlicher Breite keine Station mehr; und auch in Frankreich ist nur eine noch nicht ganz vollständige Station in Grenoble.

Nach den bisherigen Erfahrungen sind für die Beobachtung von Fernbeben die von Ehlert verbesserten Rebeur'schen doppelten Horizontalpendel die besten; die Milne'schen sind aber die älteren und daher die verbreitetsten. Je nach den Aufgaben der einzelnen Stationen sind verschiedene Instrumente zu wählen und hoffentlich bringt eine nahe Zukunft die Entscheidung, welche Instrumente für die verschiedenen Zwecke die geeignetsten sind.

Ueber die Art der Bearbeitung und Veröffentlichung der Fernbeben hat Professor Dr. Rudolph beachtenswerthe Vorschläge gemacht. Er wies besonders auf den Umstand hin, dass bei den Erdbeben Phasen zu unterscheiden sind, die oft schwer zu erkennen sind, wenn nicht die Apparate mit Dämpfung und möglichst geringer Reibung am Registrirapparat arbeiten; leichtere Pendel reagieren schneller als schwere, daher ist der Vergleich der Aufzeichnungen verschiedener Instrumente sehr erschwer-

die Schnelligkeit der Bewegung der registrierenden Papiere von Bedeutung. Bei grösseren Beben waren drei Phasen, bei denen nur zwei zu unterscheiden, bei denen die Maximalbewegung erst in der zweiten oder dritten Phase eintrat; manche Instrumente reagierten überhaupt nicht auf die erste Phase z. B. Milne'sche Pendel.

Eingehende Besprechungen über seismische Instrumente und Erfahrungen mit denselben und der Bearbeitung der erhaltenen Kataster gaben Dr. Hecker (Potsdam), Professor Omori (Tokio), Professor E. Oddone (Pavia), Professor Dr. Schmidt (Stuttgart), Professor Dr. Wiechert (Göttingen); es würde zu weit führen, näher einzugehen; auch für die speciellen Darstellungen Professor Lewitzky über Horizontalpendelbeobachtungen in Wien, Professor Belar (Laibach) über Erdbebenbeobachtungen in Laibacher Felde und Professor Lasker (Lemberg) über die Erdbeben überhaupt und jene vom Ende Januar 1901 im Ausland muss auf den erscheinenden Originalbericht verwiesen werden.

Als besonders interessant möge nur die Beobachtung Wiechert's noch erwähnt werden, dass bei Stürmen an der norwegischen Küste sich die mikroseismischen Erschütterungen, die Wellenschlag an der Küste hervorbringt, an den Pendeln in Wien zeigen; auch von Vicentini sind die Wellenschläge des adriatischen Meeres in Padua als mikroseismische Bewegungen nachgewiesen worden.

Wie gross aber schon die erreichte Genauigkeit der Aufzeichnungen bei Beachtung und Vermeidung aller störenden Umstände ist, zeigte Wiechmann an den ganz gleichen Kurven, welche in Japan und Göttingen bei einem Fernbeben von den Apparaten aufgezeichnet wurden. In anderen Fällen sind die Bewegungen bei zwei zeitlich von einander getrennten Beben desselben Ortes ganz identisch, so dass sich der Schluss ergibt, dass zwei dieselbe Ursache in derselben Intensität Bewegungen erzeugt hat. Diese Beispiele mögen hier genügen, um die Bedeutung der Erforschung der mikroseismischen Bewegungen zu zeigen.

Zum Schlusse seien noch die Berichte erwähnt, welche die Vertreter einzelner Länder über die in denselben bestehenden Einrichtungen und Organisationen zur Erforschung der Erdbeben mitgeteilt haben oder für die Zukunft beabsichtigt werden.

Zuerst sprach Professor Lewitzky (Dorpat) über die Organisation der seismischen Beobachtungen in Russland. In Russland Stationen in Irkutsk, Taschkent, am Schwarzen Meer und Kaul in Odessa, sowie am baltischen Meerbusen errichtet. In Chi ist die älteste Station, an der schon seit 20 Jahren beobachtet

Professor Schafanzik sprach über die Erdbebenkomm in Ungarn, Professor Kövesligethy wies einen ungarischen bebenkatalog vor, Professor Futterer sprach über den Stan Erdbebenforschung in Baden und die für die Zukunft gepl Einrichtungen von Stationen in den verschiedenen seismi Gebieten; Professor Dr. Günther theilt mit, dass in Bayern H stationen in den seismischen Hauptgebieten: im Ries bei lingen, in München und in Bamberg zu errichten beabsi sei. Professor Lagrange bespricht die Einrichtungen in B und betont besonders die Aufstellung empfindlicher Instru in grossen Tiefen unter der Erdoberfläche in Bergwerken. denen wichtige Resultate zu erwarten sind.

Auch die Herstellung von seismischen Karten wurde Professor Rudolph erörtert; es existiren schon einige z. B. Mallet, Taramelli u. A., die aber nicht allen Anforderungen sprechen; ohne Staatsbeihilfe und Unterstützung durch die g gischen Landesanstalten können sie nicht hergestellt we Sie sollten die relative Häufigkeit der Erdbeben in den einzi Gebieten, die Erdbebencentren und die Verbreitung mit Intensität zum Ausdruck bringen und die Zusammenhänge der geologischen Beschaffenheit der betroffenen Gebiete erke lassen. Voraussetzung wäre die Herstellung eines vollständ Erdbebenkataloges, wie neuerdings Baratta einen solchen Italien veröffentlicht hat. Es müsste dafür und für die Ka konstruktion eine eigene Kommission eingesetzt werden, d Arbeiten auf Staatskosten zu veröffentlichen wären.

Die vorstehende Uebersicht zeigt, welche Fülle von Mat die Konferenz in ihren sechs Sitzungen bewältigt und für we Behandlung in Aussicht genommen hat. Vieles hat feste Ge angenommen, und es hängt nur von der Bereitwilligkeit der gierungen ab, ob auf der betretenen Bahn rasche Fortsch gemacht werden können. Der ganze Ausbau des in Aus genommenen Programmes wird noch lange Zeit in Ansp nehmen; aber die ersten Schritte sollten bald gethan wer

t die aus ihnen zu gewinnenden Erfahrungen für die Er-
rungen und die Herstellung vollständiger Netze von Beob-
ungsstationen benützt werden können.

Die Erklärungen des Herrn Geh. Rath Lewald als Kommissar
Reichsamtes des Innern lassen auf thatkräftige Unterstützung
Seiten des deutschen Reiches rechnen, und wenn auch die
elstaaten sollten diesem Beispiel folgen, so wird ein grosses
nationales Unternehmen gefördert, an dessen Spitze Deutsch-
steht; auf diese von den Vertretern aller Länder ein-
nig gewünschte Suprematie hat die deutsche Wissenschaft
che stolz zu sein.

Rasse und Gesundheit.

Von

Ludwig Wilser

in Heidelberg.

Es ist eine für Volkswirthschaft und Gemeinwohl gleich
thvolle Erkenntniss, dass eine umfassende und aufbauende
Gesundheitslehre¹ nicht einseitig die örtlich-zeitlichen Bedingungen
erforschen, nicht nur äussere Schädlichkeiten und Schmarotzer,
die Bakterien ins Auge zu fassen, sondern den Menschen
mit „mit seinen angeborenen oder erworbenen und beeinfluss-
ten Anlagen“ in den Vordergrund zu stellen hat. Non omnia
murus omnes, eine Last, die den Einen zu Boden drückt,
ist ein Anderer spielend, und was Schwächlinge in tödliche
Schicksale stürzt, kann einen widerstandsfähigeren Menschen ganz
unverändert lassen. Nicht allein von zufälligen Umständen hängt
unsere Gesundheit ab, sondern hauptsächlich von den
Eigenschaften, allenfalls durch zweckmässige Lebensweise durch Ab-
kühlung und Uebung verbesserten Eigenschaften unseres Leibes.
Diese sind abermehr oder weniger Gemeingut der Rasse. Im
Laufe von Jahrtausenden durch ungezählte Geschlechter unserer
Vorfahren im Kampf ums Dasein und in Anpassung an die
Umwelt erworben, durch räumliche Sonderung rein gezüchtet
erblich befestigt, werden sie, wenn Blutmischung ausge-
schlossen, unverändert und unabhängig von Sprache und Volks-
stamm durch die erhaltende Kraft der Vererbung auf die spätesten
Nachkommen übertragen.

¹ Vergl. hauptsächlich F. Hueppes Handbuch der Hygiene, Berlin 1899.
Die äusseren Bedingungen, wie Grundwasser, Boden, Witterung u. dergl.,
sind bekanntlich Pettenkofer mit grossem Erfolg erforscht. Dass er aber
die Bedeutung der erbten Eigenschaften zu würdigen wusste, zeigt
von seinem Schüler Emmerich erzählter Ausspruch. Darauf aufmerk-
gemacht, dass Fleisch im Fell des geschlachteten Thieres sich lange
erhält, erwiderte er: „Da sieht man, was es werth ist, wenn einer in
eine gute Haut steckt.“

Wildlebende Thiere und Naturvölker zeigen eine gro Gleichmässigkeit, auch in der Gesundheit, da die freiwalte Einzelauslese schonungslos alle Kümmerer und Schwächlinge a merzt und, bei ungehinderter Verbindung, die zweigeschlecht Fortpflanzung jede krankhafte Anlage oder Abweichung v Durchschnitt wieder verwischt. Aendern sich plötzlich die Lebe bedingungen, so setzt der Kampf ums Dasein mit erneu Heftigkeit ein, fordert zahlreiche Opfer und überlässt es Ueberlebenden, denen eine schnelle Anpassung gelungen, du vermehrte Fruchtbarkeit die Lücken auszufüllen. Aehnlich g es, wenn eine Rasse in einen anderen Himmelsstrich verschlag wird; hierbei kann aber noch die Kreuzung mit einer v wandten Rasse zu Hilfe kommen, indem die Aufnahme ei gewissen Bruchtheils vom Blute der den Verhältnissen angepasst früheren Bewohner die Eingewöhnung erleichtert. Da der Men den Daseinskampf vorwiegend mit geistigen Waffen führt, er von den frühesten Zeiten an Hilfsmittel, wie Kleider, Hütt Feuer gebraucht, die ihm erlaubten, der Unbill des Himm zu trotzen und unter den ungünstigsten Verhältnissen aus dauern. Diese künstlichen Mittel hat die Kultur in jeder der baren Weise vermehrt und vervollkommnet, so dass jetzt, v selbstverständlich nicht zur Verbesserung der Rassengesund dient, eine Menge schwächlicher, eigentlich nicht lebensfähig Menschen erhalten und aufgezogen wird. Da jedoch auch schwachem Leibe ein grosser Geist wohnen kann, des schöpferische Thätigkeit seinen Mitmenschen und der Nachw zu Gute kommt, wird dieser Nachtheil oft mehr als aufgewagt. Aber die Kultur hat auch ihre Kehrseite: durch Anhäufu grosser Menschenmengen in den Städten, durch Verweichlichu und Laster schafft sie neue Schädlichkeiten, die nicht nur d Einzelnen gefährlich, sondern auch als erbliche Krankheit auf die Nachkommen übertragen werden, die Fortpflanzu hemmen und schliesslich den Bestand der Rasse in Frage stell Blutmischung war eine unausbleibliche Folge der Ausbreitu der Rassen und der Wanderungen der Völker. So tragen heutigen Kulturvölker durchaus nicht mehr das gleichmäss und einheitliche Gepräge der Stammrasse, aus der sie alle, zule die Germanen, hervorgegangen sind. Trotzdem kommt diese Ras als edelste und höchstentwickelte der Menschheit, als Träger

der Gesittung und des Fortschritts für uns vor allen anderen Betracht. Es sei daher ein kurzer Rückblick auf ihre Entstehung und Entwicklung gestattet.

Der vor zehn Jahren auf Java gefundene Pithekanthropus, dieses merkwürdige Wesen mit aufrechtem Gang und thierischem Schädel, gibt uns eine gute Vorstellung vom Vormenschen, kann aber, da seine Knochen in eine verhältnissmässig junge Erdschicht eingebettet lagen, nicht als unser Stammvater, sondern nur als Vertreter einer vorläufigen, früh ausgestorbenen Welle¹ aufgefasst werden. Die ältesten Spuren und Ueberbleibsel des Menschen in Europa, vielleicht die ältesten überhaupt, zeigen, dass in unserm Welttheil schon vor der Eiszeit, zusammen mit kälteliebenden Thieren, wie Flusspferden, Elephanten, Nasbörnern, Löwen, Hyänen, eine mittelgrosse, langköpfige Rasse² (Neanderthalrasse, race de Canstatt, Homo primigenius) gelebt hat, deren Schädel mit ihrer flachen Stirn und den starken Augenhöhlen noch viel Aehnlichkeit mit dem des Pithekanthropus, jedoch einen erheblich grösseren Innenraum erkennen lassen. Durch die Eiszeit mit ihren verschiedenen Unterbrechungen und Nachschüben ist der Ureuropäer nicht vernichtet, sondern nur zurückgedrängt und seine Kopfwahl stark vermindert worden. Diese grausame Auslese, diese harte Schule der Noth war aber für die wenigen Ueberlebenden das wirksamste Mittelgeistigen und leiblichen Fortschritts. Nach dem Abschmelzen des Eises finden wir in Frankreich eine Rasse (race de Cro-Magnon, Homo priscus) von höherem Wuchs, ungefähr 1,80 m., und besonders mit einem Schädel, der einem bedeutend vergrösserten Gehirn Raum bot. Waffen und Werkzeuge aus Stein, Bein und Rennthierhorn, bemerkenswerthe Anfänge der bildenden Kunst legen Zeugnis ab von der Entwicklungsfähigkeit dieser Rasse, die Broca³ einen „Lichtstrahl inmitten des Dunkels“

¹ Vergl. meinen Vortrag über „Pithecanthropus erectus und die Abkämpfung des Menschen“, XIII. Bd. der Verhandlungen des Vereins.

² In den beiden letzten Jahren sind bei Krapina in Kroatien durch Prof. Dr. Gorjanovic-Kramberger wichtige Funde menschlicher Knochen gemacht worden, die den Bestand dieser ureuropäischen Rasse und ihre Ausbreitung nach Osten hin bestätigen (Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien Neue Folge I 3 und 4).

³ Bullet. de la Soc. d'Anthr. de Paris, 1868.

der Vorzeit genannt hat. Was ist aus ihr geworden, ist wirklich, wie der französische Forscher meinte, „ohne Uebergang verschwunden, ist mit ihr „die Fackel der Kunst“ plötzlich wieder erloschen? Das wäre bei so vielversprechenden Anfängen der Gesittung, bei einem so hoch entwickelten Gehirn — der Mann von Cro-Magnon hat einen Schädelraum von 1590 cc. — mehr als wunderbar. Wir haben guten Grund zu der Annahme, dass die Höhlenmenschen der alten Steinzeit, wenn auch in anderen Wohnsitzen, ihre Kulturentwicklung fortgesetzt haben. Der Rückzug des Rennthiers, das ihnen in der kältesten Zeit Nahrung, Kleidung, Waffen und Werkzeuge geliefert hatte, nach Norden weist uns den Weg, den sie genommen und dessen Spuren wir in verschiedenen Fundstätten durch die Niederlande bis auf die kimbrische Halbinsel, wo in den untersten Schichten der Torfmoore Rennthierknochen mit Erzeugnissen der Menschhand vereint liegen, und die dänischen Inseln verfolgen können. Hier fand der Mensch in den Früchten des allezeit offenen vom Golfstrom erwärmten Meeres so reichliche Nahrung, dass er des Rennthiers, das theils ausstarb, theils über Schonen weit nordwärts zog, nicht mehr bedurfte. Wie die am Strande angethürmten Abfallhaufen, die Kjökkenmöddinger, zeigen, lebte er damals hauptsächlich von Muscheln und Fischen, aber auch von Wasser- und Strandvögeln und Landthieren, wie Hirsch, Reh, Urstau wurden seine Beute. Spuren des Rennthiers finden sich nicht mehr; eine Hundeart scheint gezähmt gewesen zu sein. Vielleicht war der bei Nahrungsüberfluss sich stark vermehrende Bevölkerung der Uebergang nach der nur durch einen schmalen Meeresarm getrennten schwedischen Küste leicht, und gerade dort finden wir einen der grössten Fortschritte der Menschheit, den Uebergang von der alten zur neueren Steinzeit. Die schon aus südlicheren Gegenden mitgebrachte Fertigkeit in der Bearbeitung von Stein, Bein, Holz, Horn und Thon wurde immer mehr ausgebildet, und die schwedische Steinzeitkultur erreichte nach Baron Kurck¹ „eine Stufe der Vollendung wie in keinem anderen Land von Europa“. Wir finden die Spuren fester Wohnungen, sorgfältig angelegter Gräber, mehrerer Hausthiere und eines beginnenden Ackerbaus. Die Rasse war die gleich

¹ Congrès International d'Anthropologie à Stockholm, 1874. Comptes rendus.

geblieben: nicht nur die ältesten, sondern auch neuzeitliche schwedische Schädel zeigen, worauf schon vor einem Vierteljahrhundert Hamy¹ aufmerksam gemacht, die denkbar grösste Uebereinstimmung mit denen von Cro-Magnon. Die Farbenzeichnung — naturwissenschaftlich nichts Anderes als ein mässiger Albinismus — mag sich schon während der Eiszeit in Westeuropa vorbereitet haben, bildete sich aber unter dem Wolkenhimmel und durch die langen Winternächte des Nordens vollends aus, und wurde, auf der meerumschlungenen skandinavischen Halbinsel durch räumliche Absonderung erblich befestigt, zu einem Hauptmerkmal der nordeuropäischen Rasse (*Homo europaeus* Linné). Ackerbauende Völker wachsen rasch über die heimische Scholle hinaus und sind gezwungen, für den Geburtenüberschuss neues Ackerland zu suchen. Von Zeit zu Zeit, je nach dem Ausfall der Ernten, müssen sie einen Theil des Nachwuchses als „heiligen Frühling“ zur Eroberung und Besiedelung neuer Wohnsitze ausenden. So erging es auch dem Steinzeitvolk von Schonen in seiner von Natur eingeschränkten Heimath; immer neue Wanderhaaren zogen wie „Bienenschwärme“ aus, überflutheten immer weitere Landstriche und verbreiteten ihre, damals höchste, Gesittung über den ganzen Welttheil und benachbarte Theile von Asien und Afrika. Leiblich wie geistig jeder anderen Rasse überlegen, traten sie überall als Herren auf, immer belebend, befruchtend und gealterte Völker durch Zufuhr frischen und neuen Blutes verjüngend, ohne selbst auf die Dauer ihre Rasse zu bewahren zu können. Das sind die „arischen“ Wanderungen, die mit der germanischen Völkerwanderung ihr Ende noch nicht erreicht haben, sondern in veränderter Gestalt, durch Besiedelung neu entdeckter Welttheile bis in die neueste Zeit fortzuauern.

Da die in der Urheimath stets herrschende Bevölkerungs-
pannung wohl Auswanderungen nöthig machte, Einwanderungen
aber nicht gestattete, mussten sich die leiblichen Merkmale und
hervorragenden geistigen Eigenschaften der Nordlandsrasse immer
mehr ausbilden und befestigen, so dass unsere Vorfahren, als
sie in die Geschichte traten, nicht nur wegen ihrer Kraft und

¹ Auf der gleichen Versammlung. — Vergl. auch das schöne Werk
von G. Retzius, *Crania suecica antiqua*, Stockholm 1899; deutsche Aus-
gabe bei G. Fischer, Jena 1900.

Schönheit, sondern auch durch Klugheit und Sittenreinheit Bewunderung der Zeitgenossen erregten. Die übereinstimmenden Schilderungen geben uns späten Nachkommen ein Bild, des hervorragendster Zug eine beneidenswerthe Gesundheit des Leibes und der Seele bildet. Seit undenklichen Zeiten mit ihrer Heimath verwachsen und dem nordischen „Himmel und Boden“ angepasst, war die Rasse unempfindlich gegen „Frost und Elende“. Nackt trotzten die Kimbern dem Schnee und Eis der Alpen, setzten sich auf ihre breiten Schilde und fuhren lachend zum Thal. Wie hätte bei so rauher Lebensweise ein Schwächling aufkommen können? Aber auch in anderer Weise wirkte die Auslese beständig auf die Verbesserung der Rasse hin. Wer ein schimpfliches Verbrechen begangen, verfiel dem Tode und konnte seine schlimmen Neigungen nicht auf Nachkommen vererben. „Verräther und Ueberläufer hängen sie an Bäumen auf, Feiglinge, Ehrlose und Geschändete¹ versenken sie im Sumpf“, wie um durch diese Verschiedenheit der Strafe auszu-
zudrücken, dass man „Verbrechen blossstellen, Schande aber verbergen“ müsse. Spät erst lernten die Jünglinge die Liebe kennen, weil man glaubte, dass durch Enthaltensamkeit „der Wuchs erhöhet, der Leib gestählt“ werde; daher „die unerschöpfliche Zeugungskraft“. Und auch die Jungfrauen wurden nicht „übereilt“; und „ebenbürtig an blühender Jugend“ gesellten sie sich dem Gatten, und „von der Kraft der Eltern legten die Kinder Zeugnis ab“. So heilig auch die Bande des Blutes gehalten wurden, dennoch herrschte die grausam scheinende, aber im Grunde doch wohlthätige Sitte, die auch die Spartaner als Erinnerung an ihre nordische Herkunft bewahrt hatten: es stand im Belieben des Vaters, ob er das neugeborene Kind aufnehmen wollte oder nicht; Missgeburten oder Lebensschwache wurden ausgesetzt, dagegen galt es für schimpflich, die Zahl der Nachkommen willkürlich zu beschränken oder gesunde Kinder zu tödten, und es war Ehrenpflicht jeder Mutter, sie „selbst zu nähren und nicht Mägden oder Ammen zu überlassen“. Nackt wuchsen die Kinder zur Mannbarkeit heran, so von Jugend auf die Haut an das Ertragen von Kälte und Witterungswechsel.

¹ Die in Niederdeutschland und Dänemark gefundenen „Moorleichen“ stammen wohl meist von solchen Gerichteten her.

röhnend. Im Sommer wurden Flüsse, Seen und Bäche fleissig
 a Baden benützt, aber auch während der langen Winterszeit
 s man dies wichtige Gesundheitsmittel nicht ausser acht und
 rauchte warme Waschungen und Bäder.¹ „Gleich nach dem
 stehen baden sie,“ und nehmen ungewaschen keine Nahrung
 sich. Die in vielen altgermanischen Gräbern gefundenen Kämme,
 anzängchen, Schermesser geben Kunde von der sorgfältigen
 bespflege² unserer so oft als „schmutzige Wilde“ verschrieenen
 fahren. Auch über deren Kleidung herrschen die sonderbarsten
 stellungen, und es ist mir kaum eine künstlerische Darstel-
 g von Germanen bekannt, die Tracht und Bewaffnung richtig
 dergibt. Wenn man es auch liebte, Hals, Arme und Kniee
 zulassen, so waren doch Wohlhabendere und Vornehme zweck-
 ssig, ihres Standes würdig, ja prächtig³ gekleidet. Die ger-
 nischen Frauen verstanden sich trefflich auf das Weben
 llener und leinener Stoffe, die mit hübsch geknüpften Fransen,
 streich gewirkten oder gestickten Borten verziert oder aus-
 esenem Pelzwerk verbrämt wurden.

Von frühester Jugend an wurden die Knaben geübt und ab-
 härtet, hauptsächlich zu ritterlichem Waffen- und Waidwerk,
 man Haus- und Feldarbeit gerne dem Gesinde überliess. Die
 germanen waren ausgezeichnete Fechter und Reiter, mit ihren
 ossen „wie verwachsen“; aber auch im Laufe es dem flüchtigsten
 lld, dem schnellsten Pferde gleichzuthun, den Ger oder einen
 eldstein „in ungemessene Weite“ zu schleudern, im Weit- und
 ochsprung die Gefährten zu übertreffen, war ein Ziel rühm-
 chen Wettstreits. Die von den halberwachsenen Jünglingen
 übten Schwert- und Waffentänze, ihr „einziges“, aber um so
 eliebteres Schauspiel, die „Wonne der Zuschauer“, erforderten

¹ Wie aus den alten Volksrechten ersichtlich, hatte das germanische
 ehöft meist eine besondere Badestube.

² Die Seife, aus Fett und Asche hergestellt, ist eine nordische Er-
 ndung, vergl. Plinius. Nat. Hist. XXVIII. 51: Prodest et sapo (altnord.
 a, althochd. seipha, saiffa) Gallorum hoc inventum rutilandis capillis. Fit
 sebo et cinere, optimus fagino et caprino, dnobus modis, spissus ac
 quidus: uterque apud Germanos maiore in usu viris quam feminis.

³ Ihrer Zweckmässigkeit wegen wurde die germanische Tracht (Hemd,
 Rock, Hosen, Mantel) von den Römern angenommen und zunächst auf
 Reisen und im Felde, später ausschliesslich benützt. Sie bildet die Grundlage
 unserer heutigen Kleidung.

neben verwegennem Muth die höchste Gewandtheit und Geschmeidigkeit. Bei einigen den Germanen nah verwandten germanischen Völkern war es auch Sitte, junge Leute mit einem gewissen Gürtelmaass überschreitenden Leibesumfang zu bestrafen (Strabo IV. 4). Den Küstenbewohnern war die, weil gefahrvoll, namentlich so leidenschaftlicher betriebene Seefahrt eine Quelle des Ruhms und Gewinns, wie der Abhärtung; die Schiffsbaukunst hatte schon vor zwei Jahrtausenden eine hohe Stufe der Vollendung erreicht.

Die einfache und gesunde Kost bestand aus Brod und Mehlspeisen, Hirsebrei, Milch, Butter, Käse¹, Fleisch, Wild und Fischen; als Zukost dienten die wohlschmeckenden Beeren und würzigen Kräuter des nordischen Waldes. Gaumenkitzungen verschmähten die Germanen, dem „Durst gegenüber bewies sie aber nicht die gleiche Mässigkeit“. Niemand machte sich oder anderen einen Vorwurf daraus, gelegentlich einmal „Tag und Nacht durchzuzechen“. Oft hielten sie auch Rath über wichtige Angelegenheiten, über Krieg und Frieden beim Bech, als ob nirgends besser der „Geist für gerades Denken offen sei, als der Muth für Grosses sich entflamme“. Aber sie beriethen bloß, wenn „sie nicht trügen, sie beschlossen, wenn sie nicht irren konnten. Die Getränke, Gersten- oder Weizenbier und Met, waren verhältnissmässig harmlos; ein starker Magen kann viel vertragen, und ein etwaiger Rausch wurde gründlich, „oft bis in den Tag hinein“, ausgeschlafen. So wird die rückhaltlose Hingabe

¹ Zu den ältesten europäischen Feldfrüchten gehört die Hirse (*cereales*, davon kelt. *cerea*, *cervesia*, *corma*, Hirsebier). Butter (ahd. *anca*, smert, *butera*) war eine der beliebtesten Speisen (*butyrum barbararum gentium laudatissimus cibus*, Plinius, Nat. Hist. XXVIII. 35) der Nordländer. Die Namen hatten die Griechen von den Skythen (Hippocrates, De morbis IV. 21) die Römer von ersteren angenommen und, obgleich Geschlecht und Silbentheil nicht stimmt, als „Kuhquark“ (*Plurimum bubulo et inde nomen*, Plinius erklärt (*βουρ, τυρος*). Das deutsche Wort Butter, das in allen altgermanischen Mundarten (afr. *butera*, ags. *butere*) weibliches Geschlecht hat, ist darum wohl kein Lehnwort, sondern bedeutet die „geschlagene“ (*bat* ist auch ein germanischer Wortstamm) Milch. Auch Käse (ahd. *chasi*, ags. *cyse*, as. *kasi*, it. *caise*) bildete einen wichtigen Bestandtheil der Volksnahrung (*maiorque partem eorum victus in lacte, caseo, carne consistit*, Caesar B. G. IV. 22); ob das Wort urverwandt oder ein Lehnwort, sei es im Lateinischen aus dem Keltischen, sei es im Deutschen aus dem Lateinischen, ist unsicher; die Bezeichnung „Käs“ der deutschen Bergbewohner für den Firnschnee, spricht für erster Annahme.

an die Freuden des Bechers, einer der wenigen Schatten in dem sonst so reinen Sittenbild unserer Ahnen, ihnen leiblich und geistig nicht allzuviel geschadet haben. Die Einfuhr des schweren, damals die Stelle des Schnapses vertretenden Südweins, den die Nachbarn der römischen Provinzen mit anderen Segnungen der Kultur kennen gelernt, war bei den inneren Völkern durchaus verboten, weil sie nicht mit Unrecht annahmen, dass er tapfere Männer „schlaff und weibisch“ mache.

Das Zusammenleben in Städten, jenen ummauerten Gräbern“, fürchteten¹ die Germanen in richtiger Vorahnung seiner Gefahren; Jeder baute sein Haus dahin, sie wohnten einzeln und zerstreut in Weilern und Gehöften, und wo ihm gerade „eine Quelle, eine Flur, ein Hain gefiel“, und umgab es mit einem weiten eingefriedigten Hofraum, sich so nicht nur „gegen Feuersgefahr“, sondern auch gegen seuchenerregende Ansammlungen von Abfall- und Ansteckungsstoffen schützend. Licht, Luft, Wasser, die Haupterfordernisse der Gesundheitspflege aller Zeiten, waren ihnen dadurch in reichstem Masse gesichert. Zum Häuserbau selbst lieferten ihnen die unerschöpflichen Wälder ihrer Heimath den für den nordischen Himmel geeignetsten Stoff, und sie wussten denselben ihren Bedürfnissen aufs Beste anzupassen, ja mit „spielender Kunst“ eigenartig auszugestalten. Die Wärme, Behaglichkeit und Schönheit des fränkischen Holzhauses hat sogar einen römischen Dichter, Fortunatus Venantius, zu einem Loblied begeistert, denn

Trefflich verwahren vor Wind
und vor Wetter getäfelte Stuben,
Wo nicht klaffenden Spalt
duldet des Zimmermanns Hand!

Die wiederholt in germanischen Gräbern gefundenen Knochen mit gut eingerichteten und schön verheilten Brüchen und Verletzungen² zeigen, dass die Heilkunde in Blüthe und Ansehen stand.

¹ Ammian. Marcell. XVI 2: nam ipsa oppida ut circumdata retiis busta declinant

² So besonders in den Reihengräbern von Allach, Memmingen, Burglengenfeld, Wallstatt, Worms u. a. Vergl. Lehmann-Nitzsche, Beiträge zur prähistorischen Chirurgie nach Funden aus deutscher Vorzeit. Dissert. 1898. — S. auch meinen Vortrag über „Vorgeschichtliche Chirurgie“, gehalten am 25. Febr. 1902, in der medic. Sektion des Naturhist.-med. Vereins zu Heidelberg. Verhandlungen etc. C. Winter.

Die arzenie kunden, den gap man richen solt
 heisst es noch im Nibelungenlied. Die Heilkraft verschiedener
 Kräuter war bekannt, und besonders die Frauen scheinen es ver-
 standen zu haben, sie zu sammeln und daraus lindernde Tränk-
 lein zu brauen, heilsame Wundwässer und Salben zu bereiten.
 In ihrer leichten und geschickten Hand — das werden unsere
 heutigen Aerztinnen gerne hören — lag auch hauptsächlich
 die Behandlung der Verwundeten. „Zu den Müttern, den Gat-
 tinnen tragen sie ihre Wunden“, und diese schrakten nicht davor
 zurück, sie zu untersuchen und kunstgerecht zu verbinden. Im
 Anfang unserer Geschichte war bei verschiedenen Stämmen und
 besonders bei den Vornehmen noch die Leichenverbrennung im
 Gebrauch, eine Sitte, zu der wir ihrer Zweckmässigkeit wegen
 wieder zurückzukehren beginnen.

So waren, wie wir gesehen, in der germanischen Urzeit alle
 Bedingungen einer unverwüstlichen Gesundheit gegeben, und da-
 durch erklärt sich die unerschöpfliche Fruchtbarkeit, die schranken-
 lose Ausdehnungsfähigkeit des Volkes. Hunderttausende und aber
 hunderttausende von Streitern verbluteten in dem langen Kampfe
 mit Rom auf der Walstatt, aber Heer auf Heer rückte heran,
 immer neue Wellen ungebrochener Volkskraft brandeten gegen
 den Grenzwall des Weltreichs, um es schliesslich doch zu stürzen
 und zu überfluthen. Weit gefährlicher aber als die Schwerter
 der Feinde waren für die Nordlandsrecken die Pfeile des
 Sonnengottes. Alles konnten sie ertragen, nur nicht „Durst und
 Hitze“; von ihrem heimischen Boden in südliche Länder ver-
 pflanzt, fielen sie mörderischen Seuchen zum Opfer und schmolzen
 dahin wie die Schneeflocken.

Was können nun wir, meine Herren, die wir es nicht
 mehr mit einer reinen, unverdorbenen Rasse zu thun haben und
 mit ganz veränderten Verhältnissen rechnen müssen, aus dem
 soeben vor ihren Augen entrollten Sittenbilde lernen? Wie mir
 scheint, doch noch recht viel, wenn wir auch seitdem in der
 Wissenschaft die grössten Fortschritte gemacht und Wesen und
 Erreger vieler Krankheiten kennen gelernt haben, so dass wir
 unmittelbar gegen diese vorgehen können. Denn gerade die
 überraschenden Erfolge und Entdeckungen der Bakteriologie haben
 Manchen von uns vergessen lassen, dass die auf ererbten Eigen-
 schaften beruhende Widerstandsfähigkeit unseres Leibes für die

Gesundheit meist viel werthvoller ist, als alle äusseren Schutzmittel gegen zufällige Schädlichkeiten und Ansteckungsstoffe. Wer Krankheiten verhütet, ist ein besserer Arzt als wer sie nur zu heilen versteht, daher muss uns auch bei Bekämpfung der Volkskrankheiten ein höheres Ziel vorschweben als nur die Beseitigung der äusseren Ursachen, unsere Forschungen und Bestrebungen müssen darauf gerichtet sein, durch allgemeine Einrichtungen ein gesünderes Geschlecht¹ heranwachsen zu lassen.

Selbstverständlich können wir heutzutage die Auslese nicht mehr in der Weise unserer Vorfahren anwenden, aber durch vernünftige Heirathsgesetze liesse sich doch manches erreichen. Gewohnheitsverbrechern, Trunkenbolden, mit erblichen Krankheiten behafteten oder noch unreifen Leuten müsste die Erlaubniss zur Eheschliessung versagt werden. Im Uebrigen aber sollte eine einsichtige Staatsleitung darauf bedacht sein, das Heirathen möglichst zu begünstigen und die bedenkliche Zunahme der Ehelosigkeit einzuschränken. Da der Staat ohne Bürger ein wesenloser Begriff ist, muss ihm daran gelegen sein, dass möglichst viele gesunde, eheliche Kinder geboren werden und am Leben bleiben; Stillstand² in der Volksvermehrung ist Rückschritt. Ein Haus-

¹ Das wirksamste Mittel, die Rasse zu verbessern, ist die künstliche Zuchtwahl, die bei Thieren sehr leicht, beim Menschen jedoch aus naheliegenden Gründen schwer durchzuführen ist. Manches liesse sich, bei aller Schonung des sittlichen Empfindens, doch thun, und es ist daher vielleicht nicht ohne Nutzen, daran zu erinnern, wie man im Alterthum über solche Dinge gedacht, wie man derartige Gedanken in die That umzusetzen versucht hat. Von den Samniten, einem den Römern nahverwandten, durch kriegerische Tüchtigkeit und Sitteneinfalt ausgezeichneten Bergvolk, berichtet Strabo (V 4) ein „schönes und zur Tugend ermunterndes Gesetz“. Es war nämlich nicht erlaubt, die Tochter jedem Beliebigen zur Frau zu geben, sondern jährlich wurden „die zehn besten Jungfrauen und die zehn besten Junglinge ausgewählt“ und mit einander vermählt. Zeigte sich einer der jungen Ehemänner durch sein späteres Verhalten dieser Ehre unwürdig, so wurde ihm „mit Schimpf und Schande die Gattin wieder genommen“. Es ist hierbei, wie man sieht, der Hauptwerth auf sittliche Tüchtigkeit gelegt, doch sicher, nach den Anschauungen des Alterthums, auch Schönheit, Kraft und Gesundheit des Leibes nicht ausser Acht gelassen werden.

² Ein solcher Stillstand ist seit Jahren in unserem Nachbarland Frankreich eingetreten und erfüllt die Vaterlandsfreunde mit banger Sorge. Schon im Jahre 1867 hatte Broca seine warnende Stimme erhoben: „Die Zeit“, sagte er in einem Vortrage vor der Pariser Akademie, „scheint mir

vater, der mehrere Kinder grosszieht, leistet dem Staate unschätzbare, mit Geld gar nichtaufzuwägende Dienste. Es wäre daher gerecht und billig, wenn Junggesellen in angemessener Weise¹ besteuert, Familienväter dagegen, der Zahl ihrer Kinder entsprechend, entlastet würden. Unter den Kindern der Liebe deren Eltern aus irgend welchen Gründen den Ehebund nicht schliessen konnten oder wollten, befinden sich vielfach solche von guter Rasse; sie gehen aber meist in den ersten Lebensjahren aus Mangel an Fürsorge und Pflege zu Grunde. Oeffentliche Findelhäuser, wie sie in manchen grossen Städten schon bestehen haben darum das Gute, diesen oft recht werthvollen Stoff der Gesellschaft zu erhalten. Zweckmässig erzogen können die Knaben als Seeleute, Soldaten, niedere Beamte, die Mädchen, wenn sie nicht Hausfrauen werden, in der Krankenpflege, als Lehrerinnen oder Wirthschafterinnen sich nützlich und die Erziehungskosten reichlich wettmachen. Der Einwand, solche Anstalten befördern den Leichtsinne, ist nicht unberechtigt; die Nachtheile werden aber durch Vortheile, besonders in Staaten mit spärlichem Nachwuchs und starkem Bedarf an Menschen, mehr als aufgewogen. Der heranwachsenden männlichen Jugend kann durch Eltern oder Erzieher nicht warm genug ans Herz gelegt werden, wie sehr sie gegen sich und die Gesellschaft sündigt, wenn sie in vorzeitigen Ausschweifungen ihre Kraft vergeudet und ihre Gesundheit zer-

nicht fern zu sein, in der die Zahl der Todesfälle der der Geburten gleichkommt; dann wird voraussichtlich bald statt einer Zunahme eine Abnahme der Bevölkerung stattfinden“. Diese anfänglich nicht beachtete Weissagung ist eingetroffen, die Zeit ist da: die letzte Volkszählung vom 14 März 1901 hat zwar noch eine Zunahme von 330 000 Einwohnern in fünf Jahren ergeben, aber diese Vermehrung ist nur eine scheinbare, auf Einwanderung zurückzuführende, die Zahl der Departements, in denen die Todesfälle die Geburten überwiegen, nimmt von Jahr zu Jahr zu. Unter diesen Umständen ist am 22. November im Senat ein von Waldeck-Rousseau unterstützter Antrag angenommen worden, einen Ausschuss von Gelehrten, Staatsmännern, Volkswirthen, Aerzten zu ernennen, der die Ursachen der Entvölkerung ergründen und Heilmittel vorschlagen soll. Da aber nach den bisherigen Ermittlungen freiwillige Unfruchtbarkeit, ein schlimmes Zeichen der Ueberkultur, den Hauptgrund bildet, werden wohl alle Mittel nicht viel mehr helfen als im alten Rom.

¹ Eine solche Steuer ist schon oft als undurchführbar verlacht, neuerdings aber wieder in Frankreich vorgeschlagen und schon 403 v. Chr. als uxorium in Rom eingeführt worden.

rüttet; fürs Vaterland sein Blut zu vergiessen, ist „süss und ehrenvoll“, nicht weniger wichtig aber, es in kräftigen Söhnen und Enkeln fortleben zu lassen.

Bekanntlich sterben die meisten Kinder im ersten Lebensjahr an Verdauungsstörungen, und wenn auch, da vorwiegend schwächliche weggerafft werden, hierbei die gesunderhaltende Kraft der Auslese sich bewährt, so liegt in dieser Thatsache doch eine grosse und immer zunehmende Gefahr. Auch bei der grössten Sorgfalt kann die künstliche Ernährung die Mutterbrust nicht ersetzen. Da aber aus Gründen der Noth oder Bequemlichkeit das Selbstnähren immer seltener wird, und in Folge von Nichtgebrauch und Vererbung die Fähigkeit der Milcherzeugung¹ mehr und mehr schwindet, ist manche junge Mutter, deren Grossmütter und Urgrossmütter schon nicht mehr gestillt haben, oft beim besten Willen nicht im Stande, ihre heiligste Pflicht zu erfüllen. Es sollte daher, so lange es noch Zeit ist, kein Mittel unversucht gelassen werden, um dieser folgenschweren Entartung Einhalt zu gebieten. Nebenbei sei bemerkt, dass Schwund der Brustdrüsen auch die Schönheit der weiblichen Gestalt beeinträchtigt.

Je lebenskräftiger ein Kind geboren, je besser seine Ernährung im Säuglingsalter ist, desto ungestörter werden Wachsthum und Entwicklung verlaufen, desto grösser ist die Aussicht auf ein langes und gesundes Leben. Da aber die durch die Kultur geschaffenen Lebensbedingungen heutzutage weder bei arm noch reich den natürlichen entsprechen, erfordert die leibliche, so oft über der geistigen vergessene Erziehung die grösste Aufmerksamkeit, um die unvermeidlichen, hauptsächlich durch das Zusammenwohnen in den Städten hervorgerufenen Schädlichkeiten wenigstens einigermassen wieder auszugleichen. Der spätere Gelehrte oder Beamte wie der künftige Bauer oder Arbeiter, sie alle werden vom sechsten Jahre an in die Schulbank gezwängt, strengen durch Lesen und Schreiben bei oft ungenügender Beleuchtung über Gebühr das in der Entwicklung begriffene Auge an, athmen stundenlang staubige und verdorbene Luft, drücken den nachgiebigen Brustkorb gegen die Tischkante und entbehren bei

¹ Vergl. den lehrreichen Vortrag von Bollinger auf der Anthropologerversammlung in Lindau 1899.

dem vielen Stillsitzen der nöthigen Bewegung. Ein gewisses Mass von Kenntnissen ist für Jeden unentbehrlich, und der Staat war daher vollständig im Recht, den Schulzwang einzuführen; nur sollte man nicht vergessen, dass dieser Zwang auch die Pflicht auferlegt, die Gefahren des Schulbesuchs möglichst zu vermindern. Die Anstellung von Schulärzten, die durch wiederholte Untersuchungen den Gesundheitszustand der Kinder und die Beschaffenheit der Lehrsäle überwachen, ist überall anzustreben. Ausserdem sollte der Lehrstoff hauptsächlich in den eigentlichen Schulstunden bewältigt, die Hausarbeit möglichst eingeschränkt werden; denn weit mehr als Erwachsene hat das Schulkind Bewegung in frischer Luft, geistige Erholung, Leibesübungen und ausreichenden Schlaf nöthig. Die Augen müssen durch Schauen in die Ferne die schädlichen Folgen der Naharbeit ausgleichen, Lungen und Brustkorb beim Laufen und Steigen sich dehnen und weiten, die Muskel durch möglichst vielseitige Anstrengung gleichmässig ausgebildet und gekräftigt werden; dadurch erwirbt sich das Kind einen Schatz von Gesundheit für's ganze Leben. Von der allergrössten Bedeutung sind häufige Bäder; denn abgesehen davon, dass sie mit dem hässlichen Schmutz auch viel Ansteckungsstoff¹ entfernen, erhalten sie die Haut geschmeidig, durchlässig und leistungsfähig. Auch während der kalten Jahreszeit darf das Baden, selbstverständlich in warmem Wasser, nicht ganz unterlassen werden, da Abwaschungen den Zweck nicht in gleicher Weise erfüllen, sobald aber das Wetter es gestattet, sollte die Jugend — Mädchen wie Knaben müssen schwimmen lernen — in den Fluthen der Flüsse, Seen, des Meeres sich tummeln und die für's Baden bestimmte Zeit nicht allzu knapp bemessen werden, da ausser dem Aufenthalt im Wasser für uns Kulturmenschen, deren Haut durch das ständige Tragen meist viel zu warmer und dichter Kleidung verweichlicht und ihrer Aufgabe entwöhnt ist, auch Luft- und Sonnenbäder² vom grössten gesundheitlichen Vorthail sind. Volksbäder gehören zu den wohlthätig-

¹ Edel hat in einem Fussbad 180 Millionen Bakterien, allerdings wohl meist harmlose, gefunden.

² In mancher Narrheit steckt ein Körnchen Vernunft, so haben trotz aller Schrullenhaftigkeit „Naturmenschen“ wie Ernst Mahner, der Maler Dieffenbach und Gustav Nagel darin recht, dass eine abgehärtete, gegen Kälte unempfindliche Haut ein mächtiger Schutz gegen Krankheit ist.

sten Einrichtungen und Stiftungen; auch der ärmeren Bevölkerung sollten jederzeit warme und kalte Bäder unentgeltlich zur Verfügung stehen. Eine abgehärtete und leistungsfähige Haut bietet den besten Schutz gegen die häufigen, unter dem Eindruck der bakteriologischen Entdeckungen vielfach unterschätzten, von manchen Aerzten sogar vollständig geleugneten Erkältungskrankheiten¹, die oftmals erst den empfänglichen Nährboden für Ansteckungen schaffen; wie der Acker durch Pflug und Düngung vorbereitet wird für die Aufnahme des Saatkorns, so werden die Schleimhäute durch Entzündung gelockert und durch vermehrte Absonderung gedüngt für die Aussaat der Bakterien. Selbstverständlich können wir aus den verschiedensten Gründen auf die Bedeckung unseres nackten Leibes nicht mehr verzichten, wir täuschen uns aber, wenn wir glauben, durch immer neue Hüllen unsere Widerstandsfähigkeit erhöhen zu können; dadurch wird die Haut nur schlaffer und verwöhnter, irgend eine Ritze findet der Zugwind doch, und trifft er eine unter zu dichter Decke schwitzende Stelle, so ist die Erkältung um so sicherer.

Die Ernährung während des Wachstums muss zweckmässig und ausreichend sein, doch schadet hierbei ein Zuviel oft mehr als ein Zuwenig: langsam gewachsenes Holz ist fester und kernhafter als ein zu schnell aufgeschossenes. Gerade in dem gefährlichen Entwicklungsalter erzeugt zu reichliche und reizende Kost leicht eine bedenkliche Fröhreife, während die sparsame Natur bei geringerer Zufuhr die Nährstoffe zunächst zum Wachstum des Leibes und dann erst zur Ausbildung der Geschlechtswerkzeuge verwendet. Ein späterer Eintritt der Mannbarkeit bringt aber nur Vortheile mit sich, und die lichthaarige Menschenrasse, die dieses Erbtheil ihrer Entstehungsart verdankt, ist zweifellos schon dadurch allen dunkleren Rassen überlegen.

Auch bei den besten Anlagen, der zweckmässigsten Lebensweise bleibt, wie Jeder weiss, unsere Gesundheit von mancherlei Gefahren, von unzähligen kleinen Feinden, die uns das Mikroskop kennen gelehrt hat, bedroht, und es wäre Thorheit, die besonderen Schutzmittel, die uns die Wissenschaft an die Hand gibt.

¹ Dass die Erkältung von denkenden und erfahrenen Aerzten wieder nach Gebühr in Rechnung gezogen wird, zeigt ein sehr lesenswerther, wenn auch in einigem vielleicht zu weit gehender Aufsatz von Baelz „Ueber Erkältung, Klima, Rheumatismus u. s. w.“ Medizinische Woche 1901, No. 42—44.

zu verschmähen. Nur dürfen wir uns nicht der Täuschung hingeben, als ob wir durch Vernichtung der Seuchenerreger, der durch Anpassung harmloser Fäulnisbakterien ans Schmarotzerleben immer neue entstehen, alle Arbeit gethan hätten. Aus der durch die angedeuteten Mittel möglichen Züchtung ein gesünderen und widerstandsfähigeren Menschenschlags müssen wir unser Augenmerk vor Allem darauf richten, den gefährlichsten kleinsten Lebewesen durch allgemeine gesundheitliche Einrichtungen und Massnahmen ihre Brutstätten in unseren Wohnungen zu entziehen; denn neben den angeborenen Eigenschaften und der leiblichen Erziehung ist die Wohnungsfrage für die Volksgesundheit von ausschlaggebender Bedeutung. Licht,¹ Luft und Wasser sind zwar in unseren mit unheimlicher Schnelligkeit wachsenden Grossstädten nicht mehr so leicht zu beschaffen wie bei den Einzelhöfen unserer Vorfahren, bleiben aber auch heute noch die wichtigsten und wirksamsten Schutzmittel der Gesundheit. Niemand wird verkennen, welche Schwierigkeiten zu überwinden welche Opfer zu bringen sind, um auch den untersten Volksschichten gesundheitlichen Ansprüchen genügende Wohnungen zu beschaffen und doch darf sich der Volks- und Vaterlandsfreund nicht abschrecken lassen, gerade hier den Hebel anzusetzen. Was bisher an verschiedenen Orten auf diesem Gebiete geleistet worden berechtigt zu den besten Hoffnungen.

Als Beispiel für den hohen Werth ererbter Widerstandskraft lassen Sie mich die Zahnpflege anführen: wer immer Schädlichkeiten unserer Vorfahren aus der Völkerwanderungszeit in der Hand gehalten, wird die tadellosen Gebisse bewundert haben. Oft sind bei alten Leuten die Zähne bis auf die Wurzeln abgenützt, Spuren von Fäulnis aber finden sich äusserst selten. Wenn wir auch bei der sonstigen Reinlichkeitsliebe der Germanen annehmen dürfen, dass sie ihre Zähne sauber gehalten, so fehlten ihnen doch die zahllosen fäulnisshemmenden Mundwässer, mit denen die Neuzeit uns beglückt hat, und doch, welche

¹ Die bakterientödtende Kraft des Lichtes, besonders der kalten, blauen violetten und ultravioletten Strahlen, ist immer mehr erkannt, durch das Finson'sche Verfahren für die Heilkunde verwerthet und kürzlich durch eine von Dr. Bang erfundene und (Deutsche mediz. Wochenschrift) beschriebene Bogenlampe auf's Neue bestätigt worden.

Unterschied zwischen ihrem Gebiss und — trotz aller Sorgfalt und Pflege — dem durchschnittlichen von heute!

Da die weisse Rasse, in den Hauptkulturvölkern vertreten und kraft ihrer geistigen Ueberlegenheit zur Weltherrschaft berufen, ihr Erbtheil antritt und sich immer weiter über den Erdball verbreitet, gewinnt ihre Anpassungsfähigkeit an Himmel und Boden hervorragende Bedeutung. Es ist keine Frage, dass sie, seit ungezählten Jahrtausenden unter nordischem Himmel lebend, die zwischen den Wendekreisen herrschende Hitze schlecht erträgt und durch ihre Farbstoffarmuth, die sie bei Ausbildung ihrer sonstigen vortrefflichen Eigenschaften mit in den Kauf nehmen musste, gerade in heissen Ländern dunkleren Rassen gegenüber im Nachtheil ist. Auf der anderen Seite gibt gerade dem weissen Mann eine hochentwickelte Wissenschaft zahlreiche Fingerzeige und Hilfsmittel, mit denen er, bei vernünftiger Lebensweise und Mässigkeit, besonders in Genuss geistiger Getränke, auch in den heissesten Ländern sich gesund¹ und

¹ Dass die verschiedenen Menschenrassen, abgesehen von ihrer Lebenskraft und Widerstandsfähigkeit überhaupt, für einzelne Krankheiten mehr oder weniger empfänglich sind, ist bekannt. Im Allgemeinen kann man, so widersinnig es auch zuerst klingen mag, sagen, dass jede Rasse gegen diejenigen Krankheiten am unempfindlichsten und am besten geschützt ist, die in ihrer Heimath vorherrschen, so die dunkeln Südrassen gegen Sumpffieber aller Art, die hellen Nordrassen gegen Entzündungen der Schleimhäute; denn im Lauf der Zeiten sind immer die empfänglichsten und schwächlichsten Menschen unterlegen und so durch die natürliche Auslese ausgemerzt worden, oder die Ueberlebenden haben sich durch ein- oder mehrmaliges Ueberstehen von ansteckenden Krankheiten einen Schutz erworben, der sich durch Vererbung von Geschlecht zu Geschlecht verstärkt. Versetzt man ohne Uebergang Nordländer an den Gleicher oder umgekehrt, so werden sie unter den völlig veränderten Witterungs- und Bodenverhältnissen in der Mehrzahl zu Grunde gehen. Ebenso fordert eine in ihrem ursprünglichen Verbreitungsgebiet ziemlich harmlose Ansteckungskrankheit, wie z. B. die Masern, zahllose Opfer, wenn sie unter einen fremden Himmelsstrich verschleppt, auf ein früher von ihr verschontes Volk übertragen wird. Der Krebs, höchst wahrscheinlich keine ansteckende, sondern nur unter besonderen Umständen übertragbare Entartungskrankheit, scheint vorzugsweise gewisse Mischrassen zu befallen. Während er die Südrassen fast ganz verschont, ist er z. B. im Land Italien nach Kruse (München. Med. Wochenschrift, 1901 Nr. 48) entschieden „von der Rasse seiner Bewohner abhängig“. Da die Krebskrankheit vom Norden wie vom Süden gegen die Mitte unseres Welttheils an Häufigkeit zunimmt, scheint sie für die reinen europäischen Rassen weniger gefährlich zu sein, als für die der Kreuzung beider mit *Homo brachycephalus* entstammenden Mischlinge.

arbeitsfähig erhalten kann. Dauernde Eingewöhnung freilich wird für den Nordeuropäer in den Gebieten zwischen den Wendekreisen ohne Einbusse seiner hervorragenden Eigenschaften nicht möglich sein. Aber das ist im Grunde kein Nachtheil. Bleibt die Tüchtigkeit und Vermehrungsfähigkeit der Rasse im Mutterlande erhalten, so muss ja doch für stetigen Abfluss des Bevölkerungsüberschusses gesorgt werden. In Bergländern mit gemässigtem Klima kann auch am Gleichen Ackerbau und Viehzucht nach heimischer Sitte betrieben werden und aus wenigen Ansiedlern ein kräftiger Bauernstand, immer und überall die „Stütze der Gesellschaft“, heranwachsen. In den heissen Niederungen dagegen muss sich der Europäer mit der Rolle des Kaufmanns, Aufsehers und Verwalters begnügen und die eingeborene Bevölkerung durch zweckmässige, von Grausamkeit und Verhättschelung sich gleich fern haltende Behandlung zur Arbeit heranziehen. Vor Rassenmischung, obgleich sie unter Umständen die Angewöhnung erleichtert, muss sich der Weisse hüten, wenn er nicht auf seine Herrenstellung verzichten will, und Mischlinge — das mag hart klingen, ist aber unbedingt nothwendig — dürfen nie als ebenbürtig gelten. Aber auch bei völliger Reinhaltung der Rasse würde unter der Tropensonne nach weniger Geschlechterfolgen Thatkraft, Arbeitslust und Erfindungsgeist erschaffen. Ohne ständigen Zufluss frischen, lebenskräftigen Blutes aus der alten Heimath muss jede Ansiedelung in heissen Ländern verkommen. So werthvoll und nothwendig Kolonien für gesunde und vermehrungsfähige Völker auch sein mögen, im heimischen Boden sind und bleiben doch immer die „starken Wurzeln unsrer Kraft“.

Diskussion

über den Vortrag des Herrn Dr. L. Wilser.

Herr Prof. **Schröder** möchte den so beherzigenswerthen Worten des Vortragenden aus eigenen und mittelbaren Erfahrungen Einiges hinzufügen.

Eine Tendenz zur Verschlechterung der altgermanischen Rasse kann auch darin erblickt werden, dass wir unter den 34 hier Anwesenden nicht weniger als 20 mit Augengläsern Bewaffnete sehen. An der zunehmenden Kurzsichtigkeit ist unstrittig die Schule zu einem guten Theil schuld, insbesondere durch Nichtgewährung vernunftgemässer Pausen zwischen den Unterrichtsstunden, indem sie die Schüler zwingt, ganze zwei, im Sommer (7—10 Uhr) wohl auch drei Stunden hintereinander die Augen auf keine grössere Entfernung als die des Pultes oder der Schultafel zu accommodiren. Welche Wirkung dieses haben muss, kann man sogar an Thieren sehen, indem der blöde Blick unserer, wohl durchweg für kurzsichtig zu erachtenden Rinder auffallend kontrastirt mit dem Blick der auf Alpenmatten heranwachsenden Schweizer Kühe. Ich habe die Forderung eines „akademischen Viertels“ bei jeder Unterrichtsstunde, auch — und erst recht — bei den niederen Schulen (mit obligatorischem Verlassen des Schullokals und Begehung auf die Spielplätze) s. Z. in einer Folge von Zeitungsartikeln vertreten (Bad. Landeszeitung von 1883 Nr. 51, 54, 58), gleichsam als Vermächtniss bei meinem Uebergang vom Gymnasium an die Hochschule, doch leider, ohne den gewünschten Erfolg zu sehen.

Spielplätze sollten freilich auch immer vorhanden sein. Aber hier ist zu rügen, dass während man kostspielige Konzerthallen und Opernhäuser für die Unterhaltung der Erwachsenen baut (nicht zu reden von den Wirthschaften), für das Vergnügen der armen Kleinen oft so gut wie nichts geschieht (und wie genügsam pflegen diese doch zu sein; ein Bauplatz mit ein paar Sandhaufen!). Diese sind vielmehr zu ihrer

Erholung von Schul- und häuslichen Arbeitsstunden in vieler Stadttheilen lediglich auf die Strasse angewiesen, die Strasse mit ihrem stets sich steigernden und nebenbei durch Fahrräder, Autos etc. und elektrische Tramwägen auch immer gefährlicher werdenden Verkehre!

Hoffen wir, dass Schul- und Stadtärzte auf Beseitigung all dieser Mängel unermüdlich hinwirken!

In Bezug auf Körperpflege und Verweichlichung muss ich sagen: es beelendet mich immer, wenn ich die jungen Leute von heute, selbst in den warmen Sommermonaten, in eleganten Ueberziehern dahergehen sehe. Man weiss oft nicht, ob das auf Rechnung von Eitelkeit oder von Verweichlichung zu setzen ist (jedenfalls hat es die letztere zur Wirkung), und könnten vielleicht, soweit Studierende in Betracht kommen, unsere Anstaltsärzte, von denen zwei anwesend, hier gelegentlich ein Veto einlegen.

Von Interesse dürfte sein, dass es in vielen Staaten der Union Nordamerikas, wenn nicht in allen sicher z. B. in New-York und in Maryland, gesetzliche Bestimmung ist, dass kein Wohnhaus ohne eine Badestube errichtet werden dürfe. Die Wohlthat einer solchen konnte ich mir hier erst seit meinem jüngsten Umzug verschaffen; und verdiente es wohl der Erwägung, ob nicht auch bei uns auf Derartiges hinzuwirken wäre.

Die Fähigkeit der Mütter, ihre Kinder selbst zu stillen, war, wie mir aus meinem dortigen Aufenthalt erinnerlich, besonders in der Schweiz selten geworden und wurde von den dortigen Aerzten dies der fortgesetzten Inzucht zugeschrieben. den Heirathen zwischen Verwandten, wie sie neben den natürlichen oreographischen und klimatischen Verhältnissen auch künstlich die Gesetzgebung allzulange begünstigt hatte. Bis an die sechziger Jahre hatte sich nämlich die Schweiz 23 verschiedener Ehegesetzgebungen erfreut (etwa wie wenn wir in Baden deren 18 hätten). Nicht nur erschwerten diese vielfach das Heirathen zwischen Bewohnern entfernter Landestheile, indem z. B. im einen Kanton die Braut erst auf der Kanzel ausgerufen werden konnte, nachdem sie im Kanton des Bräutigams das Bürgerrecht erworben hatte. im letzteren dieses nicht erwerben konnte, bevor sie daheim von der Kanzel ausgerufen war; sondern es waren auch steigende Geldbussen darauf gesetzt bis zu Hunderten und Tausenden von

Fränkli, wenn jemand ein Mädchen aus dem andern Ort, oder andern Kanton oder gar ein Schwabenmädchen freite. Daher dann das Ueberhandnehmen gleicher Namen, sodass es z. B. in dem Marktflecken Langenthal an der Berner Grenze 2000 Personen gab, namens Geiser (und zur Bezeichnung einer bestimmten von diesen ein ganzes Ende ihres Stammbaumes hergezählt werden musste).

Endlich die „Junggesellensteuer“ betreffend möchte ich bekennen, dass ich vom Standpunkt eines solchen nichts gegen sie einzuwenden hätte unter der Bedingung, dass damit auch die Einführung einer „Korbsteuer“ Hand in Hand ginge. Denn wenn einmal die Unterlassung einer Handlung unter Strafe gestellt werden soll, bei der Zweie zusammenwirken müssen, wäre es doch offenbar unbillig, bloss den willigen Theil zu verfolgen, und den widerstrebenden leer ausgehen zu lassen. Habe ich aus dem Vortrag gelernt, dass jener Vorschlag schon vor mehr als 2 Jahrtausenden im Ernste gemacht worden, so kann ich andererseits versichern, dass dieser Gegenvorschlag auch nicht von mir herrührt, weshalb ich mir gestatten darf, den Witz einen guten zu nennen.

Herr Geheimerath Dr. **Battlehner** beklagt, dass die Schulpjugend viel zu früh, und zwar meist durch die Lehrer veranlasst, Augengläser zu tragen anfangen; dies könnte vermieden werden, wenn den Kindern ihre Plätze nach der Beschaffenheit ihrer Augen angewiesen würden.

Herr **Otto Ammon**. Herr Dr. Wilser hat uns heute einen sehr interessanten Vortrag gehalten, bei dem er von der Entstehung der europäischen Hauptrasse ausging. Was er hierüber gesagt hat, scheint mir ein richtiges Bild der Entwicklung zu geben. Mit Ausnahme der Vererbung erworbener Eigenschaften, die zwischen ihm und mir schon lange eine Meinungsverschiedenheit bildet, bin ich in den wesentlichen Punkten mit ihm einverstanden. Ich will für unsere Ansichten kein grösseres Gewicht beanspruchen, als der Umstand rechtfertigt, dass zwei Personen, die sich mit dem Studium eines Gegenstandes befassen, dahin gelangt sind, sich von demselben ein annähernd gleiches Bild zu machen. Diese Uebereinstimmung verstärkt immerhin die Wahrscheinlichkeit der Ergebnisse. Ich möchte mir nur erlauben, Bemerkungen zu einigen Einzelheiten zu machen.

Herr Dr. Wilser hat nach Strabo angeführt, dass man die 10 edelsten Jünglinge und die 10 edelsten Jungfrauen miteinander zu verheirathen pflegte, um die Rasse zu verbessern. Es leuchtet mir nicht ein, dass auf diese Weise der Durchschnitt der Rasse gehoben werden konnte. Man wird durch die Paarung der edelsten Individuen allerdings einzelne hervorragende Ergebnisse erzielt haben, und das war wohl auch der Zweck. Was werden aber die übrigen Individuen gethan haben? Sie haben sich jedenfalls auch gepaart, nach ihrer freien Wahl, und sie werden bei ihrer Nachkommenschaft ein Durchschnittsmass erzielt haben, welches ebensoviel unter dem Gesamtdurchschnitt blieb, wie das der 10 Auserwählten über demselben war. Eine Erhöhung des Gesamtdurchschnittes ist auf diese Weise nicht durchzuführen, sondern nur durch Selektion. Nur wenn den Minderwerthigen die Fortpflanzung erschwert oder wenn sie ganz verhindert wird, kann sich der Durchschnitt heben. Im Alterthum war es gewiss in vielen Volksgemeinschaften der Fall, dass die Minderwerthigen eine weniger zahlreiche Nachkommenschaft erzielten, als die Hochstehenden, und dann musste nothwendigerweise eine allmähliche Hebung des Durchschnittsniveaus eintreten.

Gehen wir über zur Gegenwart, so erkennen wir an der Hand des Gesagten, dass wir uns in einer verkehrten Selektion befinden. Die Männer, die durch Begabung und Wissen eine hohe individuelle Stufe einnehmen, sind in der Regel nicht in der Lage, frühzeitig zu heirathen. Sie haben bis zum 24. oder 25. Jahre zu studieren (das Jahr des Militärdienstes eingeschlossen), dann sollten sie noch Reisen unternehmen, um die Welt zu sehen, und wenn sie zurückkommen, haben sie noch keine Stellung im bürgerlichen Leben, die ihnen die Gründung eines eigenen Herdes gestattet. Sie müssen sich in freien Berufen oder im Staatsdienst erst eine solche Stellung erwerben, und dabei mögen sie leicht 30 Jahre alt werden, bevor sie zur Ehe schreiten können. Das Einkommen der gebildeten Klassen ist in der Regel so bemessen, dass ihnen die standesgemässe Erziehung mehrerer Kinder schwer fällt. Unter standesgemäss verstehe ich, dass sie in der Lage sind, führe Kinder mindestens mit der nämlichen Bildung auszustatten, die ihnen zu Theil geworden ist, und dass sie allgemein so leben können, wie es Leuten mit vorwiegend geistiger Arbeit ein Bedürfniss ist. Dem gegenüber steht die untere soziale Schicht.

die mit 18—20 Jahre ihre Lehre beendet hat und nach Ableistung des Militärdienstes, also mit 22—24 Jahren in der Regel heirathet, alsdann auch eine beliebig grosse Kinderzahl erziehen kann. Denn der Kinderreichtum in einfachen Familien bildet nur bis zu einer gewissen Höhe eine Ursache von Ausgaben, nämlich solange noch kein Kind aus der Schule ist und mitverdienen kann. Ist der Zeitpunkt erreicht, dass für jedes nachkommende Kind ein anderes die Schule verlässt, so ist in der Regel die Noth vorüber. Die verdienenden Kinder tragen einige Jahre, bis sie selbständig werden, zu den Kosten des Haushaltes bei und in solchen Familien herrscht oft ein verhältnissmässiger Wohlstand im Vergleich mit anderen der nämlichen sozialen Stufe.

Die Gegenwart hat dieses soziale Problem nicht begriffen. Die Einführung einer Junggesellensteuer würde nur das Symptom des Uebels treffen, nicht dessen Ursachen. Man müsste vielmehr das Einkommen der Beamten und Gelehrten bedeutend erhöhen, um ihnen die Eingehung einer frühzeitigen Ehe zu ermöglichen. Wenn man aber die Aeusserungen der öffentlichen Meinung verfolgt, so gehen diese immer dahin, dass hauptsächlich den unteren Beamtenklassen aufgebessert werden müsse und dass die oberen nichts brauchen. Man begnügt sich bei letzteren bestenfalls mit einer Erhöhung von geringerem Procentbetrag. Der Staat hätte es in der Hand, mit den Besoldungen eine rationelle Sozialpolitik zu treiben; aber dieser Gesichtspunkt liegt ihm noch ganz ferne. Nicht nur, dass er den verheiratheten und den ledigen Beamten die gleiche Besoldung gewährt, er denkt nicht einmal daran, das Wohnungsgeld verschieden abzustufen, obwohl doch anzunehmen ist, dass ein verheiratheter Mann eine grössere Wohnung braucht als ein lediger. Hier den Verhältnissen Rechnung zu tragen, wäre wirksamer als eine Junggesellensteuer. Durch die bisher verfolgte Politik werden die gebildeten Klassen relativ immer schlechter gestellt, ihre Ehelosigkeit wird befördert, das Uebel vergrössert. Während die Leute, die durch persönliche Anlagen im Stande waren, ihren Platz zu erringen, an der Uebertragung ihrer Eigenschaften auf eine zahlreiche Nachkommenschaft gehindert werden, werden die weniger Tüchtigen, die sich nicht heraufzuschwingen vermochten, zur Erzielung eines ihnen gleichenden Nachwuchses in den Stand gesetzt. Wenn ich sage, ihnen gleichenden, so meine ich natürlich

im Durchschnitt. Es wird nicht bestritten, dass in einzelnen ihrer Kinder besonders günstige Kombinationen von Anlagen eintreten können, aber bei anderen ist auch das Gegentheil der Fall und im Grossen und Ganzen gilt der Satz: Gleiches erzeugt Gleiches.

Es wird schwer, fast unmöglich sein, solchen Anschauungen Bahn zu brechen, denn sie widersprechen allem, was auf der politischen Bühne dargestellt wird, dem Grundsatz der Gleichheit aller Menschen, der zu einer völligen Nivellirung der Standesunterschiede hinstrebt, und insbesondere auch dem Popularitätsbedürfniss, das unsere Gesetzgeber mehr und mehr beseelt. Wollte sich einer derselben zu obigen Ansichten bekennen, so würde er bald von der Bühne verschwinden. Wer aber einer vernünftigen, auf Kenntniss der Naturgesetze beruhenden Anschauung huldigt, wird sich dadurch nicht abhalten lassen, das, was er für wahr hält, offen auszusprechen, und er wird sich dem Meinungsterrorismus der Massen so wenig unterwerfen, wie er sich gegenüber irgend einem anderen Terrorismus unterwerfen würde.

Es ist ein unermesslicher Schaden für die Gesamtheit, der dadurch entsteht, dass hochbegabte, charakterfeste Männer so selten in die Lage versetzt sind ihre Gaben auf eine zahlreiche Nachkommenschaft zu übertragen. Was durch die geschilderte Einschränkung für immer erstirbt, ist ein grösserer Verlust als der schlechte Ausfall einer Getreide- oder Weinernte. Hielte ich die Vererbung erworbener Eigenschaften für richtig, so müsste ich den Verlust noch höher einschätzen als ich es thue.

Die Folgen der verkehrten Auslese treten nicht sofort vor Augen, aber sie bleiben nicht aus. Es bedarf einer längeren Periode, um sie sichtbar zu machen. Wenn wir beobachten, wie heutzutage alles Hohe erniedrigt, alles Ernste verspottet, das Talent missachtet und das Ungesunde oder Schwache gehätschelt wird; ferner wie die sog. öffentliche Meinung mehr und mehr sich dem Alltäglichen, Gewöhnlichen, um nicht zu sagen dem Gemeinen zuwendet, kurz, wie alles verpöbelt wird, so mag man schon deutliche Anzeichen des Rückschrittes bemerken.

Herr Dr. Wilser hat auch die Verzögerung des Eintrittes der Pubertät für wünschenswerth erklärt. Der Zeitpunkt der Pubertät ist grossen individuellen Schwankungen unterworfen, weit grösseren, als man gewöhnlich annimmt. Er wird vorgerückt oder hinaus-

geschoben je nach dem Abschluss der physiologischen Bilanz. Kinder mit geringer Ernährung und reichlicher Bewegung wachsen langsam und entwickeln sich spät; umgekehrt ist es bei wohlgenährten Kindern mit wenig körperlicher Bewegung. Welche Faktoren hierauf Einfluss haben, das konnte ich überraschend beobachten an den Knaben aus einem unserer Harddörfer. Schon als Kinder hatten sie täglich den Weg nach Karlsruhe zu machen, zwei Stunden hin und ebensoviel zurück, um den ganzen Tag Haus um Haus abzusuchen als Verkäufer von Kienholz oder Veilchen u. s. w. je nach der Jahreszeit. Später wurden sie Speissträger bei den Bauten. Sie kamen als solche erst um 9 Uhr Abends nach Hause und mussten schon Früh 4 Uhr wieder aufstehen, hatten also auch wenig Schlaf. Fast alle diese Knaben entwickelten sich sehr spät. Mit 17 oder 18 Jahren sahen sie wie 14- oder 15jährige Stadtjungen aus. Nun wurde im Lauf der letzten Jahre nicht bloss die Arbeitszeit der Maurer abgekürzt und der Lohn erhöht, sodass eine bessere Ernährung Platz greifen konnte, sondern, was viel wichtiger war, es entstand eine Eisenbahn nach jenem Dorfe. Die Knaben fahren jetzt hin- und zurück, können auch länger schlafen, und die Folge ist, dass die Pubertät früher einsetzt. Der Unterschied war bedeutend, denn die physiologische Bilanz hatte durch erhöhte Einnahmen bei gleichzeitig sehr ermässigten Ausgaben von Energie eine gründliche Aenderung erlitten.

Das Musterungsgeschäft zeigt ein bedeutendes Schwanken der Reife bei den verschiedenen Individuen. Der Durchschnitt für das Pubertätsalter ist bei den Wehrpflichtigen ländlicher Abkunft etwa 17 Jahre, bei städtischen Eingewanderten etwa 16 Jahre, bei stadtgeborenen Knaben etwa $15\frac{1}{2}$ Jahre, es geht aber bei den Söhnen vermöglicher Bürgerfamilien auf $13\frac{1}{2}$ —14 Jahre und in einzelnen Fällen bis auf $12\frac{1}{2}$ Jahre herunter. Auch nach oben schwankt es selbstverständlich über das Mittel hinaus, und wir begegnen Wehrpflichtigen von 20 Jahren, die noch vollständig kindlichen Habitus besitzen. Unter 6800 ländlichen Wehrpflichtigen Badens waren es 68, also genau 1 Proz. Unter den 21jährigen ländlichen Zurückgestellten kamen solche knabenhafte Individuen auch noch vor, unter den 22jährigen bloss ganz vereinzelt, und unter der städtischen Bevölkerung waren sie überhaupt fast verschwindend.

Man wird zugeben, dass eine Variationsbreite (Abänderungsspielraum) von über 8 Jahren, von $12\frac{1}{2}$ bis 21 sehr gross ist auf das Durchschnittsalter von 17 Jahren berechnet macht die Schwankung 50 Proz. aus, und zwar so ziemlich gleich 25 Proz. nach oben und nach unten. Welche Bedeutung die frühe Entwicklung für die hygienischen, sozialen und moralischen Beziehungen hat, ergibt sich aus der folgenden Betrachtung. Ein Individuum, das mit $12\frac{1}{2}$ Jahren mannbar wird und mit 30 Jahren eine Ehe schliessen kann, muss über 17 Jahre im geschlechtsreifen Zustand warten, bis er seine natürlichen Triebe auf legitime Art befriedigen kann. Ein junger Arbeiter oder Bauer, der mit 16 oder 17 Jahren die Reife erlangt, heirathet mit 23, und wenn er vom Heeresdienst befreit ist, oft schon mit 21 Jahren, als unmittelbar darnach. Es lässt sich leicht ausdenken, welche Folgen diese tiefgreifenden Unterschiede haben, und es ist gewiss ein Vortheil für jeden Knaben, spät entwickelt zu werden.

Unsere Schuleinrichtungen mit den vielen Sitzstunden, denen sich noch häusliche Arbeiten anreihen, wirken aber geradezu daraufhin, die physiologische Bilanz in dem entgegengesetzten Sinn zu beeinflussen. Gute Ernährung bei geringer Bewegung dazu die Störungen des Blutumlaufes durch die gekrümmte Haltung, die Anhäufung des Blutes im Unterleib, das sind lauter nicht mehr gut zu machende Schädlichkeiten von grosser Tragweite. Das Bestreben, auch auf dem Lande die Ganztagschule allgemein zu machen, beruht auf einer Ueberschätzung des Werthes des Unterrichts, des „Drills“, und auf einer Unterschätzung des Bedürfnisses der Jugend nach körperlicher Bewegung. Man sollte vielmehr dahin wirken, dass der Halbtagsunterricht an unseren Mittelschulen zur Wahrheit wird, was er zur Zeit nicht ist. Denn an die fünf Vormittagsstunden reihen sich eine oder zwei Nachmittagsstunden an einem oder zwei Tagen der Woche. Wenn es auch nur eine ist, so zerschneidet sie den Nachmittag so, dass von einer ausgiebigeren körperlichen Bewegung (Ausflug, Schlittschuhlaufen, Rudersport etc.) in der Regel keine Rede mehr sein kann, zumal im Winter, wenn die Tage so kurz sind.

Wie unnatürlich unsere Verhältnisse geworden sind, zeigt sich auch an der Verschönerungstendenz, alle freien Plätze der Stadt auf denen Kinder spielen konnten, mit gärtnerischen Anlagen zu versehen und diese einzuzäunen. Mir gefällt ein Platz vol-

spielender Kinder besser als das schönste Blumenbeet. Als ich aber in einem Verein mit dem Antrag hervortrat, den damals noch wüst liegenden Sonntagsplatz, auf dem Kinder nothdürftig spielen konnten, dem Stadtrath zu besserer Entwässerung und zur Herstellung als Spielplatz vorzuschlagen, stiess ich auf den Widerspruch aller Besitzer und Miether der umliegenden Häuser und musste meinen Antrag zurückziehen. Ein Volk, das an den Spielen seines Nachwuchses keine Freude mehr hat, sondern nur den Lärm fürchtet, befindet sich in einem vorgerückten Stadium von Nervosität.

Was die Bäder betrifft, so bedaure ich das Abkommen der offenen Bäder in unserer Umgebung, denn das Baden in geschlossener Schwimmhalle kann das Baden im Freien nicht ersetzen. Ich möchte wissen, ob schon Jemand bakteriologische Untersuchungen des Wassers von öffentlichen Schwimmhallen angestellt hat. Aber auch wenn diese günstig ausfallen sollten, so bliebe doch der Mangel des direkten Sonnenlichtes bestehen, dessen grossen reinigenden und antiseptischen Einfluss Herr Dr. Wilser geschildert hat. Karlsruhe besass bis vor Kurzem ein praktisch gelegenes Bad im Lautersee. Es wurde von Arbeitern der an der Beiertheimer Allee gelegenen Fabriken nach Feierabend und von Schulknaben fleissig benutzt. Aber die Prüderie nahm Anstoss daran, dass die Spaziergänger von der Apfelallee aus oder von der Seepromenade die Freischwimmer sehen konnten, und das Bad musste weg. Es ist wirklich belustigend, dass der Anblick eines Schwimmenden dort anstössig war. Wer die Schwimmfeste im Vierordtsbade besucht, der kann gegen ein kleines Eintrittsgeld die Schwimmkünste von jungen Herren und jungen Damen bewundern, und ein zahlreiches Publikum beider Geschlechter ergötzt sich an dem Schauspiel, in dem noch niemand etwas Ungewöhnliches gefunden hat.

Was die Zähne und die Augen betrifft, so glaube ich, dass die eingetretene Verschlechterung auf dem Wegfall der natürlichen Auslese beruht. Gewiss hatten unsere Vorfahren eine rationelle Zahnpflege, denn sogar bei den Wilden Innerafrikas sahen Reisende, wie sie nicht nur durch Zahnstocher die Zwischenräume der Zähne von Speiseresten befreiten, sondern durch bleistiftdicke Hölzchen, an denen durch Aufstossen auf einen Stein ein sog. „Bart“ erzeugt war, die Flächen der Zähne reinigten. Aehnlich wird es

auch bei den alten Germanen gewesen sein. Aber wenn die Reinigung genügen würde, so müssten viele Leute gute Zähne haben, die längst falsche tragen. In den alten Zeiten war ein gutes Gebiss zur Existenz nöthig. Schlechte Zähne konnten die rauhen Nahrungsmittel nicht bewältigen, und die Individuen mit schlechten Zähnen wurden durch Magen- und Darmkrankheiten ausgemerzt. Künstlichen Zahnersatz gab es nicht, und eine Anleitung zum Kochen für Magenkranke auch noch nicht.

Ebenso machte Kurzsichtigkeit untauglich zum Bestehen des Kampfes ums Dasein. Die Erfindung der Brille erhält die kurzsichtigen Individuen und setzt ihre Tüchtigkeit nahezu derjenigen der Normalsichtigen gleich. Das Aufhören der Selektion muss aber dazu dienen, die Kurzsichtigkeit, die kein störendes Gebrechen mehr ist, in immer weitere Kreise zu verbreiten.

Ich möchte deswegen die Schuld an der Kurzsichtigkeit nicht den Schulen allein aufbürden. Gewiss haben sie früher zur Vermehrung der Kurzsichtigkeit beigetragen, indem sie mit der Billigkeit wegen möglichst eng und klein bedruckten Schulbüchern eine Gelegenheitsursache boten. Aber die wirksamste Ursache der Zunahme der Brillenträger in unserem Volk dürfte in dem Aufhören der Selektion zu suchen sein, woran die Schule unschuldig ist. Immerhin war es gut, dass man durch geeigneteren Druck, durch grössere Helligkeit der Schulzimmer u. s. w. zur Schonung der Augen beigetragen hat.

Herr Dr. Wilser hat auch die Tropenhygiene berührt, die im Hinblick auf unseren Kolonialbesitz von steigender Wichtigkeit für uns ist. Da wir wenig Kolonien haben, die sich für weisse Ansiedler eignen, liegt die Gefahr der Rassenmischung für die in Kolonien lebenden Deutschen nahe. Für die daraus entspringenden Mischlinge sollte der Satz Geltung haben, der bei unseren germanischen Vorfahren Rechtens war, dass die Kinder aus Mischehen der ärgeren Hand folgen. Andernfalls entstehen für das Mutterland die grössten Unzuträglichkeiten. Die Portugiesen, die früher ein grosses Kolonialreich besaßen, haben aus demselben so viel farbiges Blut in ihre Heimath verschleppt, dass ihre eigene Rasse merklich dadurch beeinflusst wurde. Die Bewohner Portugals haben eine sehr dunkle Hautfarbe und können auch in psychischer Beziehung nicht mehr als ein unvermischter Zweig der weissen Rasse angesehen werden. Anders in dem ger-

manischen Holland, wo man ein stärkeres Gefühl für den Blutunterschied hatte, als bei den Iberern. Die Holländer liessen die Mischlinge meist in den Kolonien zurück. Das war anscheinend eine Härte, in Wirklichkeit war es keine. Denn unter den Farbigen konnten die Mischlinge sich als etwas Besseres bewähren, während sie in Europa doch nur zum Ausschuss geworfen worden wären. Eine gewisse Selbstüberwindung aus Rücksicht auf das Volksganze muss von dem Einzelnen, der sich in eine solche Lage bringt, gefordert werden.

Es ist ein Verdienst des Majors Leutwein, dass er versuchte, in der einzigen für die Ansiedelung Weisser geeigneten Kolonie, die wir besitzen, die Frauenfrage durch den Bezug weisser Landsmänninnen zu lösen; dass dies im Reichstag von einer Seite getadelt wurde, ist kein Beweis dagegen. Durch die Ansiedelung einer Anzahl von Burenfamilien in Deutsch-Südwestafrika geschieht ein weiterer Schritt zur Lösung dieser Frage. Die Buren haben sich verpflichtet, ihre Kinder deutsch erziehen zu lassen, und ihre Töchter werden zu Stammmüttern einer deutschen Bevölkerung werden. Das müssen wir begrüßen, denn wenn der weisse Mann wählen kann, verschmäht er das farbige Blut. Die Gefahr einer Mischlingsbevölkerung in den Kolonien besteht darin, dass mit der Zeit unfehlbar die Losreissung vom Mutterland erfolgt. Diese Gefahr erscheint nunmehr für Deutsch-Südwestafrika beschworen.

Herr Direktor **Treutlein**. Mehrfach ist im Verlaufe des Abends die Schule erwähnt worden; es möge darum auch einem Schulmann gestattet sein, das Wort zu ergreifen. Es geschieht, um an einige gefallene Aeusserungen Bemerkungen anzuknüpfen.

Erstens, anknüpfend an eine Aeusserung Schröders, muss gesagt werden, dass es heute in den Schulen betreffs Gesundheitspflege doch vielfach besser bestellt ist; vielfach sind jetzt Pausen in den Gang des Unterrichts eingeschoben. So bestehen z. B. am Reformgymnasium bei sog. fünfstündigem Vormittagsunterricht nach der zweiten Unterrichtsstunde 20 Minuten Pause, nach der ersten und dritten Stunde je 5, nach der vierten Stunde 10 Minuten Pause; in den grossen Pausen müssen die Schüler das Klassenzimmer verlassen und die Zimmer werden gelüftet.

Zweitens, anknüpfend an eine Aeusserung Battlehners, muss gesagt werden, dass doch in Bezug auf Bestehen und Verschlim-

merung der Kurzsichtigkeit der Schüler nicht so sehr die Schul auf die Lehrer falle, weil diese die zu Kurzsichtigkeit neigende Schüler vorzeitig zum Gebrauche von Brillen veranlassen, j zwingen, sondern dass mancfach vielleicht die Hausärzte zu sehr geneigt seien, zum Anschaffen und Tragen von Brillen zu rather Ueberhaupt mache doch die Schule nicht gar so selten die Erfahrung, dass Hausärzte in begreiflicher, aber nicht immer Gesundheit fördernder Weise durch Ausstellen von Entschuldigungszeugnissen beihelfen, Schüler vom ganzen Turnunterricht oder von einzelnen Zweigen desselben zu befreien, in Fällen, bei denen ein nicht volles Aussetzen des Turnens vielleicht für den betreffenden Jungen besser wäre.

Drittens solle doch betreffs der Gesundheitspflege überhaupt darauf hingewiesen werden, dass für Beschaffung einer annähernd genügenden Zahl von ausreichend grossen Spielplätzen eifriger als dies jetzt geschehe, Sorge getragen werden müsste. Seit einigen Jahren habe er in der hiesigen Schulkommission wiederholt dafür gesprochen, solche Spielplätze zu gewinnen und einzurichten, die hiesige Gemeindevertretung habe auch ihr Einverständnis und ihre volle Zustimmung hierzu geäussert, habe auch einen Theil des Messplatzes dazu hergegeben und die Anfänge der Einrichtung geschaffen zum Benützen des Platzes für Spielen; aber eine weitere Ausgestaltung dieses Platzes oder die Beschaffung weiterer Plätze sei bislang unterblieben, wie Jedermann wisse, wegen Mangels der erforderlichen Geldmittel. Redner möchte aber alle Anwesenden dazu auffordern, möglichst für die Bereitstellung von Spielplätzen einzutreten und ihrerseits beizuhelfen, dass das im Bewegungsspiel der Jugend liegende Beförderungsmittel der Gesundheit zu seinem Recht komme.

Herr Medicinalrath Dr. **Leo Müller**. 1. Bei allen Schulkindern, die einen höheren Grad von Kurzsichtigkeit oder anderweitiger Sehstörung zeigen, ist die Bestimmung der etwa notwendigen Brille durch einen Augenarzt unbedingt geboten, wenn nicht Schädigungen der Sehkraft und damit der Gesundheit und späteren Erwerbsfähigkeit die Folge eines laienhaften Experimentirens sein sollen.

2. Den Bestrebungen für Einrichtung von Kinderspielplätzen, womöglich auch im Innern der Stadt, stehen die Aerzte durchaus sympathisch gegenüber.

3. Wenn einzelne ärztliche Zeugnisse, um Kinder vom Turnunterricht zu dispensiren, aus Gefälligkeit gegen die Eltern sollten ausgestellt worden sein, so wären solche Fälle ganz entschieden zu verurtheilen. In seiner Allgemeinheit aber muss der Vorwurf des Herrn Direktor Treutlein gegen die Aerzte von diesen ebenso entschieden zurückgewiesen werden; denn die Herren Lehrer sind nicht in der Lage, zu erkennen, ob ein Kind, das etwa Anlage zu Lungen- oder Herzkrankheiten hat, durch die Anstrengungen und den unvermeidlichen Staub beim Turnen in seiner Gesundheit geschädigt wird, wohl aber ist der Hausarzt dazu im Stande, und er handelt dann nur pflichtgemäss, wenn er ein solches Kind vom Turnen dispensiren lässt, auch wenn noch keine für Jedermann erkennbare Krankheit vorhanden ist.

Herr Geh. Rath **Engler** erinnert daran, dass Herr Ammon in einem früheren sehr interessanten Vortrag ausgeführt habe, wie der Stammbaum einer auffallend grossen Zahl geistig hervorragender Männer in kurzer Linie auf das Land zurückführe, und dass die Eigenschaft hoher geistiger Bedeutung schon nach wenig Generationen einen — oft sogar auffallend plötzlichen — Rückgang gesunder Körperkonstitution erkennen lasse, der naturgemäss auch mit einem Nachlassen geistiger Leistungsfähigkeit verbunden sei. Redner glaubt deshalb, dass es zur Hebung der allgemeinen Intelligenz empfehlenswerther sei, statt bei zukünftiger Besserstellung der staatlich Bediensteten vorwiegend die höheren Beamtenklassen zu berücksichtigen, in höherem Grad der aufstrebenden unteren Kategorien zu gedenken, vor Allem aber auch, hervorragend begabten Söhnen Unbemittelter durch staatliche Unterstützung die Möglichkeit zu bieten, eine ihrer hohen natürlichen Begabung entsprechende geistige Ausbildung zu erlangen. Mit den Vorrednern erkenne er die Nothwendigkeit der Schaffung öffentlicher Plätze für Jugendspiele und körperliche Uebungen an und hofft, dass die massgebenden Faktoren des Staates und der Gemeinden dafür sorgen, dass wir den uns auf diesem Gebiete weit vorausgeeilten Engländern und Amerikanern endlich etwas näher kommen. Hinsichtlich der in dem Vortrage des Herrn Dr. Wilser berührten Zurückführung des Ursprungs von Seife und Bier auf die Germanen macht der Redner darauf aufmerksam, dass grosse Neuerungen und Entdeckungen sehr oft in gewissen Entwicklungsstadien der Kultur begründet seien, und

dass sie deshalb nicht selten zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten ganz unabhängig voneinander in die Erscheinung träten. Gerade für Seife und Bier scheine dies zuzutreffen, da man in Egypten jedenfalls die zur Seifenbearbeitung erforderliche Soda dargestellt, auch entsprechende Laugen beim Mumificiren angewendet habe, und zweifellos stehe fest, dass im gleichen Lande auch das Bier schon vor Tausenden von Jahren ein sehr beliebtes und in grosser Menge aus Getreide bereitetes Getränk gewesen sei.

Herr **Otto Ammon**. Mit den Bemerkungen des Herrn Geh. Rath's Dr. Engler bin ich ganz einverstanden. Die gebildeten Klassen sind bei uns keine Kasten, die sich abschliessen. Der Eintritt ist jedem talentvollen Individuum ermöglicht, und wir sehen, dass beständig frisches Blut von unten emporsteigt. Dem Unbemittelten wird durch Stipendien und andere Erleichterungen geholfen, sicher mit dem besten Willen, wenn auch vielleicht nicht immer in der richtigen Weise, denn die Auswahl der Würdigen ist sehr schwierig und schliesst Missgriffe nicht aus, wie alle, die mit Vergebung von Stipendien zu thun haben, bestätigen werden. Das Unrecht besteht darin, dass wir den Leuten bis zum Staatsexamen vorwärts helfen, und sie alsdann mit einem Einkommen anstellen, das sie auf Jahre hinaus zum Junggesellenthum nöthigt, oft so lange, bis sie sich daran gewöhnt haben und auf die Eingehung einer Ehe verzichten.

Herr Prof. Dr. **Schröder**. Mit dem Rath des Herrn Geheimerath Battlehner, die Schulkinder möglichst lange vom Gebrauch der Augengläser zurückzuhalten, kann ich mich nicht einverstanden erklären. Solches dürfte sich nach meiner Meinung höchstens ganz am Anfang der sich einstellenden Kurzsichtigkeit empfehlen, solange sich die Augen sozusagen noch selbst aufraffen und bei geeigneter Diät, Schonung und Uebung die ihnen zugemutheten Fernaccommodationen noch leisten können. Sobald jedoch das Uebel einen solchen Grad erreicht hat, dass dies nicht mehr gelingt, geben die Augenmuskeln die über ihre Kräfte gehenden Accommodationsanstrengungen ganz auf, werden immer schwächer und bildet sich Blödsichtigkeit aus. Ich möchte den gerade entgegengesetzten Rath für besser halten und weise auf

lie verhängnissvollen Wirkungen eines etwaigen principiellen Irrthums in dieser Frage hin. In meiner Knabenzeit verschlechterten sich meine Augen zusehends von Woche zu Woche, blieben jedoch vom Moment des Gebrauchs einer Brille an so constant, dass die Schärfe der letzteren bloss nach dem zweiten Staatsexamen um eine Nummer gesteigert werden musste und heute noch eine geringe ist. Der von mir auch Bekannten ertheilte Rath zum sofortigen Brillengebrauche wurde mir nach Jahren u. a. von dem Dirigenten Becker des berühmten Florentiner Quartetts) stets wärmstens verdankt.

Der **Vortragende** begrüsst freudig die überaus anregenden und lebhaften Erörterungen, die manches im Vortrag nur Getreifte in helleres Licht gerückt haben, und dankt den betheiligten Herren für die dadurch bekundete Theilnahme an den zur Sprache gebrachten Fragen.

So wenig schmeichelhaft der Vergleich klingen mag, dass den natürlichen Lebensbedingungen entrückte Stallvieh zeigt doch, wie schon wiederholt hervorgehoben, in mehr als einer Hinsicht Aehnlichkeit mit uns Kulturmenschen. Auch die schädlichen Folgen der Inzucht sind schon früher beleuchtet worden.

Ein unwiderleglicher Beweis für die Vererbung erworbener Eigenschaften sind die erblichen Krankheiten, die durch die Auslese längst ausgemerzt sein müssten, wenn durch Vererbung während des Lebens erlittener Schädigungen nicht immer neue entstünden. Die Verschlechterung der Zähne und Augen ist, neben allgemeiner Schwächung der Rasse, einerseits auf zu geringen Gebrauch, anderseits auf Ueberanstrengung zurückzuführen; eine Mitwirkung der Auslese ist darum unwahrscheinlich, weil der Rückgang ganz allmählig erfolgt. Dass manche Augen durch fortgesetzte Naharbeit erheblich, andere kaum geschädigt werden, beruht auf ihrer in verschiedenem Masse ererbten Widerstandskraft.

Eine wohlerwogene, auf naturwissenschaftlicher Grundlage aufgebaute Ehegesetzgebung wird jedem Staatswesen den grössten Vortheil bringen; selbstverständlich müssen Erleichterung erwünschter und Erschwerung unerwünschter Eheschliessungen Hand in Hand gehen.

Nach dem bestimmten Zeugniß des älteren Plinius haben jedenfalls die Römer die aus Fett und Asche bereitete Seife durch die Gallier kennen gelernt. Die Kunst des Bierbrauens ist wahrscheinlich schon in der Steinzeit erfunden und durch Völkerwanderungen weit verbreitet worden.

VERHANDLUNGEN
DES
NATURWISSENSCHAFTLICHEN
VEREINS
IN
KARLSRUHE.

SECHZEHNTER BAND.

1902—1903.

KARLSRUHE.
DRUCK DER G. BRAUN'SCHEN HOFBUCHDRUCKEREI.
1903.
Printed in Germany

VERHANDLUNGEN
DES
NATURWISSENSCHAFTLICHEN
VEREINS
IN
KARLSRUHE.

— — — — —
SECHZEHNTER BAND.

1902—1903.

KARLSRUHE.
DRUCK DER G. BRAUN'SCHEN HOFBUCHDRUCKEREI.
1903.

INHALT.

	Seite
Jahresbericht	V
Besuch der Sitzungen	V
Rechnungsführung	V
Büchersammlung	VI
Drucksachen-Tauschverkehr	VII
Vorstand	XII
Bewegung unter den Mitgliedern	XIII
Mitgliederverzeichnis	XIV

Sitzungsberichte.

	Seite
581. Sitzung am 6. Juni 1902.	
Fortsetzung der Mitglieder-Hauptversammlung vom 16. Mai 1902	1*
Treutlein: Kassenbericht	1*
Rupp: Über diätetische Nahrungsmittel	1*
582. Sitzung am 20. Juni 1902.	
Vorsitzender: Nachruf auf Hofrat Dr. Schröder	4*
May: Charles Lamarck	4*
583. Sitzung am 4. Juli 1902.	
Kneucker: Bericht über seine botanische Studienreise durch die Sinaihalbinsel	5*
584. Sitzung am 18. Juli 1902.	
Engler: Darstellung künstlicher Diamanten	5*
Kressmann: Die deutsche Nationalschule in Wertheim	6*
585. Sitzung am 24. Oktober 1902.	
Vorsitzender: Nachruf auf Professor von Trautschold	8*
Brode: Die Jonentheorie	8*
586. Sitzung am 7. November 1902.	
U. Müller: Beschädigungen des Waldes durch Rauchgase	9*
587. Sitzung am 21. November 1902.	
Nüsslin: Biologie der Chermesarten', insbesondere über die Tannenrindenlaus (Chermes piceae)	10*
588. Sitzung am 5. Dezember 1902.	
Engler: Über chemische Gerätschaften aus Bergkrystall	10*
Heinsheimer: Das Problem der Geschlechtsbestimmung	10*

IV

589. Sitzung am 19. Dezember 1902.	Seite
<i>Bunte</i> : Neues vom Gaslicht	11
590. Sitzung am 16. Januar 1903.	
<i>Haber</i> : Bericht über seine Studienreise in den Vereinigten Staaten von Nordamerika	13
591. Sitzung am 30. Januar 1903.	
<i>Wilser</i> : Die Rasse des schwedischen Volkes	13
592. Sitzung am 13. Februar 1903.	
<i>Nokk</i> : Nachruf auf Staatsminister Dr. Nokk	14
<i>Klein</i> : Zeichen und Inschriften in lebenden Bäumen; seltene Formen der Fichte und Tanne im Schwarzwald	14
593. Sitzung am 6. März 1903.	
<i>Auerbach</i> : Der Winterschlaf unserer heimischen Säugetiere	16
594. Sitzung am 27. März 1903.	
<i>Vorsitzender</i> : Begrüssung Ihrer Königlichen Hoheiten des Grossherzogs und der Grossherzogin	17
<i>Schwarzmann</i> : Vorläufiger Bericht über das Erdbeben vom 22. März 1903 in der Umgegend von Karlsruhe	17
595. Sitzung am 24. April 1903.	
<i>Muth</i> : Der Kreislauf des Stickstoffs	20
596. Sitzung vom 15. Mai 1903.	
Mitglieder-Hauptversammlung	20
<i>Meidinger</i> : Jahresbericht	20
Kassenbericht; Neuwahl des Vorstandes	20
<i>Wöhler</i> : Selbststrahlende Materie	21

Abhandlungen.

<i>Nüsslin</i> , Dr. O.: Zur Biologie der Gattung <i>Chermes</i> Htg., insbesondere über die Tannentrindenlaus <i>Chermes piceae</i> Ratz	1
<i>Reichmann</i> M.: Die Erdbeben in Baden im Jahr 1901	21
<i>Wilser</i> , Dr. L.: Die Rasse des schwedischen Volkes	36
<i>Muth</i> , Dr. Fr.: Die Tätigkeit der Bakterien im Boden	69
<i>May</i> , Dr. W.: Jean Lamarck	125

Jahresbericht.

Im Berichtsjahre 1902/03 haben 16 Sitzungen stattgefunden; sie sind, wenn man von zweien absieht, bei welcher so zahlreiche Gäste anwesend waren, dass eine Zählung nicht möglich war, von 561 Mitgliedern, im Mittel also 40, besucht worden. Dabei sind 18 Vorträge gehalten worden, von denen sieben auf allgemeine und angewandte Chemie, je zwei auf Botanik, Zoologie und Anthropologie, je einer auf Bakteriologie, Geschichte, Forstwissenschaft, Geologie und Schulwesen entfallen. Das Versammlungsort war das gleiche, wie seit langen Jahren, in der kälteren Jahreszeit der „kleine Saal“, in der wärmeren der Wirtschaftssaal des Gartengebäudes der Gesellschaft Museum. Vier Vorträge sind in Hörsälen der Technischen Hochschule gehalten worden.

Rechnungsführung.

A. Kassenstand im Berichtsjahre 1902—1903.

Einnahmen.

1. Kassenrest vom Vorjahre . . .	M.	2 577,22	
2. Beiträge von 202 Mitgliedern zu			
je 5 M.	„	1 010,00	
3. Rückständige Beiträge vom Vor-			
jahre	„	10,00	
4. Zinsen aus Wertpapieren . . .	„	1 136,35	
5. Konto-Korrentzinsen	„	21,30	
6. Verkauf von Drucksachen . . .	„	15,00	
			M. 4 769,87

Übertrag: Einnahme. M. 4 769,87

Ausgaben.

1. Bureaukosten, Dienerschaft, Porto .	M.	394,76	
2. Steuern	"	26,74	
3. Lokalmiete	"	114,00	
4. Drucksachen	"	1 080,44	
5. Gekaufte Wertpapiere	"	1 510,90	
			<u>" 3 126,84</u>
Kassenrest am 15. Mai 1903	M.	1 643,03	

B. Vermögensstand.

Wertpapiere	M.	33 742,86	
Kassenrest	"	1 643,03	
			<u>M. 35 382,99</u>
Vermögensstand im Vorjahre	"	34 820,08	
somit Vermehrung	M.	565,81	

Büchersammlung.

Der Verein steht zurzeit mit 170 Akademien, Behörden und wissenschaftlichen Vereinen im Austausch; nicht mitgezählt sind dabei diejenigen, welche seit einigen Jahren keine Veröffentlichung mehr eingesendet haben. Im Berichtsjahr hat der Verein acht neue Tauschverbindungen eingegangen, nämlich mit:

Lloyd Library in Cincinnati.
 State University in Columbus (Ohio).
 Kais. Gouvernement in Dar-es-Salâm.
 Ornithologisch-öologischer Verein in Hamburg.
 University in Laurence (Kansas).
 Instituto Geológico in Mexico.
 University of Montana in Missoula.
 Faculté des sciences de l'Université Rennes.

Dem Verein sind während des Berichtsjahres die nachstehenden Druckschriften zugegangen:

A. Von Behörden, Instituten und Vereinen.

- Basel. Naturforschende Gesellschaft. Verhandlungen. 15. Band, 1. Heft; 16 Band. Basel 1902.
- Bergen. Museum. An account of crustacea of Norway. Vol. 4; Parts 7—14. — Aarbog 1902. 1. u. 2. Heft.
- Berlin. Botanischer Verein f. d. Provinz Brandenburg. Verhandlungen 43. Jahrgang 1901. Berlin 1903; 44. Jahrgang 1902. Berlin 1903.
- Deutsche geologische Gesellschaft. Kohen. Die deutsche geologische Gesellschaft in den Jahren 1848—1898 mit einem Lebensabriss von Ernst Beyrich. Berlin 1901. — Zeitschrift. 53. Band, 4. Heft; 54. Band 1. u. 2. Heft.
- Bern. Naturforschende Gesellschaft. Mitteilungen aus den Jahren 1901. Nr. 1500—1518. Bern 1902.
- Bonn. Naturhistorischer Verein. Verhandlungen. 58. Jahrgang, 1. u. 2. Hälfte. 59. Jahrgang 1902, 1. Hälfte.
- Niederrheinische Gesellschaft für Natur- und Heilkunde. Sitzungsberichte 1901, 1. u. 2. Heft. 1902, 1. Hälfte.
- Boston. American Academy of Arts and Sciences. Proceedings. Vol. 37, Nr. 15—23.
- Bremen. Naturwissenschaftlicher Verein. Verhandlungen. 17. Band, 1. Heft. Bremen 1903.
- Breslau. Schlesische Gesellschaft für vaterländische Kultur. 29. Band 1901. Breslau 1902.
- Brünn. Naturforschender Verein. Verhandlungen. 40. Band 1901. Brünn 1902. — 20. Bericht der meteorologischen Kommission im Jahre 1900. Brünn 1902.
- Bruxelles. Academie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts. Bulletin de la classe sciences 1901; 1902 Nr. 1 bis 4, 6—11, 12; 1903 Nr. 1—4. — Annuaire. 1902, 68^e année Bruxelles 1902; 1903, 69^e année. Br. 1903.
- Société Entomologique de Belgique. Annales Tome 46; Mémoires IX. Bruxelles 1902.
- Chapel Hill. Elisha Mitchell Society. Journal. Vol. 8, Parts 1 u. 2.
- Cherbourg. Société nationale des sciences naturelles et mathématiques. Mémoires. Tome 32. Paris 1900—1902.
- Chur. Naturforschende Gesellschaft. Jahresbericht. 45. Band 1901/02. Chur 1902.

- Córdoba. Academia nacional de ciencias. Boletín. Tomo VII, entrega 1ª. Buenos Aires 1902.
- Dar-es-Salâm. Kais. Gouvernement. Berichte über Forst- und Landwirtschaft in Deutsch-Ostafrika. 1. Band, 1.—5. Heft. Heidelberg 1902 u. 1903.
- Davenport. Academy of natural sciences. Proceedings. Vol. 8, 1899—1900.
- Danzig. Naturforschende Gesellschaft. Schriften. 10. Band. 4. Heft. Danzig 1902.
- Dresden. Naturwissenschaftliche Gesellschaft Isis. Sitzungsberichte und Abhandlungen. Jahrg. 1901, Juli—Dezember. Jahrg. 1902, Jan.—Dez.
— Genossenschaft Flora. Sitzungsberichte und Abhandlungen. 1900—1901. Dresden 1902.
- Dürkheim. Pollichia. Mitteilungen. Nr. 15—17. Dürkheim 1902.
- Elberfeld. Naturwissenschaftlicher Verein. Jahresbericht. 10. Heft. Elberfeld 1903.
- Emden. Naturforschende Gesellschaft. 46. Jahresbericht für das Jahr 1900/01. Emden 1902.
- Erlangen. Physiologisch-medizinische Societät. Sitzungsberichte. 33. Heft, 1901. Erlangen 1902.
- Frankfurt a. M. Physikalischer Verein. Jahresbericht für das Rechnungsjahr 1900—1901. Frankfurt a. M. 1902.
— Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft. Bericht 1902.
- Frankfurt a. O. Naturw. Verein. Helios. 19. Band. Berlin 1902.
- Giessen. Oberhessische Gesellschaft für Natur- und Heilkunde. 33. Bericht. Giessen 1899—1902.
- Graz. Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark. Mitteilungen. Jahrg. 1901. Graz 1902.
- Halifax. Nova Scotian Institute of Natural Science. Proceedings and Transactions. Vol. 10. Part. 3.
- Halle. Verein für Erdkunde. Mitteilungen 1902. Halle 1902.
— Kais. Leop.-Karol. Deutsche Akademie der Naturforscher. Leopoldina. Heft 38. Nr. 4, 6, 7. Heft 39. Nr. 1.
- Hamburg. Ornithologisch-oologischer Verein. 1. Bericht, 1897—1901.
— Naturwissenschaftlicher Verein. Abhandlungen aus dem Gebiete der Naturwissenschaften. 17. Band. Hamburg 1902.
- Hamilton. Association. Journal and Proceedings. 1901—02. Nr. 8.

- Heidelberg. Naturhistorisch-medicinischer Verein. Verhandlungen. 7. Band. 1. u. 2. Heft. Heidelberg 1902.
- Heidelberg-Königstuhl. Gr. Astrophysikalisches Observatorium. Publicationen. 1. Band. Karlsruhe 1902.
- Lausanne. Société Vaudoise des Sciences Naturelles. Bulletin des séances. Vol. 37. Nr. 142, 143; Vol. 38. Nr. 144, 145. — Observations faites à la station météorologique du Champ-de-l'air. 15^e année. 1901. Lausanne 1902.
- Leipa. Nordböhmischer Excursionsclub. Mitteilungen. 24. Jahrg., 2.—4. Heft; 25. Jahrg. 1.—4. Heft; 26. Jahrg. 1. Heft.
- Leipzig. Naturforschende Gesellschaft. Sitzungsberichte. 1. Jahrgang 1874; 17. u. 18. Jahrg. 1891/92; 19.—21. Jahrg. 1892/94; 22. u. 23. Jahrg. 1895/96; 24. u. 25. Jahrg. 1897/98.
- Magdeburg. Naturwissenschaftlicher Verein. Jahresbericht und Abhandlungen. 1900—1902. Magdeburg 1902.
- Marburg. Gesellschaft zur Förderung der gesamten Naturwissenschaften. Sitzungsberichte. Jahrgang 1901. Marburg 1902.
- Marseille. Faculté des sciences. Annales. Tome XII. Paris 1902.
- Mexico. Instituto Geologico. Boletin. Nr. 14. 16.
 — Observatorio Magnetico-Astronómico. Informe sobre los trabajos del establecimiento desde Julio de 1899 hasta Diciembre de 1901. Mexico 1902.
 — Observatorio Astronómico de Tacubaya. Anuario 1903. Mexico 1902.
- Milwaukee. Public Museum. 19. and 20. Annual Reports September 1st. 1900, to Aug. 31st. 1902.
 — Wisconsin Natural History Society. Bulletin. Vol. 2, Nr. 2—4.
- Missoula. University of Montana. Bull. Nr. 3: Silloway. Summerbirds of Flathead Lake. 1901.
- Montevideo. Museo Nacional. Anales. Torno IV, primera parte. Montevideo 1902.
- München. K. Akademie der Wissenschaften. Mathem. u. phys. Klasse. Sitzungsberichte. 1902. Heft 1—3.
 — Ornithologischer Verein. 2. Jahresbericht für 1899 u. 1900. München 1901.
- Nancy. Société des sciences. Bulletin. Tome I, Fasc. 6; Tome II, Fasc. 1—3; Tome III, Fasc. 1.

- New-York. American Museum of Natural History. Bulletin
Vol. XI, Part IV; Vol. XV, Part I; Vol. XVII, Part I
(The Huntington California Expedition Basketry designs of
the Indians of Northern California); Vol. XVII, Part II
(The Huntington Calif. Exped. II Maidu Myths.); Vol. XVIII
Part 1. (The Mrs. Morris K. Jesup Expedition. The
Arapaho.)
- Nürnberg. Naturhistorische Gesellschaft. Jahresbericht für
1900. Nürnberg 1901. Abhandlungen 14. Band, mit Jahresb
1901. Nürnberg 1902.
- Ottawa. Geological Survey of Canada. Geological Map o
Canada. Western sheet. Nr. 783.
- Philadelphia. Academy of Natural Sciences. Proceedings
Vol. 53, Part III; Vol. 54, Part I, II.
- Pisa. Società Toscana di Scienze Naturali. Atti. Memorie Vol. 18
Pisa 1902. — Atti. Vol. XIII. Adunanza del 4. maggio
6. luglio, 21. dicembre 1902, 18. gennaio, 8. marzo 1903
- Prag. Deutscher naturwissenschaftlich-medizinischer Verein Lotos
Sitzungsberichte. Jahrg. 1901. 21. Band. Prag 1901.
— K. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften. Mathem.-naturw
Klasse. Sitzungsberichte 1902. Prag 1903. — Jahresbericht
f. d. Jahr 1902. Prag 1903. — Doppler. Über das farbige
Licht der Doppelsterne und einiger anderer Gestirne des
Himmels. Zur Feier seines 100. Geburtstages neu heraus-
gegeben von Studnička. Prag 1903.
- Rio de Janeiro. Museu Nacional. Archivos. Vol. 10. Rio de
Janeiro 1899; Vol. 11. R. d. J. 1901.
- Roma. R. Accademia dei Lincei. Classe di scienze fisiche, mate-
matiche e naturali. Atti. Vol. II, Fasc. 8—12 1. semestre;
Vol. II, Fasc. 1—12. 2. sem.; Vol. 12, Fasc. 1—5, 7 u. 8.
1. sem. — Rendiconto dell' adunanza solenne del 1 giugno
1902.
— R. Comitato Geologico d'Italia. Bollettino. Anno 1901.
Nr. 4; Anno 1902. Nr. 1—3.
- St. Gallen. Naturwissenschaftliche Gesellschaft. Bericht über
die Tätigkeit während der Jahre 1888/89, 1889/90, 1890/91.
1891/92, 1892/93, 1893/94, 1897/98, 1899/1900, 1900/01.
- Sion. Société Murithienne. Bulletin, Fasc. 31. Année 1902.
Sion 1902.

- Stockholm. Entomologiska Föreningen. Entomologiska Tidsskrift 1902. 1—4. Stockholm 1902.
- Stuttgart. Verein für vaterländische Naturkunde. Jahreshefte. 50. Jahrgang. Stuttgart 1894; 58. Jahrg. St. 1902; — Beilage zum 58. Jahrg.: Verzeichnis der mineralogischen, geologischen, urgeschichtlichen und hydrologischen Literatur von Württemberg, Hohenzollern und den angrenzenden Gebieten. I. Die Literatur von 1901 nebst Nachträgen und Zusätzen zu Ecks Literaturverzeichnis. Stuttgart 1902.
- Württ. Kommission für Landesgeschichte. Württ. Vierteljahrshefte für Landesgeschichte. 11. Jahrg. 1902. Heft 1—4. Stuttgart 1902.
- Sydney. Australian Museum. Records. Vol. 4, Nr. 6—7. Sydney 1902. — Report of Trustees for the year 1901.
- R. Society of New South Wales. Journal and Proceedings for 1901. Vol. 35. Sydney 1901.
- Tiflis. Physikal. Observatorium. Meteorol. Beobachtungen im Jahre 1898. Tiflis 1901.
- Tokio. Zoological Society. Annotationes zoologicae japonenses. Vol. IV, Part III u. IV. Tokio 1902.
- Upsala. Geological Institution of University. Bulletin. Vol. V, Part. 2, 1901. Nr. 10.
- Washington. American Academy of Sciences. Memoirs. Vol. VIII.
- Smithsonian Institution. Annual Report for the year ending June 30. 1901. Washington 1902.
- U.S. Department of Agriculture, Division of Biological Survey. Yearbook 1901. Wash. 1902. — North American Fauna. Nr. 22.
- Wien. Akademie der Wissenschaften. Anzeiger. 1902, Nr. 10 bis 27; 1903, Nr. 1—9.
- K. K. Geologische Reichsanstalt. Verhandlungen: 1902 Nr. 5 bis 18; 1903 Nr. 1—4. — Jahrbuch: Jahrgang 1901, 51. Band, 3. u. 4. Heft. Wien 1902; Jahrgang 1902. 52. Band. 1. Heft. Wien 1902.
- K. K. Naturhistorisches Hofmuseum. Annalen Band 16, Nr. 3—4. Wien 1901; Band 17. Nr. 1—4. Wien 1902.
- Wiesbaden. Nassauischer Verein für Naturkunde. Jahrbücher. Jahrgang 55. Wiesbaden 1902.

Zürich. Naturforschende Gesellschaft. Vierteljahrsschrift. 47.
Jahrgang 1902. 1. u. 2. Heft. Zürich 1902.
Zwickau. Verein für Naturkunde. Jahresbericht 1900 u. 1901.
Zwickau 1902.

B. Vom Verfasser,

- Janet, M. Charles. Notes sur les travaux scientifiques présentés à l'Académie des Sciences au concours de 1896 pour le prix Thore. Lille.
- Etude sur les fourmis, les guêpes et les abeilles. (15^e note). Paris 1897.
 - L'esthétique dans les sciences de la nature. Paris 1890.
 - Les habitations à bon marché dans les villes de moyenne importance. Bruxelles 1897.
 - Sur l'emploi de Désinences, caractéristiques dans les dénominations de groupes établis pour les classifications zoologiques. Beauvais 1898.
 - Recherches sur l'anatomie de la fourmi et essai sur la constitution morphologique de la tête de l'insecte. Paris 1900.
 - Notes sur les fourmis et les guêpes.

Vorstand.

Der Vorstand hat im Berichtsjahre aus den Herren

1. Geheimerat Prof. Dr. Engler, als Vorsitzenden,
2. Geh. Hofrat Prof. Dr. Lehmann, als Stellvertreter des Vorsitzenden,
3. Prof. Dr. Futterer, als Schriftführer,
4. O. Bartning, als Kassier,
5. Geheimerat Dr. Battlehner,
6. Geheimerat Oberbaudirektor Honsell,
7. Direktor P. Treutlein

bestanden.

Die Geschäfte des Schriftführers hat Herr Geh. Hofrat Meidinger anstelle des wegen Krankheit beurlaubten Herrn Prof. Futterer, jene des Redakteurs der Vereinsverhandlungen und des Bibliothekars hat Prof. Dr. Schultheiss besorgt.

In der Mitgliederhauptversammlung vom 15. Mai 1903 ist der gesamte Vorstand wieder gewählt worden.

Bewegung unter den Mitgliedern.

Neu eingetreten sind die Herren: Augenarzt Dr. Alberti, Apotheker Albicker, Assistent Dr. Arnold, Assistent Auerbach, Oberkriegsgerichtsrat G. Becker, Assistent Buri, Handelslehrer Fink, prakt. Arzt Dr. Genter, Prof. Dr. Haussner, Assistent Dr. Jahn, Chemiker Dr. Just, Reallehrer Knauer, Wirk. Geh. Kriegsrat Kund, Ökonomierat Magenu, Zinkograph Mayer, Dr. K. Paravicini, Oberschulrat Rebmann, Verbandssekretär Riehm, Geh. Hofrat Dr. Schenck, Forstpraktikant Stoll, Generalmajor z. D. v. Wallenberg.

Der Verein hat den Tod dreier Mitglieder zu beklagen. Am 23. Oktober 1902 starb das Ehrenmitglied Herr Staatsrat Prof. Dr. von Trautschold, der in früheren Jahren, als ihn noch nicht ein tückisches Leiden ans Zimmer fesselte, ein regelmässiger Besucher der Sitzungen war; am 16. Juni 1902 starb Herr Hofrat Prof. Dr. Schröder, der dem Verein seit dem Jahre 1876 angehörte und der mit seinem vielseitigen reichen Wissen häufig Anlass zur Anregung und zu Meinungs austausch gegeben hat. Am 15. Juni 1902 verstarb der Assistent an der Technischen Hochschule Herr Weilandt.

Ausgetreten sind, meist infolge von Wegzug, die Herren: Professor Cramer, Assistent Dr. Eichhorn, Chemiker Dr. Glaser, Lehramtspraktikant Horn, Chemiker Jakubowski, Oberamtmann Kamm, Kaufmann Martin, Lehramtspraktikant Reichmann, Lehrer Schröder, Prof. Seith, Apotheker Witkowski.

Der Verein hat am Schlusse des Vereinsjahres 211 Mitglieder gezählt und hat damit eine Stärke erreicht, die er seit seiner Gründung noch niemals besessen hat.

Mitglieder-Verzeichnis.*a. Ehrenmitglieder.*

Die Herren:

Meidinger, Professor Dr., Geh. Hofrat in Karlsruhe (1901).

Moritz, Dr. A., Staatsrat in Dorpat (1864).

Struve, O. von, Russ. Wirkl. Geheimerat in Karlsruhe, Excellenz (1899).

b. Korrespondierendes Mitglied.

Herr R. Temple, Schriftsteller in Buda-Pest.

*c. Mitglieder.**

Alberti, Dr., Augenarzt (1902).

Albicker, Karl, Apotheker (1902).

Allers, H., Zahntechniker (1899).

Ammon, Otto, Schriftsteller (1883).

Arnold, Dr. Em., Assistent für Chemie an der Technischen Hochschule (1903).

Arnold, Eng., Hofrat, Professor der Elektrotechnik an der Technischen Hochschule (1895).

Auerbach, Dr., Assistent für Zoologie am Grossh. Naturalienkabinet (1903).

Babo, Freiherr von, Baurat (1902).

Bartning, O., Rentner (1882).

Battlehner, Dr. F., Geheimerat (1866).

Battlehner, Dr. Th., Oberarzt am städt. Krankenhaus (1898).

Bauer, Dr. Ludwig, Professor am Realgymnasium (1902).

Becker, Gustav, Oberkriegsgerichtsrat (1902).

Beeg, H., Fabrikdirektor in Durlach (1902).

Behm, O., Mechaniker (1889).

Behrens, Prof. Dr. J., Vorstand der landw. Versuchsanstalt in Augustenberg bei Grötzingen (1902).

Benckiser, Dr. A., Hofrat, prakt. Arzt (1890).

Benckiser, Dr. W., Oberamtsrichter (1899).

Benoit, G., Professor des Maschinenbaues an der Technischen Hochschule (1902).

Berberich, Dr. A., prakt. Arzt (1897).

Blankenhorn, Prof. Dr. A. (1869).

* Die beigefügten Zahlen bedeuten das Jahr der Aufnahme.

- Böhm, Dr. F., Ministerialrat (1899).
 Bongartz, Dr. A., prakt. Arzt (1896).
 Brauer, E., Hofrat, Professor der theoretischen Maschinenlehre
 an der Technischen Hochschule (1893).
 Brian, Dr. E., Medizinalrat (1895).
 Brode, Dr. J., Assistent an der Technischen Hochschule (1901).
 Buch, H., Ministerialrat (1899).
 Bürgin, J., Obergemeter an der Technischen Hochschule (1894).
 Buri, Theod., Assistent am mineralog. Institut der Technischen
 Hochschule (1903).
 Buhl, Dr. H., Fabrikant in Ettlingen (1899).
 Bunte, Dr. H., Geh. Hofrat, Professor der chemischen Techno-
 logie an der Technischen Hochschule (1888).
 Carl, Dr., Schlachthaustierarzt (1901).
 Cathiau, Dr. Th., Rektor der Gewerbeschule (1876).
 Clauss, Dr. H. W., prakt. Arzt (1898).
 Delisle, R., Oberingenieur a. D. (1886).
 Dieckhoff, Dr. E., a. o. Professor der Chemie an der Tech-
 nischen Hochschule (1880).
 Dittrich, Dr. Th., Privatier (1897).
 Doederlein, G., Dr. Ing., Oberingenieur (1899).
 Döll, G., Medizinal-Assessor (1875).
 Dörr, J., Professor an der Realschule (1895).
 Doll, Dr. K., prakt. Arzt (1890).
 Dolletschek, Ed., Kaufmann (1877).
 Drach, A., Oberbaurat und Professor an der Technischen
 Hochschule (1881).
 Durler, J., Professor am Gymnasium (1899).
 Edelsheim, W., Freiherr von, Obersthofmeister, Exzellenz
 (1867).
 Eitel, Dr. K. H., Apotheker (1897).
 Eitner, Dr. P., Laboratoriumsvorstand an der chemisch-techni-
 schen Prüfungs- und Versuchsanstalt (1901).
 Engler, Dr. K., Geheimerat, Professor der Chemie an der
 Technischen Hochschule (1876).
 Eppenich, E., Civilingenieur (1902).
 Fink, Handelslehrer (1903).
 Fischbach, Dr. E., prakt. Arzt (1895).
 Fischer, Otto, Hoflieferant (1900).

- Föhlisch, Dr. E., Fabrikinspektor (1900).
 Frankenstein, Dr. W., Assistent an der Technischen Hochschule (1901).
 Futterer, Dr. K., Professor der Mineralogie und Geologie an der Technischen Hochschule (1895).
 Gelpke, Dr. Th., Augenarzt (1892).
 Genter, Dr., prakt. Arzt (1902).
 Gernet, K., General-Oberarzt a. D. (1875).
 Glockner, B., Geheimerat, Direktor der Steuerrichtung (1878).
 Goedecker, E., Ingenieur (1899).
 Goffin, L., Direktor der Maschinenbaugesellschaft (1879).
 Gräbener, L., Hofgartendirektor (1880).
 Gräfenhan, Dr. P., Professor am Kadettenkorps (1897).
 Grashof, R., Professor am Gymnasium (1895).
 Gutmann, Dr. K., prakt. Arzt (1894).
 Gutsch, Dr. L., Medizinalrat, Spezialarzt für Chirurgie (1895).
 Haass, R., Prof., Laboratoriumsvorstand an der chemisch-technischen Versuchsanstalt (1875).
 Haber, Dr. F., a. o. Professor der Chemie an der Technischen Hochschule (1896).
 Hafner, Fr., Regierungsrat (1886).
 Haid, Dr. M., Geh. Hofrat, Professor der Geodäsie an der Technischen Hochschule (1882).
 Hart, J., Geheimerat, Professor des Maschinenbaues an der Technischen Hochschule (1870).
 Hassenkamp, K., Rentner (1875).
 Hauser, Dr. W., Obermedizinalrat (1898).
 Haussner, Dr. Rob., Professor der Mathematik und Oberbibliothekar an der Technischen Hochschule (1902).
 Hausrath, Dr. H., a. o. Professor der Forstwissenschaft an der Technischen Hochschule (1897).
 Heinsheimer, Dr. F., prakt. Arzt (1902).
 Heintze, Dr., Ministerialrat (1900).
 Helbing, Dr. P., prakt. Arzt (1896).
 Hemberger, J., Hofbaudirektor a. D. (1880).
 Henning, Th., Kommerzienrat (1896).
 Hess, Geh. Oberpostrat und Oberpostdirektor a. D. (1901).
 Hildebrandt, M., Geh. Oberfinanzrat (1881).
 Hilger, Dr. K., (1892).

- Hoffmann, Dr. H., prakt. Arzt (1881).
 Hoffmann, K., Major a. D. (1897).
 Holzmann, A., Professor an der Oberrealschule (1893).
 Homburger, Dr. Th., prakt. Arzt (1898).
 Honsell, M., Geheimerat, Direktor des Wasser- und Strassenbaues,
 Professor des Wasserbaues an der Techn. Hochschule (1894).
 Hübler, A., Professor am Realgymnasium (1895).
 Jacob, H., Oberamtmann in Triberg (1901).
 Jahn, Dr., Assistent für Bodenkunde an der Technischen Hochschule (1903).
 Jahraus, W., Buchhändler (1899).
 Jourdan, Dr. J., prakt. Arzt (1894).
 Jschler, O., Professor an der Realschule (1900).
 Just, Dr., Chemiker (1903).
 Kaiser, Dr. F., Medizinalrat (1889).
 Karle, M., Professor am Gymnasium (1897).
 Kast, Dr. H., a. o. Professor der Chemie an der Technischen Hochschule (1883).
 Kaufmann, Dr. A., Chemiker (1902).
 Keller, K., Geh. Hofrat, Professor des Maschinenbaues an der Technischen Hochschule (1869).
 Klein, Dr. L., Professor der Botanik an der Technischen Hochschule (1895).
 Klein, L., Assistent an der chemisch-technischen Prüfungs- und Versuchsanstalt (1897).
 Knauer, Leonh., Reallehrer (1902).
 Kneucker, A., Hauptlehrer (1902).
 Knittel, Dr. A., Buchdruckereibesitzer (1902).
 Knittel, Dr. R., Buchhändler (1895).
 Kohlhepp, Fr., Bezirkstierarzt (1886).
 Kölmel, Prof. Dr., in Baden.
 Kors, A. van der, Bankdirektor (1890).
 Kressmann, A. Th., Major a. D. (1875).
 Kronstein, Dr. A., Assistent am chemischen Laboratorium der Technischen Hochschule (1896).
 Krumm, Dr. F., Spezialarzt für Chirurgie (1897).
 Kund, Th., Wirkl. Geh. Kriegsrat (1903).
 Künkel, K., Reallehrer in Ettlingen (1902).
 Küster, E., Generalleutnant z. D., Exzellenz (1895).

XVIII

- Kux, Dr. H., Chemiker (1899).
Lang, Dr. A., Professor am Realgymnasium (1897).
Le Blanc, Dr. M., Professor der physikalischen Chemie und Elektrochemie an der Technischen Hochschule (1901).
Lehmann, Dr. O., Geh. Hofrat, Professor der Physik an der Technischen Hochschule (1890).
Lembke, Dr. E., prakt. Arzt (1894).
Leutz, F., Hofrat, Seminardirektor (1872).
Leutz, H., Professor am Realgymnasium (1895).
Levinger, Dr. F., prakt. Arzt (1895).
Lorenz, W., Kommerzienrat (1879).
Lüders, P., Ingenieur in Berlin (1895).
Magenau, Ökonomierat in Augustenberg bei Grötzingen (1903).
Maier, E., Geh. Hofrat, Augenarzt (1871).
Marschalck, K. von, Major a. D. (1896).
Massinger, R., Professor an der Oberrealschule (1894).
May, Dr. W., Privatdozent für Zoologie und Assistent an der Technischen Hochschule (1899).
Mayer, Rud., Zinkograph (1893).
Meess, Ad., Stadtrat (1899).
Meidinger, Dr. H., Geh. Hofrat, Vorstand der Grossh. Landes-gewerbehalle und Professor der technischen Physik an der Technischen Hochschule (1865). (Ehrenmitglied 1901.)
Migula, Dr. W., a. o. Professor der Botanik und naturwissenschaftlichen Hygiene an der Technischen Hochschule (1891).
Millas, K. de, Ingenieur (1893).
Molitor, Dr. E., prakt. Arzt (1894).
Müller, Dr. Eberh., Chemiker (1900).
Müller, Dr. L., Medizinalrat (1896).
Müller, Dr. U., a. o. Professor der Forstwissenschaft an der Technischen Hochschule (1893).
Muth, Dr., Privatdozent der Botanik an der Technischen Hochschule; Augustenberg bei Grötzingen (1902).
Näher, R., Baurat (1893).
Neumann, Dr. M., prakt. Arzt (1901).
Netz, F., prakt. Arzt (1893).
Nüsslein, Dr. J., Assistenzarzt (1900).

- Nüsslin, Dr. O., Hofrat, Professor der Zoologie an der Technischen Hochschule (1878).
- Oechelhäuser, Dr. A. von, Hofrat, Professor der Kunstgeschichte an der Technischen Hochschule (1898).
- Paull, Dr. H., prakt. Arzt (1898).
- Paravicini, Dr. R., Hilfsarbeiter im Ministerium des Innern (1903).
- Pfeil, Dr., Assistent am chemisch-technischen Institut der Technischen Hochschule (1901).
- Platz, H., Fabrikdirektor (1902).
- Reck, K. von, Freiherr, Geheimerat und Kammerherr (1869).
- Rebmann, E., Oberschulrat (1902).
- Rehbock, Th., Professor des Wasserbaues an der Technischen Hochschule (1900).
- Reichard, Fr., Stadtbaurat, Direktor der städtischen Gas- und Wasserwerke (1892).
- Resch, Dr. A., prakt. Arzt (1888).
- Riehm, Verbandssekretär (1903).
- Riffel, Dr. A., prakt. Arzt, a. o. Professor für Hygiene an der Technischen Hochschule (1876).
- Risse, Dr. H., prakt. Arzt (1899).
- Röder von Diersburg, Oberst z. D. und Kammerherr (1901).
- Rosenberg, Dr. M., prakt. Arzt (1898).
- Roth, Dr. K., prakt. Arzt (1897).
- Rupp, G., Professor, Laboratoriumsvorstand an der Grossh. Lebensmittelprüfungsstation (1899).
- Sachs, W., Geh. Oberfinanzrat (1885).
- Schaaff, E., Privatier (1899).
- Schellenberg, R., Finanzrat (1899).
- Schenck, Jul., Geh. Hofrat (1902).
- Scheurer, K., Hofmechaniker und Optiker (1877).
- Schleiermacher, Dr. A., Professor der theoretischen Physik an der Technischen Hochschule (1881).
- Schmidt, Fr., Professor der wissenschaftlichen Photographie an der Technischen Hochschule (1892).
- Scholl, Dr. Rol., a. o. Professor der Chemie an der Technischen Hochschule (1896).
- Schultheiss, Professor Dr., Grossh. Meteorologe (1886).

- Schur, Dr. F., Professor der Geometrie an der Technischen Hochschule (1901).
- Schwarzmann, Dr. M., Privatdozent für Mineralogie an der Technischen Hochschule und Assistent am Naturalienkabinet (1901).
- Schweickert, M., Oberlehrer a. D. (1873).
- Seneca, F., Fabrikant (1863).
- Siefert, X., Oberforstrat, Professor der Forstwissenschaft an der Technischen Hochschule (1895).
- Sieveking, Dr. H., Assistent an der Technischen Hochschule (1902).
- Sievert, E., Major a. D. (1884).
- Sprenger, A. E., Geh. Oberregierungsrat (1878).
- Spuler, Dr. A., a. o. Professor der Anatomie in Erlangen (1897).
- Stark, F., Professor an der Oberrealschule (1895).
- Stein, H., Apotheker in Durlach (1896).
- Steiner, Dr. A., prakt. Arzt (1896).
- Sternberg, Dr. H., prakt. Arzt (1897).
- Steude, Dr. M., Sekretär (1896).
- Stoll, Herm., Forstpraktikant, Assistent an der Technischen Hochschule (1902).
- Struve, O. von, Russ. Wirkl. Geheimerat, Exzellenz (1895). (Ehrenmitglied 1899.)
- Suck, O., Hofphotograph (1897).
- Teichmüller, Dr. J., a. o. Professor der Elektrotechnik an der Technischen Hochschule (1899).
- Tein, Dr. M. von, k. bayer. Bauamtman (1888).
- Treutlein, P., Direktor des Realgymnasiums (1875).
- Tross, Dr. O., prakt. Arzt (1893).
- Volz, H., Professor an der Akademie der bildenden Künste (1892).
- Wacker, M., Professor am Realgymnasium (1897).
- Wagner, Dr. E., Geheimerat, Konservator der Altertümer (1864).
- Wagner, G., Privatier in Achern (1876).
- Wagner, Leop., Prokurist in Ettlingen (1899).
- Wallenberg, A. von, Generalmajor z. D. (1903).
- Wedekind, Dr. L., Hofrat, Professor der Mathematik an der Technischen Hochschule (1876).

- Weiler, Dr. A., Professor a. D. (1883).
Wiegers, Dr. F., k. preuss. Geologe, Berlin.
Williard, A., Baurat a. D. (1895).
Wilser, Dr. L., in Heidelberg (1881).
Wittmer, K., Forstrat (1899).
Wöhler, Dr. Loth., Privatdozent und Assistent am chemischen
Laboratorium der Technischen Hochschule (1898).
Wunderlich, Dr. H., prakt. Arzt (1896).
Zartmann, Dr. F., Privatmann (1899).
Ziegler, Dr. V., prakt. Arzt (1899).
Zimmermann, Fr., Maschineninspektor (1899).

Für die Redaktion verantwortlich:
Prof. Dr. Schultheiss.

Sitzungsberichte.

581. Sitzung am 6. Juni 1902.

Fortsetzung der Mitglieder-Hauptversammlung vom 16. Mai 1902.

Vorsitzender Herr Geheimerat Dr. Engler. Anwesend 27 Mitglieder.

Herr Direktor Treutlein gab für den Kassier, der am Erscheinen verhindert war, den üblichen Kassenbericht mit dem Bemerken, dass er die Rechnungen geprüft und richtig gefunden habe. Der Kassier wurde darnach entlastet.

Herr Professor Rupp hielt hierauf einen Vortrag „Über diätetische Nahrungsmittel“. Einleitend besprach der Vortragende die Zusammensetzung unserer Nahrungsmittel aus den einzelnen Nährstoffen des Tier- und Pflanzenreiches, wie Wasser, Eiweissstoffe, Fett, Kohlehydrate und Mineralstoffe, sowie die Bedeutung derselben für die Ernährung.

Die wichtigste Rolle unter diesen fünf Gruppen spielen zweifellos die Eiweiss- oder Proteinstoffe und nach dem Gehalt eines Nahrungsmittels an Eiweisstoffen wird in der Regel der Nährwert desselben bemessen.

Durch die Umsetzung der Eiweisstoffe im menschlichen Organismus ist die Lebenstätigkeit bedingt und wird Wärme erzeugt, indem dieselben zu Kohlensäure, Sauerstoff und Wasser verbrannt werden. Die Hauptenergiequelle für den Organismus bildet somit das Eiweiss, es steigert die körperliche Leistungsfähigkeit und vermehrt die Muskelkraft. Die Eiweisstoffe sind auch die wichtigsten Bestandteile des tierischen und pflanzlichen Organismus. Das Blut, sowie alle tierischen Gewebe und Organe, Muskel, Herz, Leber, Lunge u. s. w., sind vorwiegend aus diesen Eiweissverbindungen zusammengesetzt.

Ihrer Elementarzusammensetzung nach bestehen die Eiweissstoffe aus Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und Stickstoff, mehrere enthalten ausserdem noch Schwefel, einige Phosphor.

In bezug auf ihre chemischen Eigenschaften teilt man die Eiweissstoffe ein in:

I. Wasserlösliche Albumine:

1. Eigentliche Eier-, Blut-, Milch- und Pflanzenalbumine: Albumin.

2. Caseïne: Milch-, Pflanzencaseïn.

3. Fibrine: Blut-, Muskel- und Pflanzenfibrin.

II. Globuline, die in Wasser unlöslich, in verdünnter Kochsalzlösung aber löslich sind.

III. Proteïde: Schleimstoffe, Verbindungen von Kohlehydraten mit Eiweissstoffen.

Es wurden nun die Eigenschaften der Eiweissstoffe in bezug auf ihre Löslichkeit in Säuren und Alkalien, das Koagulieren des Eiweisses beim Erwärmen u. s. w. besprochen.

Im zweiten Teil des Vortrages wurde die Entnahme des Eiweissbedarfs bei der richtigen Ernährung aus dem Tier- und Pflanzenreich besprochen, der für den gesunden Menschen 118 bis 150 Gramm pro Tag beträgt.

Wir entnehmen die Eiweissstoffe teils aus dem Fleisch unserer Schlachttiere, des Wildes und des Geflügels mit 15 bis 23 Prozent Eiweissstoffen; der Fische, die zu den eiweissreichsten Nahrungsmitteln gehören, und bis zu 82 Prozent Eiweiss enthalten (Stockfische), ferner aus Milch und Käse, letzterer mit 26 bis 34 Prozent Eiweissstoffen. Aus dem Pflanzenreich sind es in erster Linie die Hülsenfrüchte, Bohnen, Erbsen und Linsen, mit 23 bis 27 Prozent und die Mehlarnten mit 8 bis 11 Prozent Eiweissstoffen.

Seit längerer Zeit ist man bestrebt, für die bessere Ernährung des Menschen neue billige Eiweissquellen zu erschliessen, doch ist die Industrie von der Lösung dieses Problems noch weit entfernt. Der springende Punkt ist hier, wie bei allen Nahrungsmitteln, die Verdaulichkeit und die Verwertung und Ausnutzung des Verdauten im Organismus und nicht minder der Kostenpunkt.

Redner erläutert durch eine tabellarische Gegenüberstellung des Nähr- und Geldwerts des in letzter Zeit unter grosser Reklame im Handel befindlichen Tropens und verschiedener Fleischarten, der Fische, der Hülsenfrüchte, Käse u. s. w., dass man in

den alten Nahrungsmitteln das Eiweiss ebenso billig und zum Teil noch billiger erhalten kann als im Tropon und derartigen Nährpräparaten.

Nun will man aber mit den Nährpräparaten die Nahrungsmittel nicht ersetzen, man geht vielmehr darauf aus, Nahrungsmittel herzustellen, die einen möglichst hohen Gehalt an verdaulichem Eiweiss enthalten, um namentlich bei krankhaften Zuständen des Organismus und bei Rekonvaleszenten durch Darreichung geringer Mengen von Nahrung eine bessere Ernährung durch erhöhte Eiweisszufuhr zu ermöglichen. In dieser Richtung ist es der Nahrungsmittelindustrie in letzter Zeit gelungen, eine Reihe von guten Nährpräparaten in konzentrierter Form zu schaffen, was für Kranke, die wenig zu sich nehmen können, von grösster Wichtigkeit ist. So z. B. das Aleuronatbrod (mit 35 Proz. Eiweisstoff) für Diabetiker, welche Kohlenhydrate in ihrem Körper nicht zu zersetzen vermögen, sondern sie als Glukose im Harn abscheiden.

Die Herstellung dieser diätetischen Nahrungsmittel geschieht im allgemeinen in der Weise, dass man Fleisch, Fischen, Eiern, Milch und eiweisshaltigen Pflanzenstoffen (Weizenmehl, Reis u. s. w.) durch Behandlung mit verdünnten Ätzalkalien die Eiweisstoffe entzieht, die erhaltenen Lösungen durch Ausschütteln mit Äther von Fett befreit und aus diesen wässerigen alkalischen Lösungen mittels verdünnter Säuren die Eiweisstoffe abscheidet. Durch Auswaschen, Trocknen und Pulverisieren der Abscheidungen erhält man reines animalisches oder vegetabilisches Eiweiss.

Der Vortragende schilderte nun die Eigenschaften und die Zusammensetzung einer grossen Reihe von Nährpräparaten, wie sie jetzt im Verkehr sind, in eingehender Weise. So die Nährpräparate, die 1. aus Fleisch, Blut und Hühnereiweiss hergestellt werden, als Samatose, Soson, Roborin, Sicco, Hämatogen, Fleischsaft (Beaf tea), Puro, Albumose-Fleischextrakt und Fleischpeptone; 2. aus Milcheiweiss (Casein) bestehende Nahrungsmittel als Plasmon, Eulactol, Nutrose, Sanatogen, Sanose, Nährstoff Heyden; 3. Pflanzeneiweisspräparate: Aleuronat, Roborat, Energin, Mutase, Tropon (Mischung von Fleisch- und Pflanzeneiweiss), sowie die präparierten Mehle, Haferkakao.

Schliesslich wurden noch die sogenannten „Anregungsmittel“, wie die verschiedenen Fleischextrakte, Bowril, Toril, die Maggischen Suppenwürzen, sowie die in neuerer Zeit aus Hefe her-

gestellten fleischextraktähnlichen Präparate, „Ovos und Siris“ besprochen.

Daran anschliessend beantwortete der Vortragende noch die aus der Versammlung gestellten Anfragen bezüglich des neuen Reichsgesetzes, das Verbot der Verwendung von „Konservierungsmitteln“ betreffend, wie Borsäure, schwefligsaure Salze u. s. w. und betonte, dass die Benützung dieser Chemikalien bei der Herstellung von Nahrungs- und Genussmitteln im Interesse der menschlichen Gesundheit mit vollem Recht verboten worden sei insbesondere da Mittel und Wege vorhanden sind, unsere Nahrungsmittel ohne gesundheitsschädliche Chemikalien zu konservieren.

Daran knüpfte sich noch eine kurze Besprechung über die vorzügliche Wirkung des Genusses von Rohr- oder Rübenzucker auf die Leistungsfähigkeit des Organismus bei körperlichen Anstrengungen.

An den Vortrag knüpfte sich eine lebhafte Besprechung, an der sich die Herren Ammon, Bauer, Carl, Engler, Rehbock Schröder und Wöhler beteiligten.

Herr Direktor Treutlein machte zum Schluss auf drei merkwürdige Menschenbildungen aufmerksam, die zurzeit in Karlsruhe zu sehen seien — ein im ganzen Gesicht vollständig behaarter Erwachsener, und ein kaum tischhohes Paar von sonst ganz normaler Bildung.

582. Sitzung vom 20. Juni 1902.

Vorsitzender: Herr Geheimerat Dr. Engler. Anwesend 20 Mitglieder.

Der Vorsitzende widmete dem kurz vorher verstorbenen langjährigen Mitglied Hofrat Schröder einen warm empfundenen Nachruf, wobei er dessen Verdienste um die Wissenschaft und um den Verein, dem seine vielseitigen Kenntnisse viele dankenswerte Anregungen gegeben haben, hervorhob.

Herr Major a. D. Kressmann erbat die Mithilfe der Vereinsmitglieder bei der Ausfindigmachung einer geeigneten Lehrkraft für die beschreibenden Naturwissenschaften, welche für die von ihm mitbegründete deutsche Nationalschule benötigt sei.

Herr Privatdozent Dr. May hielt hierauf einen Vortrag über Jean Lamarck, der unter den Abhandlungen zum Abdruck gebracht ist.

An der sich hieran knüpfenden Besprechung beteiligten sich ausser dem Vortragenden die Herren Beeg, Engler und Kressmann.

583. Sitzung vom 4. Juli 1902.

Vorsitzender: Herr Geheimerat Dr. Engler. Anwesend 35 Mitglieder.
Neu angemeldete Mitglieder die Herren: Apotheker Albicker, prakt. Arzt
Dr. Genter, Reallehrer Knauer.

Herr Hauptlehrer Kneucker berichtete über eine botanische Studienreise, die er im Frühjahr mit Herrn Dr. Genter durch die Sinaihalbinsel ausgeführt hatte. In anziehender Weise schilderte der Vortragende seine Reise zuerst zu Schiff durch das Rote Meer nach Tor, von da in Begleitung von Beduinen in mehrtägigem Marsch auf Kameelen durch die Wüste an das Sinaigebirge und durch dessen felsige Schluchten bis zum Sinaikloster St. Katharine, in dessen Nähe für einige Tage Halt gemacht wurde, um den Djebel Musa, die Katharinenspitze (2602 m hoch) und andere Höhen zu ersteigen. Nach einer im Verhältnis zu der spärlichen Vegetation reichen botanischen Ausbeute ging es alsdann durch Felsenberge und wüstenartige Hochtäler zum Djebel Serbal, welches der eigentliche heilige Berg des alten Testaments sein soll, von da in wiederum mehrtägigem Karawanenmarsch an den alten ägyptischen Türkisengruben, woselbst ein Engländer neuerdings nach diesen Edelsteinen gräbt, vorbei nach Suez. Nach einem Abstecher nach Kairo und seine Umgebung, Gizeh, Sakarha u. s. w., wurde der Heimweg über Marseille angetreten. Der Vortrag war durch wohlgelungene, selbstaufgenommene Photographien ergänzt, insbesondere auch durch zahlreiche Pflanzen der Wüstenflora, über welche Herr Kneucker in einer wissenschaftlichen Arbeit noch eingehender berichten wird. An den mit grossem Beifall aufgenommenen Vortrag schloss sich eine lebhafte Unterhaltung, auch begrüßte der Vorsitzende, Herr Geheimerat Dr. Engler, den auf Besuch hier weilenden und in der Sitzung anwesenden Herrn Dr. Kaiser aus Kairo als den bewährten Freund und Ratgeber aller Deutschen und besonders Badener, welche zu wissenschaftlichen Zwecken Ägypten und die benachbarten Gegenden bereisen.

584. Sitzung am 18. Juli 1902.

Vorsitzender: Herr Geheimerat Dr. Engler. Anwesend: 43 Mitglieder.
Neu angemeldete Mitglieder: Herr Dr. Auerbach, Assistent an der zoologischen Abteilung des Grossh. Naturalienkabinetts, Herr Prof. Dr. Haussner, Professor der Mathematik und Oberbibliothekar an der Technischen Hochschule.

Herr Geheimerat Dr. Engler besprach die Frage der Darstellung künstlicher Diamanten. Da die natürlichen Dia-

manten sich durchweg in angeschwemmtem Erdreich, also nicht mehr im ursprünglichen Gestein vorfinden, wurde man erst durch das Auffinden ganz kleiner Diamanten in einem 1886 im südöstlichen Russland niedergefallenen Meteoriten (ein gleichzeitig gefallener Meteorit wurde leider von einem abergläubischen Bauern verzehrt) auf die Idee gebracht, dass diese Edelsteine aus flüssigem Eisen ausgeschiedener Kohlenstoff sein können. In der Tat hat dann bald darauf Moissau durch Auflösen von Holzkohle in sehr hochehitztem, im elektrischen Ofen geschmolzenen Eisen nach Wiederabkühlung und Lösen des Eisens und der Beimischungen in Säure nachgewiesen, dass sich auf diesem Wege Kohle in ganz kleine, das Eisen durchsetzende Diamanten verwandeln lasse. Neuerdings haben Hoyer mann sowie Guido Goldschmidt etwas grössere und namentlich auch durchsichtig und starkglänzende, immer aber doch nur sehr kleine Diamanten (0,05 mm Durchmesser) dadurch erhalten, dass sie Thermit, eine Mischung von Eisenoxyd mit Aluminium, unter Zusatz von gepulverter Kohle verschmolzen. Eine Versuchsschmelze dieser Art wurde ausgeführt. Ist man sonach auch noch weit entfernt von der Lösung der Frage der Darstellung brauchbarer grösserer Diamanten, so ist dieselbe durch die geschilderten Versuche doch wissenschaftlich gelöst und erscheint es nicht ausgeschlossen, dass auch noch die Darstellung grösserer Exemplare des vielbegehrten Edelsteins gelingen wird.

Sodann berichtete Herr Major Kressmann über die Errichtung der deutschen Nationalschule in Wertheim a. M. Der Redner konnte zu Beginn seines Vortrages die erfreuliche Mitteilung machen, dass das Finanzministerium versprochen habe, der Schule eine jährliche Unterstützung zu gewähren, sobald der Betrieb begonnen habe. Er gab sodann einen kurzen, geschichtlichen Überblick über die Verluste, welche das deutsche Volk dadurch erlitten hat, dass sowohl ganze Stämme, als einzelne Familien und Individuen, die in die Fremde gezogen waren, dort in wenigen Generationen ihr Deutschtum verloren haben, in dem fremden Volke aufgegangen sind. Demgegenüber bezeichnet er es als unsere Pflicht, unseren unter fremden Nationen wohnenden Landsleuten beizustehen, ihnen es zu erleichtern, deutsch zu bleiben. Als wichtiges Mittel sieht er die Versorgung der deutschen Niederlassungen mit geeigneten Lehrkräften an. Diese zu liefern, seien

aber unsere dermaligen Schulanstalten nicht im stande, sie legten zu viel Gewicht auf das Wissen, die Theorie, viel zu wenig auf das Können, auf die Entfaltung des Sinnes für die Wirklichkeit, für praktische Betätigung und rasche Erfassung des in jeder Lage zweckmässigsten Vorgehens. Darauf seien auch die vielen Misserfolge zurückzuführen, welche deutsche Lehrer in fremden Ländern hatten, und diesem Übelstande abzuhelpen, sei die National-schule in Wertheim gegründet worden. Sie soll aber auch deutschen Eltern im Auslande die Gelegenheit bieten, ihre Kinder in Deutschland erziehen zu lassen, weshalb mit ihr ein Internat für die älteren Schüler verbunden sein wird, während die jüngeren in Familien untergebracht werden sollen. Der Unterricht wird die modernen Sprachen zu grunde legen, ein grosser Teil der Zeit soll der praktischen Ausbildung in Landwirtschaft und Handwerk, und der Einführung in das wirtschaftliche Leben, der Entwicklung der körperlichen Fähigkeiten gewidmet sein. Es steht der Schule zu diesem Zwecke ein grosser Versuchsgarten zur Verfügung, Werkstätten werden eingerichtet, Beamte der verschiedenen Zweige der Staatsverwaltung haben ihre Unterstützung zugesagt. Grosse Erfolge verspricht sich der Redner von einem intensiven, dem übrigen Unterricht angepassten und mit ihm in Wechselwirkung gebrachten Zeichenunterrichte. Durch individuelle Behandlung sollen die Schüler zu Persönlichkeiten erzogen, durch Belehrung und Gewöhnung ihr Nationalbewusstsein entwickelt und gefestigt werden. Die Leitung der Anstalt hat ein württembergischer Schulmann, Dr. Kapf, übernommen, als Lehrer sind eine Reihe tüchtiger, von der Wichtigkeit und Güte des Unternehmens durchdrungener Männer gewonnen. So zweifelt der Redner nicht an dem guten Erfolge der neuen Schule und bittet um kräftige Unterstützung.

Der mit der wohlthuenden Wärme eines von seiner Sache begeisterten Vorkämpfers gehaltene Vortrag rief lebhaften Beifall hervor. An der darauf folgenden Diskussion beteiligten sich die Herren: Direktor Treutlein, Direktor Müller, ein deutsch-amerikanischer Schulmann, Geheimerat Wagner und Geheimerat Dr. Engler.

585. Sitzung am 24. Oktober 1902.

Vorsitzender: Herr Geheimerat Dr. Engler. Anwesend 62 Mitglieder.

Neu angemeldetes Mitglied: Herr Oberschulrat Rebmann.

Lokal: der kleine Hörsaal im neuen chem. Institut der Techn. Hochschule

Der Vorsitzende widmete dem am 23. Oktober hierselbst verstorbenen Ehrenmitgliede, Kaiserl. russ. Staatsrat Professo von Trautschold, einen Nachruf. Trautschold hat sich nach Aufgabe seines Lehrstuhls in Moskau Ende der 80er Jahre in Karlsruhe niedergelassen, nahm an den Sitzungen des Vereins regen Anteil und wurde von diesem in Anerkennung seiner hohen wissenschaftlichen Verdienste um die Mineralogie, Geologie und Paläontologie zu seinem Ehrenmitgliede ernannt. Zum ehrenden Andenken an den Heimgegangenen erhoben sich die Anwesenden von ihren Sitzen. Darauf hielt Herr Dr. Brode von der Technischen Hochschule einen Vortrag über die Jonentheorie, die uns lehrt, dass in der Chemie jetzt neben den Atomen noch besondere positiv und negativ elektrisch geladene kleinste Teilchen die Ionen, angenommen werden. Alle elektrischen Leiter zweiter Ordnung (erster Ordnung sind die Metalle, die sich beim Durchgang der Elektrizität nur erwärmen, nicht zersetzen), die sogenannten Elektrolyte, zu denen besonders die Salze, Säuren und Basen gehören, zerfallen in wässriger Lösung von selbst in jene Ionen, die aus einzelnen elektrisch geladenen Atomen oder Atomgruppen bestehen. Dieselben wandern beim Durchgang eines Stromes durch die Lösung an die entgegengesetzten Pole, entladen sich hier und werden in gewöhnlicher Form ausgeschieden. Nach dieser neuen, hauptsächlich von van 't-Hoff und Arrhenius begründeten, von Ostwald und Nernst vertretenen Theorie, lösen sich also die Salze, Säuren u. s. w. nicht als solche in Wasser, sondern zerfallen dabei in ihre Ionen, das Kochsalz z. B. in die Ionen Chlor und Natrium, Salpeter in Kalium und Salpetersäureradikal, Salzsäure in Wasserstoff und Chlor. Stärke von Säuren und Basen, sowie andere physikalische und chemische Eigenschaften sind durch den Grad des Zerfalls in Ionen bedingt. — Durch eine Reihe von Experimenten demonstrierte der Vortragende die Wanderung und andere Eigenschaften der Ionen. An den mit grossem Beifall aufgenommenen Vortrag schloss sich eine Diskussion, an der sich die Herren Engler, Glaser und Hübner beteiligten.

586. Sitzung am 7. November 1902.

Vorsitzender: Herr Geheimerat Dr. Engler. Anwesend 41 Mitglieder.

Neu angemeldetes Mitglied: Herr Forstpraktikant Stoll, Assistent für Forstwesen an der Technischen Hochschule.

Herr Professor Dr. Udo Müller hielt einen Vortrag über die Beschädigung des Waldes durch Rauchgase. Nach kurzen einleitenden Bemerkungen über das mit der Entwicklung der Industrie parallel gehende Auftreten derartiger Schäden, führte er an der Hand von geeigneten Abbildungen und von Demonstrationen verschiedener rauchkranker Pflanzen zunächst die äussere Erscheinung rauchkranker Wälder vor, die sich von der völligen Unterdrückung der Vegetation auf sogenannten Rauchblößen, zu akuten rasch eintretenden Erkrankungen und schliesslich zu weniger deutlich sichtbarem chronischem Schaden mit allmählichem Übergang in den gesunden Wald abstuft. Diese Schäden charakterisieren sich teils als direkte Ätzwirkungen scharfer Mineralsäuren, teils als Störungen der Lebensfunktionen durch gasförmig aufgenommene stark verdünnte Säuren, vorzugsweise der schwefligen Säure, die bei länger dauernden Einwirkungen stets durch die chemische Analyse nachgewiesen werden können.

Als Ursache wurden erkannt nicht der Russ oder Staub, auch nicht die festen unlöslichen Bestandteile des Hüttenrauches, ebensowenig wie die festen, aber löslichen Bestandteile desselben, wenn sie in den Boden gelangen, sondern vorzugsweise nur die gasförmigen Gemengteile der Luft, vor allem schweflige Säure, Chlor und Fluor.

Als verbreitetster Schädiger aber tritt die schweflige Säure auf, die sich in den Abgasen vieler Fabriken, im Hüttenrauche und in jedem Steinkohlenrauche findet. Ihren Einwirkungen sind besonders die immergrünen Pflanzen, vorzugsweise Fichte und Tanne, ausgesetzt, während sich Laubhölzer viel widerstandsfähiger erweisen. Die Einwirkung erfolgt fast ausschliesslich nur während der Vegetationsperiode, nur bei Tag im Licht und besonders an den jüngsten Organen. Unter ihrem Einflusse tritt eine merkliche Herabsetzung der Verdunstung und der Assimilation ein, hauptsächlich wohl hervorgerufen durch Entstehung von Schwefelsäure aus der aufgenommenen schwefligen Säure und von nascentem Sauerstoff.

Die Forstwirtschaft steht diesem Schaden fast machtlos

gegenüber. Der Hauptkampf gegen den Rauchschaden muss von den raucherzeugenden Anlagen geführt werden und muss sich in zwei Richtungen bewegen, Kondensation und technische Verwertung der schädlichen Rauchbestandteile und starke Verdünnung des durch die Kamine entweichenden Restes derselben durch reichlich zugeführt Luft.

An der Diskussion beteiligten sich die Herren Döll, Engler, Föhlisch, Jakubowsky, Klein, Meidinger, E. Müller.

587. Sitzung am 21. November 1902.

Vorsitzender: Herr Geheimerat Engler. Anwesend 21 Mitglieder.

Im zoologischen Hörsaal des Aulabaues der Technischen Hochschule hielt Herr Hofrat Professor Dr. Nüsslin einen Vortrag über die Biologie der Chermesarten, insbesondere über die Tannenschildlaus (*Chermes piceae*), der unter den Abhandlungen zum Abdruck gebracht ist.

An der Diskussion beteiligten sich die Herren Ammon und Hausrath.

588. Sitzung am 5. Dezember 1902.

Vorsitzender: Herr Geheimerat Dr. Engler. Anwesend 42 Mitglieder.

Der Vorsitzende berichtete, dass es gelungen sei, kleine Tiegel und Kölbchen aus Bergkrystall, wiewohl dieser erst bei ca. 1700 Grad schmilzt, herzustellen; ihr Vorteil besteht darin, dass sie wie Platingefässe sehr stark erhitzt werden können, ohne zu schmelzen, dass sie aber erheblich billiger als diese sind. Ihre Widerstandsfähigkeit gegen starke Temperaturschwankungen wurde dadurch gezeigt, dass ein nahezu glühend gemachter Tiegel in kaltes Wasser geworfen, nicht zersprang.

Hierauf sprach Herr Dr. med. Heinsheimer über „Das Problem der Geschlechtsbestimmung“. In der Einleitung wies der Redner auf die sogenannte Konstanz der Sexualproportion hin, auf jene seit Jahrhunderten feststehende Tatsache, dass überall auf der Erde mehr Knaben als Mädchen geboren werden, und zwar in dem durchschnittlichen Zahlenverhältnis von 106 Knaben auf 100 Mädchen. Die Statistiker haben sich mit grösstem Fleisse bemüht, alle diejenigen Faktoren ausfindig zu machen, die jene Verhält-

miszahl zu beeinflussen im stande sind, und je nach dem Ergebnisse ihrer Forschungen allerlei Theorien über die Ursachen der Geschlechtsbestimmung aufgestellt. Die Statistik ist jedoch nicht im stande, die Frage definitiv zu lösen, vielmehr bedarf es hierzu der Untersuchungsmethoden der Biologie, die sich auf das Tier- und Pflanzenreich erstrecken und der wir bereits wichtige Feststellungen verdanken. Mit grösster Wahrscheinlichkeit ist das Geschlecht bereits im befruchteten Ei präformiert, mithin die Geschlechtsbestimmung ein Vorrecht des mütterlichen Organismus. Eine willkürliche Einflussnahme auf die Geschlechtsbestimmung, wie sie bei einzelnen niederen Tieren durch verschiedenartige Ernährung des Muttertieres zweifellos möglich ist, erscheint bei Säugetieren und beim Menschen aussichtslos. Der Redner ging im Laufe seines Vortrages auf zahlreiche biologische Einzelheiten und auf eine Reihe von älteren und neueren Hypothesen in kritischer Form ein. Bei der Eigenart des Gegenstandes ist eine eingehende Würdigung von Details an dieser Stelle nicht tunlich. Wir begnügen uns daher mit diesem flüchtigen Hinweis auf die Grundgedanken des hochinteressanten Vortrages, an den sich eine angeregte Diskussion anschloss, an welcher sich die Herren Ammon, Carl, Dittrich, Hausrath, Grävenhan und Schuberger beteiligten.

589. Sitzung am 19. Dezember 1902.

Vorsitzender: Herr Geheimerat Dr. Engler. Anwesend 73 Mitglieder.

Neu angemeldete Mitglieder: Die Herren Augenarzt Dr. Alberti, Oberkriegsgerichtsrat Becker, Geh. Hofrat Schenck.

Herr Geh. Hofrat Dr. Bunte sprach im neuen grossen chemischen Hörsaal der Technischen Hochschule über das Thema „Neues vom Gaslicht“. Der Vortragende erläuterte durch eine Reihe von Experimenten das Wesen der Flamme und zeigte, dass jede Flammenbeleuchtung durch Kerzen oder Lampen eine Art Gasbeleuchtung sei. Da die Leuchtkraft der Flamme durch glühenden Kohlenstoff (Russ) bedingt ist, so kann dieselbe erhöht werden durch Vermehrung der Kohleabscheidung mittels Benzo-lierung oder Karburierung des Gases oder durch Steigerung der Temperatur (Siemens Regenerativbrenner, Acetylen). Die Flamme wird entleuchtet durch Zumischung von Kohlensäure oder Luft



zum Gas. Das letztere geschieht in dem Bunsenbrenner. Bunsen erfand denselben 1852 und verwendete ihn bei der Einrichtung des neuen chemischen Laboratoriums in Heidelberg; seitdem ist der Bunsenbrenner mit unwesentlichen Abänderungen, nicht nur bei allen Gasheiz- und Kochgeräten, sondern auch bei der Gasglühlichtbeleuchtung in Anwendung. Die Vorgänge in der Bunsenflamme wurden sodann zergliedert; es wurde gezeigt, dass zu wenig Luftbeimischung ein Riechen, zu viel Luftbeimischung ein Zurückschlagen der Flamme erzeugt und dass die richtige Luftzufuhr für die Heizung wie für die Beleuchtung sehr wesentlich sei. Sodann wurde die Entwicklungsgeschichte des Gasglühlichtes geschildert und die Herstellung eines Glühkörpers gezeigt, durch Imprägnieren von Tüll mit den Salzen der Edelerden, Trocknen, Abbrennen und Härten, bis zum gebrauchsfähigen Zustande. Nachdem das Wesen der gebräuchlichsten Gasselbstzünder und die Bedingungen für deren Wirksamkeit durch Experimente erläutert, wurde eine Anzahl verschiedener Selbstzünder und Gasglühlichtlampen verschiedener Konstruktion vorgeführt, darunter auch eine Lucaslampe, die in Berlin zur Beleuchtung verschiedener Strassen Verwendung findet, und mit den elektrischen Bogenlampen an Helligkeit wetteifert. Redner ging dann auf die chemischen und physikalischen Bedingungen für die Lichterzeugung näher ein und knüpfte an die jüngsten Untersuchungen von Lummer und Pringsheim in der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt Betrachtungen über die Verteilung der Energie im Spektrum und über den Nutzeffekt der Flammenbeleuchtung. Derselbe betrage selbst bei den besten Auerlampen noch nicht 2 %, d. h. nur ein kleiner Teil der Energie werde in Wellen ausgestrahlt, welche im sichtbaren Teil des Spektrums liegen, während die weitaus grösste Energiemenge in den unsichtbaren Teil des Wärmespektrums falle. Manche Substanzen, Gase und feste Körper, darunter die Auermischung für Gasglühlicht mit 99 % Thor und 1 % Cer, besitzen eine selektive Strahlung, d. h. sie senden unter sonst gleichen Umständen mehr Lichtstrahlen aus, als ein glühender sogenannter absolut schwarzer Körper oder wie der Russ in den gewöhnlichen Leuchtflammen.

Durch Erhöhung der Temperatur des leuchtenden Körpers erfolge eine Verschiebung des Maximums der Strahlung nach dem sichtbaren Teil des Spektrums und die Ausnützung werde ausser-

ordentlich vergrößert. Eine solche Steigerung der Temperatur und dadurch die Leucht- und Glühkraft der Flamme könne durch Anwendung von Acetylen statt Leuchtgas oder von Lindeluft oder Sauerstoff an Stelle von atmosphärischer Luft herbeigeführt werden. Es sei die Aufgabe der Beleuchtungstechnik, der von der Wissenschaft gezeigten Richtung zu folgen und sie werde auf diesem Wege sicher noch weitere Erfolge erringen.

Im Anschluss an die Erörterungen über die Strahlungsgesetze wurde die Methode der optischen Pyrometrie zur Messung hoher Temperaturen erläutert und die Einrichtung des Pyrometers von Wanner gezeigt.

Von einer Diskussion wurde der vorgerückten Stunde wegen Abstand genommen.

590. Sitzung am 16. Januar 1903.

Vorsitzender: Herr Geheimerat Dr. Engler. **Anwesend** etwa 300 Zuhörer.

Der Vorsitzende begrüßte zuerst die auf Einladung erschienenen Mitglieder des oberrheinischen Bezirksvereins deutscher Chemiker, des Karlsruher Bezirksvereins deutscher Ingenieure, des Elektrotechnischen Vereins und des Karlsruher chemischen Vereins.

Herr Prof. Dr. Haber sprach sodann über seine Studienreise in den Vereinigten Staaten von Nordamerika.

591. Sitzung am 30. Januar 1903.

Vorsitzender: Herr Hofrat Dr. Meidinger. **Anwesend** 26 Mitglieder.

Neu angemeldete Mitglieder: die Herren: Assistent am mineralogischen Institut der Technischen Hochschule Buri, Geh. Kriegsrat Kund, Zinkograph Rud. Mayer, Technischer Hilfsarbeiter im Grossh. Ministerium des Innern Dr. Paravicini, Generalmajor z. D. v. Wallenberg.

Herr Dr. Wilser aus Heidelberg berichtete über die in den letzten Jahren durchgeführte, 45 000 Mann umfassende schwedische Volksuntersuchung, die Anthropologia suecica. Der Vortrag ist unter den Abhandlungen zum Abdruck gebracht.

An der Diskussion beteiligten sich die Herren Ammon und Muth.

592. Sitzung am 13. Februar 1903.

Vorsitzender: Herr Geheimerat Dr. Engler. **Anwesend** 45 Mitglieder.

Der Vorsitzende, Herr Geheimerat Dr. Engler, gedachte zuerst in warmen Worten der Verdienste des verstorbenen Staatsministers Dr. Nokk, dessen Mitwirkung es in erster Reihe zu danken sei, dass unter Grossherzog Friedrich Wissenschaften und Künste zu so hoher Entwicklung gelangten. Derselbe habe, trotzdem sein eigenes Denken und Streben mehr auf die schöne, vor allem klassische Literatur und auf Kunst gerichtet gewesen sei, doch auch die Bedeutung der Naturwissenschaften für unsere Kulturentwicklung klar erkannt und dieselben an unseren drei Hochschulen durch die Begründung von vortrefflich eingerichteten Instituten, die zu den besten Deutschlands gehörten, aufs wirksamste unterstützt. Auch in naturwissenschaftlichen Kreisen sei ihm deshalb ein dauerndes ehrenvolles Andenken gesichert.

Herr Professor Dr. Klein hielt sodann einen Vortrag über Zeichen und Inschriften in lebenden Bäumen. An zwei geringelten, etwa 10 cm dicken Stangenhölzern, an welchen im Frühjahr ein breiter Rindenstreifen ringsum bis auf das Holz abgeschält worden war und die 2 $\frac{1}{2}$ Jahre nach dieser Verletzung abgestanden waren, wurde der aufsteigende und absteigende Saftstrom demonstriert. Am oberen Wundrande hatte sich infolge der Stauung der ausschliesslich in der Rinde abwärts wandernden organischen Baustoffe ein breiter Überwallungswulst gebildet und das obere Ende des Stammes war weiter in die Dicke gewachsen, weil der unverletzt gebliebene Holzkörper auch nach der Verwundung Wasser und Aschenbestandteile von den Wurzeln zur Krone empor geleitet hatte. Unterhalb der Ringelungsstelle war jegliches Dickenwachstum unterblieben und der Baum stand ab, als die verhungerten Wurzeln den Transpirationsverlust nicht mehr zu decken vermochten. Beim Einschneiden von Buchstaben und sonstigen Zeichen in die Rinde läuft das Leben des Baumes keine Gefahr, dagegen wird durch derartige Inschriften, wenn sie bis auf oder bis ins Holz gehen, der Nutzholzwert der Stämme vermindert. Von den Wundrändern aus überwallen solche Inschriften in wenigen Jahren, die bekannten Bilder auf der Rinde liefernd, die in dem Masse, in welchem der Baum sich verdickt, mehr und mehr in die Breite gedehnt werden. Zugleich bewahrt aber auch, was dem Laien zumeist unbekannt bleibt, der Baum

das ehemalige Zeichen völlig unverändert in seinem Holzkörper wie in einem Archive auf. Die Überwallungswulst kann mit dem blossgelegten Holzkörper, dessen lebende Elemente rasch vertrocknen, nicht verwachsen. Die innerste Schicht des Überwallungswulstes wird in inniger Berührung mit dem toten Holze gleichfalls getötet und schwarz gefärbt, so dass später, wenn von den Überwallungswülsten jahrzehnte lang nach innen zu Holz gebildet worden ist, die ehemaligen Zeichen tief in den Baumstamm geraten. Bei zufälligem oder absichtlichem Aufspalten trennen sich die beiden Berührungsflächen und wir erhalten ausser dem ehemaligen Zeichen von braungrauer Farbe noch einen spiegelbildartigen Abdruck auf dem äusseren Spaltstück, der wie mit einem glühenden Eisen in das Holz eingebrannt erscheint. Bleiben beim Einschneiden solcher Zeichen isolierte Rindenstücke stehen oder werden hierbei Teile des Holzkörpers selbst herausgeschnitten, so erhalten wir das erste Mal auf der inneren, das zweite Mal auf der äusseren Spaltfläche die Zeichen reliefartig erhaben. Alle diese Dinge wurden durch eine Anzahl Sammlungsobjekte illustriert.

Sodann sprach Herr Professor Klein über seltene Formen der Fichte und Tanne im Schwarzwald, davon ausgehend, dass er schon seit Jahren an dem Material für ein forstbotanisches Merkbuch für das Grossherzogtum Baden sammle, in welchem über alle merkwürdigen Bäume unseres Heimatlandes berichtet werden soll, teils um dieselben einem weiteren Kreise von Naturfreunden bekannt zu machen, vor allem aber auch, um deren möglichst lange Erhaltung, wenigstens soweit es sich um „Naturdenkmäler“ handelt, dadurch zu erleichtern. An der Hand einer grossen Anzahl selbst aufgenommener Photographien wurden besprochen: eine Verwachsung von Fichte und Buche beim Wiedenereck, gewaltige vielgipfelige Wettertannen und Fichten von den Weidfeldern des hohen Schwarzwalds (Breitnauer Weidfeld, Giesiboden, Ungendwieden, Hörnle beim Notschrei, Feldberg, Obermulden), die Schlangentannen von Weisenbach, die Kugelfichte von Hundsbach, die Säulenfichten von St. Blasien, Notschrei und Forbach, die durch thujaartig hängende Äste ausgezeichnete sogenannte Auerhahntanne bei Schön Münzach, gewaltige und bizarre Stelzenfichten vom Schauinsland und von Forbach, vom

Sturme geworfene grosse Fichten und Tannen, von denen sich nachher einige Äste zu normalen Bäumen aufgerichtet und sogar vollständig bewurzelt hatten, vom Schauinsland, von Sulzburg und vom Hochkelch, Zwergformen der Fichte von Wieden und von Sulzburg, eine Zizenfichte von Oberried und die prachtvolle Warzentanne von St. Ulrich. Alle diese, zum Teil höchst auffallenden und merkwürdigen Bildungen, die zum grössten Teil auf Samen- oder Knospenvariation zurückzuführen sind, wurden, soweit dies möglich, ihrer Entstehungsweise nach erklärt. Redner knüpfte daran die Bitte, die hiermit auch an weitere Kreise gerichtet werden soll, ihn auf interessante Bäume jeglicher Art unserer Heimat aufmerksam zu machen.

593. Sitzung am 6. März 1903.

Vorsitzender: Herr Geheimerat Dr. Engler. Anwesend 33 Mitglieder.

Herr Dr. Auerbach hielt einen Vortrag über den Winterschlaf unserer heimischen Säugetiere. In der ganzen Klasse der Wirbeltiere ist der Winterschlaf eine weit verbreitete Erscheinung. Einzelne Fische, alle heimischen Amphibien und Reptilien verfallen im Herbst in einen lethargischen Zustand, der bis zum Frühjahr währt. Nach den neuesten Untersuchungen scheinen sogar einzelne Vögel einen Winterschlaf abzuhalten. Unter den Säugetieren sind auch Winterschläfer viele unserer Nager, z. B. Murmeltier, Hamster, Siebenschläfer u. s. w., dann Insektivoren, z. B. die Igel und alle bei uns lebenden Fledermäuse. Bär und Dachs dürfen nicht zu den echten Winterschläfern gerechnet werden. Die Hapterscheinungen während des Schlafes sind: 1. eine starke Herabsetzung der Sensibilität. 2. Verminderung des gesamten Stoffwechsels auf das möglichst kleinste Mass und als Folge hiervon 3. Verminderung der Körpertemperatur, der Herz- und Atemtätigkeit. 4. Besonders bemerkenswert ist es, dass beim Erwachen eine plötzliche, rapide Steigerung der Eigenwärme der Tiere auf die normale Temperatur stattfindet, ohne dass man bis jetzt im stande ist, anzugeben, woher eine solche enorme Verbrennungswärme, die hierzu notwendig ist, vom Tiere genommen wird. In bezug auf Nahrungsaufnahme verhalten sich die verschiedenen Schläfer sehr verschieden; es geht aber

aus den Untersuchungen hervor, dass z. B. Murmeltier und Igel während der ganzen Dauer des Schlafes keine Nahrung aufnehmen brauchen. Versuche, Merkmale zu finden, die nur den Winterschläfern eigentümlich sind, haben bis jetzt keinen Erfolg gehabt. Die schon vor langer Zeit entdeckte Winterschlafdrüse hat sich auch bei Nichtwinterschläfern gefunden; nach den neuesten Untersuchungen bildet sie nur eine Art des Fettgewebes. Man ist bis jetzt noch nicht im stande, genau den Grund des Verfalles in den Winterschlaf anzugeben. Jedenfalls darf nicht die Kälte allein dafür verantwortlich gemacht werden, sondern es kommen noch andere Umstände hinzu, wie z. B. Nahrungsmangel im Winter, Einfluss der Jahreszeiten u. s. w. Das Experiment, künstlich den Winterschlaf zu erzeugen, ist bis jetzt erst einem Forscher gelungen, und zwar F. G. Suber am Ende des 18. Jahrhunderts. Er war im stande bei Hamstern beliebig das Einschlafen zu bewirken. Ein Vergleich des Winterschlafes mit dem gewöhnlichen, ruhigen Schlafe zeigt, dass beide weit von einander verschiedene Erscheinungen im Leben der Tiere sind und dass ersterer eine weise Einrichtung der Natur ist, durch die sie in Zeiten ungünstiger äusserer Lebensbedingungen ihre Geschöpfe vor dem drohenden Untergang bewahrt.

An der sich an den Vortrag knüpfenden Besprechung beteiligten sich ausser dem Vortragenden die Herren Ammon, Döderlein, Engler, Gräfenhan, Meidinger, Stoll, Tross und Volz.

594. Sitzung am 27. März 1903.

Im grossen chemischen Hörsaal der Technischen Hochschule.

Vorsitzender: Herr Geheimerat Dr. Engler. Anwesend I. K. Hoheiten der Grossherzog und die Grossherzogin, sowie zahlreiche Gäste.

Der Vorsitzende, Herr Geheimerat Dr. Engler, eröffnete die Sitzung, wobei er Ihren Königlichen Hoheiten dem Grossherzog und der Grossherzogin den ehrerbietigsten und wärmsten Dank des Vereins für den regen Anteil, den sie jederzeit seinen Bestrebungen entgegengebracht hätten, ausdrückte; sodann gab Herr Privatdozent Dr. Schwarzmann einen vorläufigen Bericht über die Erdbeben vom 22. März in der Nähe von Karlsruhe.

Der Redner leitete seinen Vortrag ein durch einen kurzen Überblick über die geologischen Verhältnisse der oberrheinischen Tiefebene und des Schwarzwaldes, sowie über die verschiedenen

Gruppen der hier beobachteten Beben und gab hierauf die wesentlichen Punkte an, auf welche man bei Wahrnehmung eines Bebens zu achten hat.

Das Beben vom 22. März 1903 gehört zu denjenigen Dislokationsbeben, welche auf eine Bewegung der unter den mächtigen Schottermassen des Rheindiluviums befindlichen, durch Verwerfungen zerstückelten Gesteinsmassen, zurückzuführen sind. Das Hauptbeben vom 22. März, 6 Uhr 4 Minuten morgens, äusserte sich in Kandel am stärksten (Kamine abgestürzt, Risse am Verputz der Mauern). Eine kartenmässige Darstellung dieses Bebens, durch Eintragen der positiven und negativen Nachrichten, zeigte eine Verbreitung der gemeldeten Erschütterungen nördlich bis Philippsburg, Germersheim, Edenkoben, westlich bis Rinntal und Niederschlettenbach, südlich bis zur Lauter und bis Dürmersheim. Auf der Ostseite wurde eine Grenze festgelegt durch die positiven Berichte von Ettlingen, Karlsruhe bis zum Schlachthof und Eggenstein einerseits und anderseits durch die negativen Meldungen von Wolfartsweier, Durlach, Hagsfeld, Friedrichsthal. Die Orte Grötzingen, Berghausen, Söllingen im Pfinztal, sowie Palmbach und Grünwettersbach haben das Beben gleichfalls nicht verspürt; dagegen ist in Bretten das Beben wahrgenommen worden. Es ist dies aus der Tatsache zu erklären, dass Kiese und Sande des Rheintals bei ihrer grossen Mächtigkeit als Polster dämpfend auf die Erschütterung wirken, während festes Gestein dieselben besser leitet, sowie aus dem modifizierenden Einfluss der Verwerfungsspalten.

Das schwächere Nachbeben, 1 Uhr 56 Minuten, schien sein Zentrum unter Pforz zu haben. An diesem Ort wurden Schornsteine umgeworfen und daselbst, ebenso wie in Knielingen und Teutschneureuth wurde, dieses Beben stärker als das Hauptbeben verspürt.

Vorbeben fanden statt schon Anfang des Jahres, insbesondere 27. bis 30. Januar, am Samstag den 21. März, 8 Uhr vormittags, am Sonntag den 22. März, etwa 3 Uhr (4 Uhr) und $\frac{1}{4}$ 6 Uhr früh. Dann kam das Hauptbeben um 6 Uhr 4 Minuten. Die Zeitangaben differieren jeweils um einige Minuten. Dem Nachbeben um 1 Uhr 56 Minuten nachmittags folgten weitere: um 4 Uhr nachmittags (Rollen verspürt in Langenberg), 6 Uhr abends, am Donnerstag den 26. März 2 Uhr nachts und 10 Uhr 10 Mi-



nuten morgens (10³/₄ Uhr), Freitag den 27. März ¹/₂3 Uhr (3 Uhr) nachts.

Das Hauptbeben hatte im allgemeinen eine Dauer von vier Sekunden, das Nachbeben um 1 Uhr 56 Minuten nachmittags von 2 Sekunden (Teutschneureuth 8 Sekunden). Bei jenem wurden meist zwei oder drei Stösse, bei diesem ein Stoss oder ein Rütteln gemeldet. Bei beiden wurden Schallerscheinungen, insbesondere von solchen Orten, welche nicht weit vom Herd des Bebens entfernt waren, gemeldet. Darunter wird häufig unterirdisches Geräusch und dreimal ausdrücklich vorhergehendes donnerartiges Geräusch mit nachfolgendem Stoss gemeldet. Das Registrierbarometer des meteorologischen Zentralbureaus zeigte beim Nachmittagsbeben um 1 Uhr 54 Minuten einen kleinen Ausschlag. Bei den stärker erschütterten Orten wurden auch Furchterscheinungen der Tiere beobachtet.

Am 24. Januar 1880 hat ein Erdbeben stattgefunden, das gleichfalls seinen Hauptherd in der Gegend von Kandel gehabt hat und im allgemeinen dieselben Ortschaften, wie die jetzige Erschütterung berührt hat, jedoch damals noch anderweitige Gebiete betraf. Es ist vielleicht möglich, dass eine genaue Untersuchung Aufschlüsse über den tektonischen Bau unter der Diluvialdecke des Rheintals liefert.

Zum Schluss erwähnte der Vortragende die Erdbeben, welche etwa gleichzeitig mit dem unsrigen in Piemont, Südfrankreich und Südengland aufgetreten sind, sowie die erneute Tätigkeit der Soufrière, gab Beispiele von früheren derartigen Simultanbeben und machte auf die verschiedenen Möglichkeiten der Erklärungsversuche solcher Simultanbeben aufmerksam.

Im Anschluss daran machte Herr Geh. Hofrat Dr. Haid die Mitteilung, dass die Beobachtungen, die er an der feinen Libelle auf der Axe des Passageninstrumentes in der Nacht vom 21. auf 22. und am Nachmittag des 22. machte, keine Änderungen in dem vertikalen Stande des isolierten Mauerpeilers im geodätischen Observatorium konstatieren lassen. Ob eine gleichmässige Senkung stattgefunden habe, muss jedoch dahin gestellt bleiben. Änderungen in der Höhenlage durch Erdbeben sind im allgemeinen sehr wahrscheinlich; dieselben sind aber zunächst nicht so leicht nachweisbar, bis sie durch wiederholte Beben nach Verlauf eines längeren Zeitraums einen für die Messung merklichen Betrag

erreicht haben. Die kurz vor und nach dem Erdbeben vom 24. Januar 1880 ausgeführten Nivellements auf der Strecke Strassburg—Appenweier lassen solche Höhenänderungen vermuten, und die Widersprüche, die neuerdings zwischen den genauen nivellitischen Höhenbestimmungen vom Jahre 1881 und den neueren schweizerischen Präzisionsnivellements längs der Strecke Basel—Konstanz sich ergeben, dürfen auch auf Änderungen in der Höhenlage zurückgeführt werden.

595. Sitzung am 24. April 1903.

Vorsitzender: Herr Geheimerat Dr. Engler. **Anwesend** 51 Mitglieder. **Neu angemeldete Mitglieder,** die Herren: Assistent am chemischen Institut der Technischen Hochschule Dr. Arnold, Handelslehrer Fink, Assistent für Bodenkunde an der Technischen Hochschule Dr. Jahn, Chemiker Dr. Just.

Herr Privatdozent Dr. Muth hielt über den Kreislauf des Stickstoffs einen Vortrag, der in erweiterter Form unter den Abhandlungen des vorliegenden Bandes zum Abdruck gebracht ist.

An der sich hieran knüpfenden Besprechung beteiligten sich ausser dem Vortragenden die Herren Engler, Le Blanc, Siefert und Wöhler.

596. Sitzung am 15. Mai 1903.

Mitglieder-Hauptversammlung.

Vorsitzender: Herr Geheimerat Dr. Engler. **Anwesend** 42 Mitglieder. **Neuangeschlossene Mitglieder:** die Herren Ökonomierat Magenau in Augstenberg; Verbandssekretär Riehm.

Herr Geh. Hofrat Dr. Meidinger gab in Vertretung des erkrankten Schriftführers zunächst den Bericht über die Tätigkeit des Vereins im verflossenen Geschäftsjahre; es geht daraus hervor, dass der Verein zurzeit 211 Mitglieder zählt und damit eine Stärke erreicht hat, die er seit seiner Gründung noch nicht besessen hat.

Herr Direktor Treutlein gab hierauf für den am Erscheinen verhinderten Kassier den Kassenbericht, der im Vorwort zum Abdruck gebracht ist. Nachdem dem Kassier Entlastung erteilt worden war, wurde der bisherige Vorstand durch Zuruf wieder gewählt.

Der Vorsitzende, Herr Geheimerat Dr. Engler, wies sodann anlässlich des 100. Geburtstages von Justus v. Liebig auf dessen Bedeutung für die Entwicklung der Chemie hin; Herr Geh. Hofrat Dr. Meidinger machte im Anschluss daran noch einige interessante Mitteilungen über seine Beziehungen zu Liebig während seiner Studienzeit in Giessen.

Herr Privatdozent Dr. Wöhler hielt darnach einen Vortrag über „selbststrahlende Materie“. Nach seinen Ausführungen fand 1896 Becquerel im Verfolg der eben entdeckten X-Strahlen, dass Uran und Uransalze, wie auch Uranminerale sehr aktive Strahlen aussenden, welche die Luft jonisieren, d. h. sie leitend machen, auf die photographische Platte wirken, wie Lichtstrahlen und Fluoreszenz in manchen Körpern, wie Flusspath, Zinkblende u. a., hervorrufen. Auch blaue Färbungen werden in diesen Substanzen erzeugt; sie sind auf eine chemische Einwirkung zurückzuführen, da es dem Vortragenden gelang, die gleiche blaue Farbe im farblosen Flusspath durch metallisches Calcium zu erzeugen. Selbststrahlend oder radioaktiv heissen die „Becquerelstrahlen“, weil sie ohne äussere Zufuhr freier Energie in der Wärme und in der Kälte verflüssigter Luft, auf der Erdoberfläche und in dem 852 Meter tiefen Clausthaler Schacht in gleicher Weise wirken.

Ein Schweizer Ehepaar, Herr und Frau Curie, vermochten 1898 aus den Rückständen der Joachimstaler Uranpecherz-Verarbeitung eine besonders aktive Substanz dieser Art, das Radium zu isolieren, das sich als neues Element vom Atomgewicht 225, mit einem charakteristischen Spektrum erweist. Nur wenige milliontel Prozent sind in dem Erz vorhanden, so dass aus Tonnen Erz nur Milligramme Radium zu gewinnen sind und die Darstellung von 1 Gramm auf etwa 8000 M. zu stehen kommt. Die Strahlen rufen schmerzhaft und schwerheilende, eiternde Wunden durch Glas und Kleider hindurch hervor, bräunen Papier und vernichten den Haarwuchs. Andere Stoffe mit ähnlichen Eigenschaften und unter dem Namen Polonium, Aktinium, Radioblei und Radiotellur sind ebenfalls in dem Uranpecherz aufgefunden worden, doch ist ihre Existenz als neue Elemente noch zweifelhaft.

Wie Moschus und andere Riechstoffe senden die radioaktiven Substanzen eine stoffliche Emanation aus, durch welche anderen Körpern im eingeschlossenen Raum die gleichen selbststrahlenden Eigenschaften, also durch Induktion, vorübergehend erteilt werden.

Aus der Ablenkung eines Teils der Becquerelstrahlen im magnetischen Felde und ihrer Ähnlichkeit mit Kathodenstrahlen geht hervor, dass sie zum Teil, wie diese, aus kleinsten Partikelchen mit negativer Ladung (Elektronen) bestehen von einer Grösse, die höchstens den 2000sten Teil derjenigen eines Wasserstoffatoms erreicht, und besitzen eine Geschwindigkeit, die halb so gross wie die des Lichtes ist.

Die Quelle der dauernden Energieausstrahlung ist vielleicht in einer Umlagerung der noch in einem instabilen (metastabilen) Zustande befindlichen schwersten Atome Uran und Thor zu suchen, welche überschüssige Elektronen bis zur Stabilität ausschleudern, womit ein gleichzeitiger Verlust an Masse verbunden sein kann, der durch die Wage nicht feststellbar ist, aber nicht notwendig verbunden sein muss, da die Trägheit der magnetisch ablenkbaren, abgeschleuderten Massenteilchen elektromagnetisch gedeutet also nur vorgetäuscht worden sein kann.

Abhandlungen.

Zur Biologie der Gattung *Chermes* Htg.,
insbesondere
über die Tannenrindenlaus *Chermes piceae* Ratz.

Von Prof. Dr. O. Nüsslin.*

Bei der Auswahl des Themas meines Vortrags kamen mir wiederholt Bedenken verschiedener Art. Sollte es möglich sein, so fragte ich mich, den Gegenstand meiner Wahl in einem verständlichen einigermassen abgerundeten Bilde in der kurzen Zeit einer Stunde Ihnen vorzuführen? Ist doch die Gattung *Chermes* die allerverwickeltste aller Pflanzenläuse, die wir kennen. Ich kann deshalb nur einzelne Bruchstücke unseres Wissens darbieten. Ich will dabei Ihr Auge insbesondere auf Erscheinungen lenken, die zu Fragen von allgemeinerem wissenschaftlichem Interesse hinführen und andererseits darf ich mir hier wohl erlauben, in meiner Auswahl Ihre Aufmerksamkeit insbesondere für Gebiete in Anspruch zu nehmen, die in den letzten Jahren der Gegenstand meiner eigenen Forschung geworden sind.

Die Gattung *Chermes* Htg. bildet mit der Gattung *Phylloxera* Fonsc. die Familie der *Phylloxeriden* Dreyf. oder Afterblattläuse, welche selbst wieder mit den *Psylliden* oder Blattflöhen, *Aphiden* oder Blattläusen und *Cocciden* oder Schildläusen die Unterordnung der *Phytophthires* oder Pflanzenläuse in der Ordnung der *Rhynchoten* oder Schnabelkerfe zusammensetzen.

Alle Afterblattläuse kennzeichnen sich durch ihre kleine gedrungene Gestalt, durch kurze Fühler und Beine, durch ungeflügelte Geschlechtstiere, durch vorwiegend parthenogenetische Fortpflanzung, alle sind ausschliesslich ovipar.

Von der Laubholzgattung *Phylloxera* ist unsere Gattung *Chermes* scharf unterschieden: sie ist auf Nadelholz beschränkt,

* Siehe auch: O. Nüsslin „Zur Biologie von *Chermes piceae* Ratz.“, Naturw. Ztschr. für Land- und Forstwirtschaft, I. Jahrg. 1903, 1. und 2. Heft.

ihre parthenogenetischen Weibchen sind durch harte Hautchitinplatten und durch Wachsausscheidungen gekennzeichnet, ihre Geschlechtstiere haben stets ausgebildete Mundteile und Darm, und die Geflügelten legen ihre Flügel stets dachförmig zusammen.

Während alle *Phylloxera*-Stadien nur 3gliedrige Fühler besitzen, haben die *Chermes*-Läuse 3-, 4- oder 5gliedrige Fühler. Während *Phylloxera* sich mit dreierlei Generationen begnügt, die sämtlich auf einer Wirtspflanze verbleiben, hat *Chermes* normal fünf Generationen, von denen einzelne auf andere Nadelhölzer auswandern.

Ursprünglich waren die *Chermes*-Arten auf der Fichte (*Picea excelsa*, *orientalis*, *alba*, *sitchensis* etc.) zu Hause gewesen und erzeugten hier Knospengallen, die an ananasartige Früchte erinnern und in denen sich eine zweite Generation entwickelt. Das ist der biologische Grundcharakter der Gattung.

Alle anderen Vorkommnisse von *Chermes*-Läusen an der Rinde, den Nadeln und Knospen von Lärchen, Kiefern und Tannen sind sekundär und durch Auswanderungen von der Fichte entstanden, nie sind dieselben mit Gallenbildungen an diesen Pflanzen verbunden, auch kehren die meisten dieser Auswanderer zur Fichte wieder zurück, um hier ihren Lebenszyklus zu beschliessen.

Der normale Lebenszyklus einer *Chermes*-Art setzt sich heute aus fünf Generationen zusammen und verläuft auf zwei Nadelholzarten. Der Zyklus beginnt mit der aus dem befruchteten Ei im Spätsommer entstandenen Generation, welche deshalb als I. oder Fundatrix-Generation zu bezeichnen ist. Die Fundatrix ist zugleich die eigentliche Gallenerzeugerin, indem durch ihr Saugen die Umbildung der normalen Fichtknospe zur Knospengalle eingeleitet wird. Die Fundatrix überwintert als Larve an der Knospe oder in der Nähe, stets ungehäutet. Erst im Frühjahr, wenn die Baumsäfte in Bewegung geraten, erwacht auch ihre Lebensenergie. In rascher Folge wächst sie jetzt, häutet sich dreimal, verändert dabei auch ihre Hautstruktur und legt einen Haufen zahlreicher Eier, die in weisse Wachswolle eingebettet werden. Die Fundatrix nimmt erwachsen eine plumpe birnförmige Gestalt an, bleibt stets flügellos,

ihre Eier entwickeln sich unbefruchtet, sie selbst ist ein parthenogenetisches Weibchen.

Zur Zeit ihrer Eiablage hat sich auch die Fichtenknospe zu entwickeln begonnen. Aber die zarten Nadeln sind unter der Knospenhülle schon deformiert, indem ihre Basis verdickt und verbreitert erscheint. Die jetzt nach und nach aus den Eiern der Fundatrix ausschlüpfenden Jungen steigen zur Knospe und verkriechen sich in die Achseln der jungen Nadeln, um daselbst zu saugen. Unter der Wirkung dieses Saugens vervollständigt sich die Deformierung der Knospennadeln. Statt zu schmalen Nadeln werden dieselben zu Schuppegebilden, ähnlich den Zapfenschuppen der Koniferenfrüchte. Nur an der Spitze erkennt man mehr oder weniger Gestalt und Färbung der Nadel. Die Schuppen selbst bleiben weisslichgrün und verfärben sich später an den Rändern in gelblichen oder rötlichen Tönen. Durch das Wachsen der Nadelbasen in die Breite schliessen sich die Schuppegebilde seitlich fest aneinander an und bilden so das geschlossene Ganze der Knospengalle. Die Läuse werden durch das Wachstum der Knospengalle käfigartig eingeschlossen, je ein Tier oder mehrere zusammen in eine Kammer im Innern der Knospennadelnachsels. Die reiche Nahrung der rasch wachsenden Knospengalle beschleunigt auch das Wachstum der Insassen. Nach dreimaliger Häutung sind sie zu „Nymphen“ geworden, das heisst mit Flügelstummeln versehen. Jetzt klaffen infolge zunehmender Austrocknung der Galle die Ränder zwischen den Knospenschuppen in Form von Spalten und gestatten den Nymphen den Austritt ins Freie. Oben auf der Knospengalle umherkriechend, verfärben sich die blassen Nymphen unter dem Einfluss des Lichtes, häuten sich zum vierten Mal und werden jetzt zu Geflügelten.

Das ist die II. Generation oder die *Migrans alata*-Generation. Denn diese Geflügelten verbleiben nicht auf der Fichte. Zum Fluge erstarkt verlassen sie die Mutterpflanze, um sich auf einer anderen Konifere, je nach der *Chermes*-Art auf einer Lärche, Kiefer oder Tanne niederzulassen. Hier erst legen die Geflügelten ihre zahlreichen Eier ab. Auch diese bleiben unbefruchtet, denn auch die *Migrans alata* ist ein parthenogenetisches Weibchen. Die Geflügelten haben fünfgliedrige Fühler im Gegensatz zu den dreigliedrigen Fühlern der Fundatrix. Die Ueberwanderung zur „Zwischenkonifere“ findet bald früher, bald später

im Jahre statt, je nach der Zeit der Reifung der Gallen. Der früheste Termin ist wohl die erste Hälfte des Juni, so bei *Ch. coccineus* Chol., *strobilobius* Kalt., *orientalis* Dreyf.; bei *Ch. viridis* Ratz. beginnt dagegen der Ausflug erst im halben Juli.

Die Auswanderer legen ihre Eier stets auf den Nadeln der Lärchen, Kiefern und Tannen ab, woselbst sie auch saugen. Dabei scheiden sie meist reichliche Wolle* ab, sodass die zahlreichen Eier unter den dachförmig angelegten Flügeln und der ausgeschiedenen Wolle geborgen sind. Etwa 14 Tage nach dem Ueberflug entschlüpfen den Eiern junge Larven, die alsbald von der Mutter wegstechen, frühestens Ende Juni bis Ende Juli, während die geflügelten Mütter nach der Eiablage absterben und allmählig durch Regen und Wind von den Nadeln entfernt werden. Aus diesen Jungen entsteht eine III. Generation, ungeflügelt wie die erste und wiederum rein parthenogenetisch. Sie verbleibt ihr ganzes Leben auf der Zwischenkonifere und heisst deshalb Emigrans. In ihrer körperlichen Beschaffenheit, insbesondere in der durch die Chitinplatten bedingten Hautstruktur ähnelt die junge Emigrans der Fundatrix, weshalb sie auch Fundatrix spuria genannt worden ist zur Unterscheidung von der Fundatrix vera. Auch beharrt sie bei den meisten Arten, *Ch. viridis* Ratz., *strobilobius* Kalt. und *coccineus* Chol. den ganzen Rest der Saison im ersten Larvenzustand, um erst im nächsten Frühjahr gleich der Fundatrix zu neuem Leben zu erwachen. Bei *Ch. sibiricus* Chol. und *Ch. orientalis* Dreyf. scheint die Emigrans dagegen rasch zu wachsen, sich noch vor Winter dreimal zu häuten und fortzupflanzen, dabei wieder ihresgleichen zu erzeugen.

Im nächsten Frühjahr entwickelt sich die überwinterte Emigrans-Larve nach dreimaliger Häutung zur Eierlegerin.

Aus den Eiern der Emigrans gehen nun Larven hervor, die, zarthäutig bleibend, auf junge Nadeln des beginnenden Mai-triebs wandern, sich auf deren Unterseite ansaugen und rasch unter viermaliger Häutung zu Geflügelten entwickeln. Diese Geflügelten, ebenfalls parthenogenetische Weibchen, wiederholen in ihrer körperlichen Erscheinung in jeder Beziehung ihre Vorgänger von der zweiten Generation der Migrans alata, nur sind sie kleiner und vermögen kaum die Hälfte der Eier jener Vorgänger

* *Ch. strobilobius* Kalt. nicht.

zu produzieren. Da aus diesen Eiern die Geschlechtstiere hervorgehen, hat man diese IV. Generation die „Sexupara“-Generation genannt. Man könnte sie ebenso charakteristisch die Remigrans-Generation nennen, weil diese Geflügelten niemals auf der Zwischenkonifere verbleiben, sondern zur Fichte zurückkehren. Da diese Sexupara-Geflügelten viel kleiner als die Migrantes alatae sind, sich daher rascher entwickeln als diese, sind sie stets die ersten *Chermes*-Geflügelten, die in der Saison erscheinen, Mai, Juni. Auch sie setzen sich an die Nadeln, saugen hier und erzeugen gelbliche Flecken. Unter ihren dachförmigen Flügeln und öfters in Wolle eingebettet, verbergen sie schützend ihre wenig zahlreichen Eier (bis ca. 20). Aus diesen Eiern gehen nun die Geschlechtstiere, Männchen und Weibchen hervor, die V. Generation oder die Generation der Sexuales, die einzige gamogenetische Generation des Entwicklungszyklus. Sie verbleiben zunächst an den Nadeln, häuten sich unter den Flügeln der toten Mutter dreimal; Männchen und Weibchen sind ungeflügelt, etwas zwerghaft, das Männchen mit auffallend längeren Gliedmassen versehen. Sie bekommen im Gegensatz zu den anderen ungeflügelten Generationen viergliedrige Fühler. Nach der Begattung legt das Weibchen sein einziges, aber befruchtetes Ei ab, aus welchem noch in der Saison die Fundatrixlarve hervorkommt. Damit ist der Entwicklungszyklus geschlossen. Er ist zweijährig und enthält fünf Generationen: vier parthenogenetische und eine gamogenetische, drei sind ungeflügelt, zwei geflügelt. Die Generationen I und V leben nur auf der Fichte, II und IV auf der Fichte und auf der Zwischenkonifere, Generation III nur auf der Zwischenkonifere.

Nur eine *Chermes*-Spezies, *Ch. viridis* Ratz., zeigt nach unseren jetzigen Kenntnissen den soeben geschilderten Entwicklungszyklus in voller Strenge.

Die meisten Arten weichen dadurch ab, dass die III. Generation der Emigrans auf der Zwischenkonifere in bezug auf ihre Nachkommen sich spaltet. Gleichsam unschlüssig geworden, bleibt ein Teil der Nachkommen auf der Zwischenkonifere zurück, während der andere der Tradition treu gebliebene Teil zu den zur Fichte heimkehrenden Sexuparen sich entwickelt. Der im Exil auf der Zwischenkonifere verbleibende Teil, dem es hier offenbar besser zusagt, erzeugt eine Generation nach der

andern, alle mehr oder weniger ursprünglich sich gleichbleibend. Das sind die Generationen der Exules oder Exulantes, die sich als eine Parallelgeneration IIIa neben die Sexupare einschalten lassen.

Solche Exulantes sind es auch, welche uns bei *Ch. piceae* Ratz. fast ausschliesslich begegnen.

Unsere Beobachtungen lehren in dieser Beziehung, dass kein Teil der Tanne über der Erde von Angehörigen solcher Exulantes verschont bleibt. Die Bilder, welche uns diese Schmarotzer darbieten, sind äusserst verschiedenartig, besonders in der Saison. Im Winter verharren sie mehr oder weniger erstarrt, jedoch in verschiedenen Altersstadien, auch als Eier, an Knospen und Trieben und an der Rinde des Hauptstammes.

Im Frühjahr treffen wir sie vor allem auffällig an den Maitrieben. Schon in die schwellende Knospe dringen die den Eiern entschlüpften äusserst beweglich umherwandernden jungen Exules. saugen hier sich festsetzend an Trieb und Nadeln. Der Maitrieb wird dadurch um so empfindlicher im Wachstum gehemmt, je zarter der Zustand ist, in dem er befallen wurde. Da leidet nun ganz besonders die neuerdings so beliebte aus dem Osten stammende Nordmannstanne. Da sie später austreibt, als unsere im Westen heimische Tanne wird sie besonders massenhaft befallen. Denn um diese Zeit konnten sich die auf unserer frühtreibenden Edeltanne angesiedelten Läuse schon erheblich vermehren. Die überwinterten legreifen Exulans-Individuen, insbesondere an den Triebteilen der vor- und vorvorjährigen Zweige, erwachen mit dem Saftsteigen zu ungeheurer Fruchtbarkeit, wie die Eierhaufen auf unseren Präparaten und Zeichnungen kundgeben. Die Maitriebe der Weisstanne wachsen aber gleichfalls sehr früh, erstarken bald und leiden deshalb in der Regel wenig durch das Saugen der jungen Läuse. Allein die Triebe der Nordmannstanne spriessen erst erheblich später, und dadurch trifft sie das Heer der unterdessen ausgekommenen Jungläuse in dem allergünstigsten Zustande für seine Saugtätigkeit, im allernüchternsten Stadium für die Pflanze. Dicht gedrängt beginnen sie ihr Sauggeschäft, wenn die Trieb- und Nadelteile der auswachsenden Knospe noch gelblich und zart sind. Der Saftentzug macht den Trieb zwerghaft, der zarte Gewebezustand ermöglicht zugleich die Deformierung. Das Endresultat ist ein kurzer Trieb mit kurzen um-

gekräuselten Nadeln. Die Präparate und Bilder sprechen diese Missbildung aufs deutlichste aus. An derselben sind fast ausschliesslich die jungen ungehäuteten Läuse schuld, welche den Eiern der überwinterten Mutterläuse entstammen.

Dieser energischen Saugtätigkeit der Jungläuse folgt bald für die meisten ein Zustand der Lethargie. Mit der Erhärtung der Gewebe und der Verminderung der Saftintensität erschläft die Lebensenergie der Jungläuse, ihr Wachstum hört auf, sie verharren ungehäutet und sich gleichbleibend an der Triebachse festsitzend. Wir werden später auf dieses Vorkommnis zurückkommen.

Ein Teil der Jungläuse jedoch, an den Nadeln des Maitriebs, erfährt Wachstum und Weiterentwicklung, und zwar in zweifach verschiedener Weise.

Die einen, keine Wolle ausscheidend, werden nach dreimaliger Häutung zu Nymphen, nach einer vierten Häutung zu den geflügelten Sexuparen und verlassen wegfliegend die Pflanze.

Die anderen, mehr und mehr Wolle ausscheidend, werden nach dreimaliger rasch vollzogener Häutung zu Eierlegerinnen. Sowohl die Mutterläuse, als die wenig zahlreichen Eier sind in den schneeweissen kugeligen Wollhäufchen versteckt, die jetzt oft zahlreich auf der Unterseite der Tannennadeln zu finden sind. Ähnliche Wollklümpchen sind schon früher von Dreyfuss auf der Unterseite der Nadeln der kanadischen Tanne gesehen worden, die Urheberin wurde von diesem Autor *Ch. funitectus* genannt.

Ein weiteres oft sehr in die Augen fallendes Vorkommnis der Exulantes finden wir an der Rinde der Weisstannenstämmen. An solchen Stämmen, jüngeren wie älteren, kann die Rinde gleichmässig dicht, wie mit Schimmel überzogen erscheinen. Dieser Schimmel erweist sich als Wachswolle, ausgeschieden von den Mutterläusen, die in dicht gesäten Kolonien die Rinde bewohnen, in allen Alters- und Häutungsstadien, fast Laus an Laus nebeneinander sitzend.

Aber auch an der Rinde der Äste und Zweige finden wir Exulanten, ganz besonders an den vor- und vorvorjährigen Trieben, die, weniger Wolle ausscheidend, die grösste Fruchtbarkeit zu haben scheinen und aus deren Eiern alljährlich die Maitriebe besiedelt werden, wie diese Mutterläuse selbst aus den Triebläusen des Maitriebs nach Überwinterung hervorgehen.

Auch an den Knospen, in den Nadelachsen der Triebe und in der Knospenschuppenhülle des jungen Triebes können eierlegende Exulanten angetroffen werden.

Alle diese Exulans-Mütter entwickeln sich aus gleichen Larven, und das Experiment hat gezeigt, dass die verschiedenen Formen der Stammrinden-, Zweigrinden-, Nadel- und Knospen-Mutterläuse und ebenso die sexuparen Geflügelten aus den Eiern sich entwickeln, die im ersten Frühjahr von den Läusen am vorjährigen Triebe erzeugt worden sind. Aber ebenso können aus den Eiern der Nadelwollläuse Knospen- und Rinden-Mutterläuse hervorgehen.

Die einzelnen Formen der erwachsenen Mutterläuse sind aber keineswegs morphologisch identisch. In der Grösse und Gestalt und insbesondere in der Art und Ausdehnung der Chitinisierung und in dem Wachsdrüsenreichtum ihrer Haut zeigen sich erhebliche Unterschiede. Die an den Knospen sitzende Mutterlaus scheidet nur wenig Wolle aus, die Wachsdrüsenfelder ihrer Haut können fast vollständig verloren gehen, dafür entwickeln sich die Chitinplatten um so kräftiger und verdicken sich in der Mitte zu buckeligen Erhebungen, an denen noch die Skulptur der ehemaligen Drüsenfelder erkennbar ist.

In entgegengesetzter Richtung entwickeln sich einzelne der an alter Stammrinde lebenden Mutterläuse. Die Chitinisierung kann hier fast ganz verloren gehen, nur am Kopf und Prothorax bleiben verdickte Teile zurück, dafür verbleiben die Drüsenfelder, und die Wachsausscheidung nimmt eine besonders gesteigerte Intensität an.

Es liegt nahe, daran zu denken, dass in dem dichten Wollflaum der alten Stammrinde solche nahezu chitinlosen Formen gedeihen konnten, während an der Knospe eine kräftig chitinierte Form besseren Schutz fand. Die Nadelmutterlaus steht zwischen beiden Extremen, ist kräftig chitiniert, behält aber reiche Drüsenfelder und scheidet reichlich Wolle und besonders derbe Fäden ab, weshalb sie Dreyfuss *funitectus* genannt hat.

Obwohl die Extreme in hohem Grade verschieden sind, lassen sich doch Übergänge nachweisen, auch ist der gemeinsame Ursprung durch das Experiment der Zucht leicht festzustellen, so dass wir weder von verschiedenen Arten, noch von Abarten sprechen können. Es handelt sich lediglich um eine gewaltige Ver-

änderlichkeit der Form unter dem jeweiligen direkten Einfluss der Ernährungs- und Platzbedingungen, welche der Schmarotzer an der Wirtspflanze findet und denen sich die Larve im Laufe ihrer Häutungen anpasst. Dass aus den Eiern derselben Mutter bald die buckelige Knospenform, bald die drüsenreiche Rindenform hervorgehen kann, darf uns nicht mehr überraschen, als die Tatsache, dass ebenso bald geflügelte Sexuparen, bald flügellose Exulans-Mütter den Eiern derselben Mutter entpriessen können. In letzterem Fall ist die morphologische Differenz noch eine ungleich grössere.

Unter den mannigfaltigen Vorkommnissen, welche die Exulans-Generation der *Chermes piceae* Ratz. darbieten, scheint mir eines von besonderem Interesse: ich meine die Beharrung der am Stammteil des Maitriebs angesiedelten Jungläuse im ersten Stadium durch die ganze Saison hindurch. Diese Beobachtungstatsache konnte eigentlich erst durch das Experiment der Zucht sicher festgestellt werden, da an der Zuchtpflanze allein jeder Zuzug abgeschlossen werden konnte. Solche Versuchspflanzen, die im Frühjahr mit einigen eierlegenden Stammmüttern versehen wurden, zeigten nach wenigen Tagen ihre Triebe, und zwar besonders die heurigen und die vorjährigen zum Teil von Jungläusen besetzt, welche sich festsaugten und im Zustande des ersten Larvenstadiums die ganze Saison hindurch verblieben.

Wir werden am Schlusse nochmals auf dieses Vorkommnis zurückkommen.

Aus der Exulans-Generation entwickelt *Ch. piceae* auch, scheint's alljährlich, die Sexupara-Generation. Auch diese Tatsache lässt sich durch das Jahre hindurch fortgesetzte Experiment erhärten. Niemals fand ein Zuflug von *Migrantes alatae* statt, der Emigrans-Individuen geliefert hätte.

Auch Eckstein* hatte schon an der Unterseite der Nadeln Nymphen und Geflügelte gefunden, die nach seiner Darstellung nur Sexuparae gewesen sein können. Mir ist es nun gelungen, die Rückkehr der sexuparen Geflügelten auf die Fichte sowohl im Freien** zu konstatieren, als auch deren Übersiedelung

* Zeitschr. f. Forst- u. Jagdw. XXII. 1890.

** In einem Hausgärtchen, in welchem ich zwischen den stark von Läusen besetzten Tannen einige Fichten gepflanzt hatte.

experimentell zu stande zu bringen. Wie bei allen *Chermes*-Arten setzen sich die Sexuparen an die Nadeln, saugen sich fest, legen alsbald die wenig zahlreichen Eier unter ihren dachförmig zusammengelegten Flügeln ab und gehen dann zu grunde. Die Wollabscheidung ist bei *piceae* nur eine spärliche.

Auch die aus den Eiern erwachsende Generation der Sexuales konnte ich sowohl künstlich erziehen als im Freien feststellen. Männchen und Weibchen konzentrierten sich gern an der Spitze des Triebs, häuteten sich auch zum Teil dreimal bis zum letzten Stadium der viergliedrigen Fühler. Nur einmal fand sich jedoch ein Weibchen mit nahezu ausgereiftem grossem Ei. Niemals jedoch konnte ich eine Begattung beobachten, niemals fand ich ein abgelegtes Ei, niemals eine entschlüpfte Fundatrix. Die Generationen der Fundatrix, der *Migrantes alatae* und damit auch der Emigrans, sind auch mir unbekannt geblieben, ebenso das Erzeugnis der Fundatrix, die *piceae*-Galle an der Fichte.

Bei der ungemeinen Häufigkeit der Exulans-Formen dieser Species, insbesondere in einzelnen Jahren und in Anbetracht der leichten Feststellung der Gallen und bei der auf eine solche Feststellung verwendeten Mühewaltung von seiten verschiedener *Chermes*-Forscher kann wohl ausgesprochen werden, dass die *piceae*-Galle in Mitteldeutschland aller Wahrscheinlichkeit nach fehlt, wie ja auch in diesem Gebiet die Galle der gleichfalls auf die Tanne emigrierenden *Ch. Coccineus* Chol. trotz alles Suchens nicht gefunden werden konnte, während sie im Nordosten Europas nach Cholodkovsky vorkommt.

Wie werden auf das Fehlen der oben genannten drei Generationen in dem Entwicklungszyklus von *Chermes piceae* noch später zurückkommen.

Chermes piceae Ratz. ist durchaus nicht auf die Weisstanne beschränkt. Wie schon oben erwähnt wurde, gedeiht sie ganz besonders gut auf der Nordmannstanne und erreicht hier auch grössere Dimensionen des Körpers. Eckstein * hat das Vorkommen einer *Chermes* auf der Nordmannstanne beschrieben und eine neue Species *Ch. nordmannianae* aufgestellt, ohne diagnostische Charaktere für seine neue Species anzuführen. Eine

* l. c.

solche Species ist hinfällig, da sich mit Leichtigkeit *Ch. piceae* Ratz. auf die Nordmannstanne ansiedeln lässt und beide morphologisch völlig gleichartig sind. Infektionen mit Eiern, herüber und hinüber, führen stets zu legreifen Mutterläusen und weiterer Fortpflanzung. Auch auf *Ab. pichta* geht *Ch. piceae* über.

Über ihre Bedeutung darf wohl konstatiert werden, dass sie von allen Chermes-Arten die schädlichste ist. Die starke Besiedelung der Maitriebe hat bei der Nordmannstanne schon wiederholt nach jahrelangem Siechtum zum Absterben geführt. Wenn auch diese Tatsache zunächst nur für Garten- und Parkanlagen eine Bedeutung hat, so darf doch auch, wenigstens für die Zukunft, eine forstliche Bedeutung nicht ausser acht gelassen werden. Für die an älterer Weisstannennrinde schmarotzende Form der *Ch. piceae* Ratz., die einst (1843) Ratzeburg das Objekt für seine Namensgebung geliefert hat, ist die forstliche Bedeutung nicht gering, wie einzelne in der forstlichen Literatur verzeichnete Fälle zeigen.

Die befallenen Stämme kränkeln und fallen dann Borkenkäfern zum Opfer. Eine etwa 40jährige, von *Ch. piceae* befallene Tanne im hiesigen Schlossgarten habe ich jahrelang beobachtet. Sie hatte *Cherm. piceae* am Stamme, an den Zweigen und Knospen, sie kränkelte von Jahr zu Jahr mehr und ist dann vor etwa vier Jahren abgestorben.

Fragen wir uns nun: welche Stellung nimmt die von uns festgestellte Biologie der *Ch. piceae* Ratz. im Vergleich zu dem normalen fünfteiligen Cyklus ein? Wir konstatierten das Vorkommen der Generationen III a, IV und V, denn wir konnten den Nachweis erbringen, dass ausser der zahlreich variierenden parthenogenetischen Generation III a und der geschlechtsgebärenden Generation IV auch die gamogenetische Generation V vorkommt. Allein diese Generation scheint impotent geworden zu sein, Begattung und befruchtete Eier scheinen zu fehlen. Wenn diese durch die Beobachtungsdata bis zu hoher Wahrscheinlichkeit gestützte Annahme richtig ist, so wird uns auch verständlich, weshalb die Generation I, II und III und die *piceae*-Gallen fehlen. Der Schluss der Kette im normalen Entwicklungscyklus ist durch das Ausfallen des befruchteten Ei's unterbrochen worden, und damit sind die primären Fichtengenerationen der Species, die eigentlich typischen Generationen der Gattung

Chermes, die Fundatrix und die Gallengeneration der Geflügelten für *Ch. piceae* verloren gegangen.

Eine Erklärung dieser Erscheinungen im Sinne des Werdens erscheint nicht unmöglich.

Chermes piceae hat auf der Tanne ein überaus zusagendes Exil gefunden. Eine solche Annahme stützt sich besonders auf zwei Beobachtungsdaten:

Erstens ist die Fruchtbarkeit der Haupt-Exulans-Form an der Rinde der jungen Triebe eine ungeheure. Ich habe pro Weibchen 134 Eier gefunden, Eckstein * 110 bis 120. Diese Fruchtbarkeit steht derjenigen der wahren Fundatrix kaum nach. Es scheint darnach die aus der Zahl der Eiröhren bei den verschiedenen Chermes-Generationen abgeleitete Schlussfolgerung Cholodkovskys, * dass diese Zahl „bei den auf Zwischenpflanzen lebenden Generationen (Fundatrices spuriae, Sexuparae, Exules) im allgemeinen viel kleiner ist als bei den auf der Fichte saugenden Generationen“ für *Ch. piceae* nicht zuzutreffen, wie auch sein weiterer Satz, dass „die auf Zwischenpflanzen lebenden Generationen überhaupt aus kleinen Individuen bestehen“, auf *Ch. piceae* kaum angewendet werden kann. Freilich fehlen hier die auf der Fichte lebenden Generationen I und II zu einem Vergleich. Aber die absoluten Zahlen der Körpergrösse und Eierzahl lassen die Frühjahrszweigmutterlaus der *piceae*-Exulans einer wahren Fundatrix anderer Species kaum nachstehen.

Ein zweites Moment liegt in dem Formenreichtum der *piceae*-Exulanten. Keine andere *Chermes*-Exulans, deren Cyklus ein geschlossener zur Fichte zurückkehrender ist, weder an Tanne, noch an Lärche und Kiefer, zeigt auch nur annähernd eine solche Mannigfaltigkeit verschieden gestalteter und an verschiedenen Teilen der Wirtspflanze lebender Exulans-Formen. Nur *Ch. pini* Koch (und *strobi* Htg.), deren Cyklen noch unerforscht sind, zeigen ähnliche Mannigfaltigkeit. Nun unterliegt es aber kaum einem Zweifel, dass Arten, die unter sehr günstigen und mannigfaltigen Lebensbedingungen leben, auch besonders zur Variation neigen, in ihrer Formgestaltung gleichsam erfinderisch, schöpferisch und ausgiebig werden. So sehen wir an der Tanne

* Über den Lebenscyklus der *Chermes*-Arten. Biol. Zentralbl. Bd. XX. J. 1900, p. 276 u. 277.

die Rinden-, Nadel- und Knospenformen der *piceae*-Exulans durch die Gunst der Verhältnisse, welche diese Wirtspflanze ihrem Schmarotzer darbietet, entstehen.

Zugleich lässt eine solche Mannigfaltigkeit in der Formgestaltung einer Art auf den Prozess des Werdens schliessen, *Ch. piceae* ist eine auf der Tanne üppig gedeihende werdende Art. Wir müssen nun zugeben, dass dieser Werdeprozess unter neuen Lebensbedingungen nicht ohne Folgen für die Konstitution der Parasiten vor sich gegangen sein konnte. Eine Anpassung an neue Lebensbedingungen hat mehr und mehr eine Verminderung der Tauglichkeit für die früheren zur Folge. Aber die Macht der Vererbung erhält noch lange Zeit das gesetzmässig gewordene Herkommen des früheren Lebens fest. So sehen wir noch heute, vielleicht alljährlich, vielleicht in einzelnen Jahren nicht mehr, im Frühjahr sexupare Individuen aus Exulanten entstehen, welche der Rückkehr zur Fichte und der Entstehung von Geschlechtstieren dienen.

Aber unter normalen Verhältnissen werden die Sexuparen von Emigranten geboren, das heisst von direkten Nachkommen der frisch von der Fichte zur Tanne herübergekommenen *Migrantes alatae*. Bei *Ch. piceae* aber entstehen die Sexuparen von Exules, welche Generationen hindurch auf der Tanne gelebt und konstitutionell mehr und mehr verändert worden sind. Darf es uns da wundern, wenn auch die Sexuparen nicht mehr die gleichen geblieben sind und ebenso die von ihnen gezeugten Sexuales? Das frische Blut der *Migrantes alatae*, welches gleichsam die Tradition von der Fichte bringt und konserviert, ist für *Ch. piceae* nach und nach verloren gegangen, in der Masse, als die Geschlechtsgeneration durch Veränderungen der Sexuparen in ihrer Funktion, befruchtete Eier zu erzeugen, geschwächt worden war. Dieser Ausfall musste die Umbildung der *Ch. piceae* zu einer spezifischen Tannenspecies beschleunigen und vollenden. Dass noch heute die Sexuparae und Sexuales gezeugt werden, ist durch die konservative Macht der Vererbungskraft zu erklären, in ähnlicher Weise, wie bei rudimentären Organen.

In der Tat dürfen wir sagen, dass bei *Ch. piceae* durch Zurückbildung jener beiden Generationen die Sexualität rudimentär und impotent geworden und die Species zur rein

parthenogenetischen Fortpflanzung übergegangen zu sein scheint.

Eine rein parthenogenetisch sich fortpflanzende Species ist immer noch für unsere überbrachte Schulmeinung ein wahres Monstrum. Ich muss gestehen, dass ich mich selbst gegen eine solche Annahme lange gesträubt habe. Ich habe selbst bei drei verschiedenen Pflanzenlausfamilien für je eine Gattung, beziehungsweise Species, für die Gattungen *Mindarus*, *Holzneria* und gerade für *Chermes piceae* die Geschlechtsgenerationen nachgewiesen, welche vordem unbekannt waren, und es lag mir daher der Gedanke nahe, dass bei *Ch. piceae* die gamogenetische Generation vielleicht nur örtlich unwirksam geworden sei. Ich war für die *Chermes*-Arten immer geneigt, die rein parthenogenetischen Cyklen für örtlich beschränkte zu halten, in dem Sinne, wie bei *Psyche helix* Sieb., welche sich bei uns rein parthenogenetisch, südlich der Alpen aber gamogenetisch fortpflanzt. Eine solche Auffassung habe ich auch 1897 in einem Referat der Arbeiten Cholodkovskys vertreten, in dem Sinne, dass die im höheren Norden lebenden *Chermes*-Arten zu lokaler reiner Parthenogenese hinneigen. Allein die Beobachtungen unserer im südwestlichen Deutschland in einem für die Weisstanne besonders günstigen Gebiet lebenden *Ch. piceae* lassen sich mit einer solchen Auffassung umso weniger vereinbaren, als die unserem *Ch. piceae* nächst verwandte *Ch. coccineus* Chol. in den russisch-sibirischen Wäldern gamogenetisch lebt. Ich muss mich deshalb jetzt zu der Annahme entschliessen, dass *Ch. piceae* aller Wahrscheinlichkeit nach eine rein parthenogenetisch sich fortpflanzende Species geworden ist, obgleich ich die gamogenetische Generation dieser Species nachweisen konnte. Dieses Vorkommen gewinnt ein besonderes Interesse dadurch, dass die Entstehung einer reinen Parthenogenese durch Rückbildung der zur Sexualität führenden Generationen wahrscheinlich gemacht werden konnte. Cholodkovsky hat in einer neueren Publikation * zahlreiche Fälle aus zoologischem und botanischem Gebiete aufgeführt, in welchen aller Wahrscheinlichkeit nach rein parthenogenetische Fortpflanzung für die Species besteht. Dieser Autor hat auch mit Recht hervorgehoben, dass

* Biol. Zentralbl. Bd. XX. J. 1900, p. 274 u. f.

wir nur durch die Macht der Gewohnheit die reine Parthenogenese für unverständlich zu halten geneigt sind und dass uns die gamogenetische Fortpflanzung nur deshalb verständlich erscheine, weil sie die gewöhnliche Fortpflanzungsart ist. Weismann * hat sich besonders gegen die herrschende Vorstellung ausgesprochen, dass die geschlechtliche Befruchtung ein Leben-erweckender oder Leben-erneuernder Vorgang sei. Weismann hebt hervor, dass es Arten gibt, die sich heute nur noch parthenogenetisch fortpflanzen. Er selbst hat den Süßwasserkrebs *Cypris reptans* während 16 Jahren in etwa 80 Generationen hindurch gezüchtet, ohne je Männchen gefunden oder in der Samentasche der Weibchen Zoospermien gesehen zu haben.

Cholodkovsky hat für eine Reihe von *Chermes*-Arten gezeigt, dass neben dem normalen fünfteiligen Cyklus auch vereinfachte Cyklen mit nur parthenogenetischen Generationen bestehen. So bestehen neben *Ch. strobilobius* Kalt. die sehr nahestehenden *Ch. praecox* Chol. und *Ch. tardus* Dreyf., neben *Ch. viridis* Ratz. die ebenfalls nahestehenden *Ch. abietis* Kalt. und *Ch. viridanus* Chol. Die *Ch. praecox*, *tardus* und *abietis* Kalt. zeigen nur noch die Generationen I und II, indem aus der *Migrans alata* direkt wieder die Fundatrix entsteht und der Cyklus dadurch in einem Jahre unter reiner Parthenogenese vollendet wird; *Ch. viridanus* hat sogar nur eine einzige parthenogenetische Generation. Die *Ch. praecox*, *tardus* und *abietis* Kalt. stehen morphologisch ihren Zugehörigen von dem fünfteiligen Cyklus so nahe, dass sie früher nur als Parallelgenerationen einer und derselben Species aufgefasst wurden. Es ist das Verdienst Cholodkovskys, nachgewiesen zu haben, dass für die Formen der vereinfachten Cyklen auch morphologische Unterschiede bestehen und dass ihre Cyklen vollständig selbständig geworden sind, so dass sie als besondere rein parthenogenetische Arten oder Varietäten aufgefasst werden müssen, welche aber im Gegensatz zu *Ch. piceae* auf der Fichte geblieben sind. Nur *Ch. viridanus* Chol. ist eine rein parthenogenetische Form der Zwischenpflanze geworden, und zwar der Lärche.

Ich möchte nun Ihre Aufmerksamkeit zum Schlusse nochmals auf eine schon mehrfach berührte Beobachtung zurücklenken, nämlich auf das Vorkommen der die ganze Saison hindurch

* Vorträge zur Descendenztheorie. 1902. I., p. 358 u. 59.

im ersten Larvenstadium beharrenden, an den Achsen der Mai-triebe und zum Teil auch der vorjährigen Triebe festgesaugten Jungläuse. Dieses Beharren im gleichen Häutungsstadium von Mai bis April ist ein höchst merkwürdiges Vorkommnis, wenn wir an die in zwei bis drei Wochen mit drei oder gar vier Häutungen vollendete Entwicklung der Nadel-Wollläuse und Sexuparen denken. Wenn uns auch durch Veränderungen der Saftzustände im allmählich verholzenden Triebe eine Erklärung für das Aufhören des Wachstums und der Häutungen nahegelegt wird, so verbleibt uns doch noch die Frage nach der Bedeutung einer solchen „larvalen Beharrungsform“ auf dem ersten Stadium der Exulans.

Es liegt nahe, hierbei an die rein parthenogenetische Fortpflanzungsweise unserer *Chermes*-Art zu denken und sich die Frage zu stellen, ob in dem Vorkommnis einer larvalen Beharrungsform vielleicht ein Ersatz für die Vorteile, die aus der Geschlechtsvermischung bei der amphigonen Fortpflanzung resultieren, gefunden werden kann. Zugleich muss uns die starke Tendenz der Exulans-Generation von *Ch. piceae* nach mannigfaltiger Variation in der Formgestaltung in Erinnerung kommen.

Die Bedeutung einer zweigeschlechtlichen Fortpflanzung liegt vor allem in dem Ausgleich der verschiedenen Charaktere der Gatten im Sinne der Herstellung eines mittleren Durchschnitts bei den Nachkommen, in der Erhaltung eines mittleren Typs der Art, in dem konservativ wirkenden Gegengewicht gegenüber der Variation. Auch Weismann,* der in der Amphimixis in erster Linie ein Mittel zur Erhöhung der Anpassungsfähigkeit der Organismen an die Lebensbedingungen erblickt, anerkennt doch auch die Bedeutung derselben, durch die stete Kreuzung der Individuen eine allmählich sich steigernde Konstanz der Arten herbeizuführen. Kann nun eine solche Rolle auch der larvalen Beharrungsform zugewiesen werden? Wenn wir bedenken, dass eine solche Larve ein volles Jahr sich gleich bleibt, dabei ihre Charaktere erhält und festigt, um solche, im folgenden Frühjahr geschlechtsreif geworden, auf ihre Nachkommen unverändert zu übertragen, auf Nachkommen, die zum Teil wiederum wie die Mutter in der Beharrungsform verbleiben, so scheint die

* Vorträge zur Descendenztheorie. 1902. II., p. 228 u. 229.

Auffassung sehr berechtigt, dass einer solchen, von Generation zu Generation fortlaufenden larvalen Beharrungsform, welche ihr Keimplasma unbeeinflusst bewahrt, sehr wohl die Bedeutung eines konservativ wirkenden Faktors, gleichsam eines morphologischen Ruhepunktes inmitten der wilden Variation und der rasch auf einander folgenden rein parthenogenetischen Propagationscyklen zugesprochen werden kann.

Aber noch eine andere Bedeutung liegt für eine solche larvale Beharrungsform nahe. Es ist wiederholt beobachtet worden, dass ruhelos fortgesetzte parthenogenetische Fortpflanzung mit einer allmählichen Schwächung und Erschöpfung der Fortpflanzungskraft verbunden ist. Insbesondere hat Balbiani* eine progressive Verminderung der Eiröhrenzahl in den Nachsommer- und Herbstgenerationen der Reblaus beschrieben und daraus sogar den Schluss auf eine „sterilité finale“ der ausschliesslich parthenogenetisch sich fortpflanzenden Generationen gezogen. Auch Cholodkovsky** hat gezeigt, dass bei den ausschliesslich parthenogenetisch sich fortpflanzenden Exulans-Generationen seiner *Ch. sibiricus*, die späteren Generationen immer kleiner werden, infolge dessen sie auch weniger Eier legen. Auch ich*** habe für die Wurzellaus der Tanne nachgewiesen, dass deren Fruchtbarkeit im Herbst stark abgenommen hat.

Nun haben wir aber oben gesehen, dass tatsächlich aus der ein Jahr lang im ersten Larvenstadium verharrenden Junglaus der heurigen Triebe im folgenden Frühjahr eine mit ausserordentlicher Fruchtbarkeit gesegnete Mutterlaus hervorgeht. Wenn nun auch in den Saftverhältnissen der Pflanzenteile im Frühjahr ein wichtiger kausaler Faktor für die Steigerung der Fruchtbarkeit erblickt werden muss, so darf doch auf der anderen Seite auch der langen Ruhepause während der Verharrung im ersten Larvenstadium eine günstige Wirkung im Sinne der Erhaltung, ja sogar der Steigerung der Fruchtbarkeit zugesprochen werden.

Die Biologie der *Chermes piceae* Ratz. hat uns, wie wir im Laufe unserer Darstellung gesehen haben, Veranlassung ge-

* Le phylloxera etc. Institut de France, Académie des Sciences. Observations sur le phylloxera. IV. 1884.

** Beiträge zu einer Monographie der Coniferenläuse. I. Teil. Chermesarten. 1. Heft. 1895.

*** Allgem. Forst- u. Jagdzeitung. 75. Jahrg. 1899, p. 406.

boten, eine Reihe allgemeiner Betrachtungen anzustellen und Erklärung für die aufgeworfenen Fragen zu versuchen.

Wir haben den Ausfall der wichtigsten Fichtengenerationen bei dieser Species aus der Schwächung und Rückbildung der zum befruchteten Ei führenden Generationen und diese Schwächung wieder aus dem auffälligen Gedeihen der exules auf der Tanne und der daraus resultierenden konstitutionellen Veränderung derselben wahrscheinlich zu machen gesucht. Wir sind durch diese Betrachtungen zur Annahme einer ausschliesslich parthenogenetischen Fortpflanzung der *Ch. piceae* gelangt und haben zuletzt in dem Auftreten einer larvalen Beharrungsform einen Ersatz für Vorteile amphigoner Fortpflanzung im Sinne der Bewahrung des Typs der Species und der Erhaltung ihrer Fruchtbarkeit zu finden gesucht.

Ob diese Schlussfolgerungen und Erklärungsversuche in allen Punkten das Richtige treffen, kann erst die erweiterte Forschung und Kritik der Zukunft lehren.

Die Erdbeben in Baden im Jahre 1901.

Von M. Reichmann,
Lehramtspraktikant in Karlsruhe.

Im Jahre 1901 sind zwei grössere Erdbeben in Baden wahrgenommen worden; das eine fand statt am 24. März, das andere am 22. Mai. Beide betrafen Oberbaden nebst Teilen der angrenzenden Nordschweiz.

Erdbeben am 24. März.

Werden die Beobachtungen einer Erderschütterung einer eingehenden Erörterung unterzogen, so müssen hauptsächlich die Erdbebenelemente, d. h. die Feststellung der Eintrittszeit und Dauer der Erschütterung, ihrer Intensität, Richtung und Wirkung ins Auge gefasst werden.

Eintrittszeit. Was zunächst die Ermittlung des genauen Zeitpunktes des Eintretens der Erschütterung betrifft, so stösst man hier auf nicht unbeträchtliche Schwierigkeiten. Es macht sich eben der Mangel an empfindlichen Instrumenten, Seismometern, geltend. Die Beobachtungen sind rein subjektiver Natur und müssen deswegen mit grosser Vorsicht aufgenommen, gegenseitig verglichen und auf ihre Richtigkeit und Genauigkeit jeweils geprüft werden, um ein möglichst genaues Bild von der Erbebenerscheinung zu erhalten. Dabei muss sich der Bearbeiter eines Bebens selbst auch der grössten Objektivität befleissigen und sich vor allem davor hüten, mit einer vorgefassten Meinung bezüglich des Ortes der Entstehung und Ursache des Erdbebens an die Durcharbeitung des eingegangenen Materials heranzugehen. In der grössten Anzahl der eingelaufenen Berichte sind nun Angaben über die Eintrittszeit gemacht worden; aber sehr viele müssen als nur „ungefähr“ bezeichnet und deshalb wertlos ausser Acht gelassen werden, andere wieder, wie der Bericht von Inzlingen 4^h 10', Norsingen-Waldshut, können, da sie so beträchtlich von der mittleren Zeitangabe abweichen, unmöglich richtig sein, und

nur wenige, ganz genau fixierte Angaben können einer weiteren Diskussion unterworfen werden. Wie widersprechend und für eine Ermittlung der genauen Zeit des Eintretens der Erschütterung die Angaben oft sind, möge folgendes beweisen. Aus Lörrach sind im ganzen sechs Berichte eingegangen; von ihnen geben drei die Zeit $4^h 15'$, einer zwischen $4^h 15'$ bis $4^h 30'$, einer $4^h 25' 30''$, der letzte $4^h 26'$. Selbst die Berichte, welche Anspruch auf Genauigkeit erheben, sei es nun, dass direkt vor oder nach der Erscheinung auf die Uhr, die richtig gehe, geschaut wurde, oder dass die Uhr infolge des Stosses wie in Muttens stehen blieb, weichen noch um 6' Minuten von einander ab. Die Berichte letzterer Art seien kurz angeführt:

Albbruck	$4^h 23'$	(nach dem Stoss)
Steinen	$4^h 26'$	(nach Postzeit)
Zell	$4^h 21'$	(nach Postzeit)
Atzenbach	$4^h 20'$	(nach Postzeit)
Sulzburg	$4^h 23' 22''$	(nach Postzeit)
Staufen	$4^h 25'$	(nach Bahnzeit)
St. Peter	$4^h 20'$	(nach Postzeit)
Basel u. Muttens	$4^h 22'$	

Zwischen den einander sehr nahe liegenden Orten Steinen und Zell eine Differenz von 5', zwischen den entfernteren St. Peter und Zell keine Differenz! Aus alledem folgt, dass eine wissenschaftlich genaue Zeitangabe sich nicht machen lässt. Als Basis für weitere Untersuchungen über die Geschwindigkeit der Fortpflanzung der Erdbebenwellen oder zur Ermittlung des Herdes erweisen sich die Zeitangaben als unbrauchbar. Man kann höchstens den Schluss ziehen, dass die Eintrittszeit zwischen $4^h 20'$ und $4^h 26'$ a. m. liegen muss.

Dauer der Erschütterung. Ueber die Dauer des Bebens liegt gleichfalls eine Reihe von Beobachtungen vor; aber auch hier gilt das oben Gesagte; sie schwanken ausserordentlich, da auch sie nur auf Schätzung beruhen. Eine Anzahl von Berichten wie Fröhd $3'$, Gersbach $1'$ kommen nicht in Betracht; auch Angaben von $1'$ oder $30''$ sind wohl viel zu hoch geschätzt. Werden die ungenauen und unmöglich richtig sein könnenden, wozu ich alle zähle, welche eine Dauer von $30''$ und darüber angeben, beiseite gelassen, so bleiben für eine weitere Besprechung

noch 83 Beobachtungen übrig. Davon geben 5 eine Dauer unter 2" an. Es sind die Berichte aus:

Albert-Hauenstein	1"
Kandern	1—1,5"
Lörrach	1"
Maulburg	1"
Wiechs	1,5".
9 eine Dauer über 10" und zwar:	
Albbruck	15"
Badenweiler	20"
Langenau	11—13"
Müllheim	25"
Niederhof	15—20"
Oberweiler	22"
Thiengen	10—15" resp. 10—12"
Mambach	11".

Die Angaben unter 2" stehen zum Teil im Widerspruch mit Berichten aus dem gleichen Ort wie in Lörrach mit zwei Berichten von 2", ebenso der Bericht von Maulburg mit einem von 8—10". Die Berichte von Albert-Hauenstein und Albbruck können auch nicht richtig sein; denn es ist nicht denkbar, dass bei der geringen Entfernung der Orte in der Dauer eine Aenderung von 14" hätte stattfinden können. Die weit überwiegende Mehrzahl der Beobachter gibt die Dauer zwischen 2—10" an, davon wieder die meisten 2—3". Wenn man nun bedenkt, dass die Angaben nur auf Schätzung beruhen, und wie leicht man sich bei so kurzen Zeiträumen überschätzt, so dürfte man mit der Annahme, das Beben habe 2—3" gedauert, der Wahrheit ziemlich nahe kommen. Die Annahme findet noch eine Stütze darin, dass sie ziemlich gleichmässig über das ganze Gebiet verteilt ist.

Auch über die Dauer der einzelnen Stösse sind mehrere Berichte gemacht worden; in weit überwiegender Mehrzahl wird eine Sekunde als Dauer des Stosses gemeldet.

Verbreitungsgebiet. Das zusammenhängende Schüttergebiet umfasst so ziemlich den südlichen Schwarzwald nebst Teilen der nordwestlichen Schweiz. Die Westgrenze fällt annähernd mit der Verwerfungsspalte, welche die diluvialen Schottermassen des Rheintales von der mesozoischen und tertiären Vorbergszone des Schwarzwaldmassives trennt, zusammen und verläuft über Auggen-

Eschbach-Freiburg. Positive Nachrichten aus Orten der Rheintalebene liegen nicht vor. Ganz isoliert vom eigentlichen Erschütterungsgebiet ist Mülhausen i. E., wo nach Bericht der Badischen Presse morgens gegen 4 Uhr ein Erdbeben verspürt wurde.

Nach Norden ist das Schüttergebiet durch das Glottertal abgegrenzt; gegen Osten sind die äusserst gelegenen Orte, die betroffen wurden, Vöhrenbach, Neustadt-Kappel-Thiengen. Der südlichste Ort dürfte Flumenthal bei Solothurn sein, wo im Schulhause ein Blumentopf, der von der Decke des Zimmers an einem dreiteiligen Faden herabhing, in Schwingung gesetzt und ein Faden abgerissen wurde. Ob das Beben bis an die Gestade des Genfersees, wie man aus Lausanne meldet, sich fortpflanzte, ist höchst unwahrscheinlich. Ueberblickt man das gesamte Erschütterungsgebiet, so erkennt man, dass es ungefähr die Gestalt einer Ellipse hat, deren längerer Durchmesser NO-SW läuft, deren kürzerer NW-SO, wie aus beigelegter Karte zu ersehen ist.

Art der Bewegung. Die Art der Erschütterung wird sehr verschiedenartig angegeben. Bald als ein Stoss, ein Ruck, bald als ein oder mehrere Stösse, verbunden mit wellenförmiger Bewegung des Bodens, bald nur als einfach schwankende Bewegung, als ein Zittern des Untergrundes. Dabei sind die Angaben ziemlich regellos über das ganze Gebiet zerstreut; sehr oft widersprechen sich die Angaben aus dem gleichen Ort. Dagegen liegen aus Lörrach übereinstimmende und bestimmt lautende Angaben vor. Sämtliche fünf Berichterstatter aus Lörrach sprechen von einem Stosse mit Erschütterung, als ob ein schwerer Gegenstand auf den Fussboden gefallen wäre begleitet von einem windstossartigen Geräusch. Nach dem Berichte des Herrn Dr. Grether erfolgte der Stoss in vertikaler Richtung von unten. Auch von dem Beobachter aus Inzlingen, das nahe bei Lörrach liegt, wird die Erschütterung geschildert als „ein Stoss ähnlich dem Fallen eines schweren Gegenstandes mit Getöse“. Die Leute in Kandern verspürten einen einzigen Stoss ohne wellenförmige Bewegung. Im ganzen wurden aus 22 Ortschaften Berichte eingeschickt, in denen die Erschütterung als ein kurzer Stoss oder Ruck bezeichnet ist. Aus 28 Orten liegen Berichte vor, in denen die Beobachter die Bewegung eine wellenförmige nennen verbunden mit einem oder mehreren, meist zwei Stössen. Eine genau detaillierte Beschreibung dieser Art der Bewegung hat in dankenswerter Weise Herr

Professor A. Hauser aus Staufen gegeben. Er schreibt: „Ich lag wachend im Bett im zweiten Stock. Im Zimmer unter mir (verschlossen und unbewohnt) erfolgten im Abstand von $\frac{3}{4}$ Sekunden zwei starke Stösse, als ob zwei schwere Säcke auf den Boden geworfen würden.“ Wo zwei Stösse beobachtet wurden, ist zum Teil auch Aufschluss darüber gegeben, welcher von den beiden der stärkere war. So meldet man aus Müllheim, dass der zweite Stoss weit heftiger war wie der erste, ebenso aus Todtnauberg, Waldshut, Kleinthal und Wiechs; in Oberweiler soll der erste stark, der zweite schwach gewesen sein. In Mambach, Fröhd, Furtwangen wurde nur ein Stoss mit Wellenbewegung verspürt; dabei ging in Häg, Fröhd, Furtwangen, Untermünsterthal der Stoss dem Zittern des Bodens voraus; in Klein-Herrischwand lag der Stoss in der Mitte, ebenso in Wisleth; von da schreibt man von leisem Zittern, dem ein Stoss folgte und mit rollenartigem Geräusch endigte. Es war, als ob die Wohnung auf Rollen fortbewegt würde und plötzlich über einen Stein ging. In Schopfheim, Sulzburg wird die Bewegung übereinstimmend als wellenförmiges Rollen bezeichnet, dem ein heftiger Stoss folgte. Aus 23 Orten liegen Beobachtungen vor, in welchen die Erschütterung als Wellenbewegung oder Zittern des Bodens verzeichnet ist. Es lautet der Bericht aus Aichen: Wellenförmige Bewegung des Bodens. Der Boden zitterte bemerklich. Herr Hauptlehrer Hep-ting aus Eschbach spricht von „Auf- und abwärtsggehendem Rütteln mit nachfolgendem donnerähnlichem Geräusch“. Die Bericht-erstatte in Fischbach und Kappel hatten den Eindruck einer rollenartigen Erschütterung, wie wenn eine grosse Masse Schnee vom Dache fällt. Sehr oft wird die Erschütterung verglichen mit der, welche das Vorbeifahren eines schwerbeladenen Fuhrwerkes auf gefrorenem Boden, oder einer Schnellzugslokomotive, der Gang einer schweren Maschine, oder das heftige Zuschlagen einer Tür in einem leicht gebauten Hause verursacht.

Richtung der Bewegung. Bei dem Versuche einer genauen Bestimmung der Richtung der Stösse und der Fortpflanzungsrichtung der Erdbebenwelle und dem Versuche aus diesen Daten den Erdbebenherd zu ermitteln, stehen nicht minder wie bei der Ermittlung der Eintrittszeit Schwierigkeiten entgegen. Da Erdbebenapparate im betroffenen Gebiet nicht vorhanden sind, die Angaben nur auf subjektivem Empfinden beruhen, weil ein Ver-

schieben von Gegenständen, wonach die Fortpflanzungsrichtung hätte bestimmt werden können, nur selten stattfand, so müssen die trotzdem gezogenen Schlüsse mit grosser Vorsicht aufgenommen werden. Wirft man einen Blick auf beigefügtes Kärtchen, in welchem die Fortpflanzungsrichtungen eingezeichnet sind, so scheinen letztere ziemlich regellos im ganzen Gebiet orientiert zu sein; bei längerem Betrachten der Richtungen jedoch lassen sich aus dem Wirrwar gewisse Richtungen herausfinden, welche vorherrschen und nach den Richtungen der Windrose um einen Punkt im unteren Wiesental sich anordnen.

Oestlich vom Wiesental herrscht die Richtung West—Ost vor; ich nenne Adelhausen, Dossenbach, Gersbach, Herrischried, Alpfen, Aichen, Thiengen, Waldshut; gegen Süden längs des Rheines hat man vorherrschend die Richtung S—N, Grenzach—Riehen, Minseln, Rheinfelden, Brennet—Albbruck; Muttens—Basel zeigen die Richtung SW—NO. Westlich vom Wiesental scheinen die Vorwerfungsspalten nicht ohne Einfluss auf die Fortpflanzungsrichtung gewesen zu sein; denn längs der Rheintalspalte findet man die Richtung N—S Kandern—Badenweiler—Staufen—Eschbach; nach Nordwesten geht die Richtung über in NW—SO Müllheim—Sulzburg—Münsterthal; nach Nord die Richtung N—S Wiesleth—Schönau, Todtmoos, gegen NO die Richtung SW—NO Todtnau—Bernau—St. Blasien. Im Wiesental selbst liegen die Richtungen äusserst verschieden. Wie man sieht, ergibt sich eine konvergent strahlige Anordnung um das untere Wiesental. Auf folgenden Kreis möge noch hingewiesen werden: Basel—Grenzach—Rheinfelden, Dossenbach, Steinen; nach aussen schliesst sich daran ein zweiter Kreis, nämlich Muttens, Rheinfelden, Waldshut—Thiengen, Aichen, St. Blasien, Menzenschwand, Todtnau—Schönau, Sulzburg. Die oben hervorgehobene Anordnung der Fortpflanzungsrichtungen der Erdbebenwelle stimmen nun genau mit den Angaben über die Art der Bewegung überein, insofern das Beben in Lörrach—Inzlingen als succussorischer Stoss sich äusserte. Demnach muss in der Gegend von Lörrach das Epicentrum des Bebens gelegen sein, von wo es sich allseitig ausbreitete.

Wirkungen der Bodenbewegung. Die Wirkungen der Erschütterung waren im allgemeinen geringe. Nach der von Futterer* abgeänderten Forelschen Erdbebenskala lassen sich die

* Erdbeben vom 22. Jan. 13. Bd. d. Verhandl. des Naturw. Ver. S. 10.

vom Erdbeben betroffenen Orte in drei Gruppen einteilen. In den Orten stärkster Erschütterung, Gruppe eins, erreichte das Beben den Intensitätsgrad 3, d. h. mittelstarke Erschütterung, fähig, leicht bewegliche Gegenstände zu verschieben. Zu dieser Gruppe gehören hauptsächlich die Orte im Wiesental, längs der Rheintalspalte und im Münstertal. Die Badische Landpost schreibt unter „Wiesental“ „die Fenster klirrten, Möbel wankten, Kinder erwachten und weinten“. Der Polizeiwachtmeister in Lörrach berichtet, dass Hausgeräte, wie Betten, Tische schwankten, der Lampenschirm einer Stehlampe auf die Seite geschoben, zugemachte Stubentüren aufgerissen wurden. Oberbauinspektor Baum aus Lörrach gibt an, dass die Gläser klirrend aneinander stiessen. Gleiches wird aus Inzlingen gemeldet. In Degerfelden, Dossenbach, Eichsel, Minseln erzitterten die Häuser und Gegenstände rüttelten; in Herthen geriet ein eiserner Ofen ins Wanken, im Gasthaus zum Adler in Adelhausen fielen die Kleider vom Sessel und ein Apparat begann zu läuten. Den gleichen Intensitätsgrad hatte das Beben in Maulburg, Schopfheim, wo der Wecker des Herrn Ratz drei Minuten in einem fort rasselte, in Fahrnau, Hausen, Zell, Mambach. In Schopfheim wurde Holz, das auf dem Speicher eines massiv gebauten Hauses aufgestapelt war, zum Teil umgeworfen. Aeltere Personen behaupteten, dass dieses Erdbeben das stärkste war, das sie je erlebt haben. Auch in Kandern war die Erschütterung eine verhältnismässig heftige. Es knarrten die Türen; der Krug auf dem Waschtisch klirrte, die Menschen erwachten aus dem Schlafe, einzelne riefen um Hilfe. Etwas gemildert war das Toben im Badenweilertal; in Badenweiler klirrten die Fenster, in Oberweiler schlugen die Gläser aneinander, in Müllheim wurden zwei Cigarren von einem Fenstersims heruntergeworfen. In Hülgelheim, Britzingen, Zurzingen, Vögisheim und Auggen aber war das Beben sehr geschwächt. Beinahe ebenso stark wie im Wiesental waren nach den Berichten die Wirkungen im Münstertal. Es krachten die Holzhäuser, Lampen, Bettstätten schwankten. Das Vieh im Stalle wurde unruhig; die Leute, die mit dem Füttern des Viehs beschäftigt waren, liefen zum Teil vor Schreck auf die Strasse. Im Schulhaus zu Grunern, nahe der Hauptverwerfungsspalte des Rheintales, fiel Gyps von den Wänden; in Staufen wurde eine ein Pfund schwere Gypsfigur, die auf einem Holzgestell stand, herumgedreht und ein

Säulenofen schwankte. Aus Sulzburg wird berichtet, dass die Möbel in ein unheimliches Hin- und Herschwanken gerieten.

Wenn man versucht, das pleistoseiste Gebiet etwas näher zu umgrenzen, so sind zwei Gebiete näher in das Auge zu fassen: das Wiesental und das Münstertal. Sehr stark wurden sodann noch die Orte längs der Rheintalspalte getroffen, die wir jedoch aus später zu besprechenden Gründen vorläufig ausschalten. Es ist klar, dass in dem pleistoseisten Gebiet der Erregungsort des Erdbebens zu suchen ist; und nun fragt sich, liegt dieser im Münstertal oder im Wiesental? Aufschluss über die Frage können uns geben 1. die Art der Bewegung, 2. die Richtung der Bewegung. Die Art der Bewegung ist in der Nähe des Erdbebenherdes sukzessorisch. Je weiter man sich vom Erregungsort entfernt, um so mehr muss die Stossbewegung in eine Wellenbewegung übergehen. Letztere ist wohl stets dann anzunehmen, wenn zwei Stösse gemeldet werden, welche dann der grössten Schwingungsamplitude entsprechen dürfen. Vom Ursprungsort pflanzt sich das Beben wellenförmig nach allen Richtungen fort. Die Anordnung der Richtung muss darnach auf den Erregungsherd führen. Für vorliegendes Erdbeben werden nun aus Staufen zwei Stösse gemeldet, aus dem Münstertal liegen gleichfalls Berichte vor, welche von zwei Stössen mit wellenförmigen Bewegungen sprechen. Dagegen verspürten sämtliche Beobachter in Lörrach und Inzlingen nur einen Stoss (nach Dr. Grether vertikal). Dahin konvergieren, wie oben gesehen, die Richtungen. Man dürfte also nicht fehl gehen, wenn man schliesst, der Erregungsherd liegt im unteren Wiesental. Dann ist aber auch hier das pleistoseiste Gebiet. Und in der Tat waren auch hier die verhältnismässig stärksten Erschütterungen, und da liegen die meisten Orte der Gruppe 1 mit Intensitätsgrad drei. Das pleistoseiste Gebiet ist auf dem Kärtchen durch eine rote Linie eingezeichnet.

An die Gruppe 1 schliesst sich Gruppe 2 mit Stärkegrad zwei der Futtererschen Erdbebenskala nach allen Seiten hin an. Nach Westen und Nordwesten sind es die Orte Krozingen, Kirchhofen, Freiburg, nach Norden Hinterzarten, St. Peter—St. Märgen, von Osten Gersbach, Görwihl, Oberwihl, Todtmoos, Aichen, St. Blasien, nach Süden Albbruck, Waldshut und Orte der Schweiz. Die Erschütterung war in genannten Orten derartig, dass sie den Menschen aus dem Schläfe weckte (Albbruck, Krozingen), die

Fenster zum Klirren (Aichen, St. Blasien u. a.), Bettstellen und Gegenstände leicht zum Erzittern brachte (Gersbach, St. Peter u. a.).

Der letzten, dritten Gruppe mit Stärkegrad 1, gehören alle anderen Orte an, in welchen das Beben verspürt wurde. Ich rechne dazu die Orte, in welchen das Beben sich nur durch Geräusch, donnerartiges Rollen oder leichtes Zittern des Bodens bemerkbar machte. Die Orte liegen zum Teil zerstreut zwischen Orten von Stärkegrad zwei, zum Teil schliessen sie sich gegen die Grenze des Erschütterungsgebietes an diese an. Es gehören hierher Furtwangen, Glotterthal, Eschbach, Norsingen, Kappel, Höchenschwand u. a. Als besondere Wirkung sei noch angeführt, dass in Maulburg laut Konstanzer Zeitung in der Gretherschen Gypsgrube an der Wanne durch das Erdbeben ein kleiner Erdsturz veranlasst wurde, insofern Wiesengelände von 40 qm Umfang ca. 10 m tief versank.

Schallerscheinungen. Das Erdbeben war im ganzen Erschütterungsgebiet von Schallerscheinungen begleitet; an manchen Orten wie Neuhof, Niederhof, Wagensteig u. a. war das Beben überhaupt nur als Schallphänomen zur Kenntnis gekommen. In fünf Fällen wird berichtet, dass das Geräusch der Erschütterung voranging, in 7, dass es folgte, in 23, dass es die Erschütterung einleitete, begleitete und damit endigte; in andern Fällen ist eine Zeitangabe, ob prae oder post der Erschütterung, nicht gemacht worden.

Die Art des Geräusches wird von den verschiedenen Beobachtern sehr verschieden bezeichnet. Einige vergleichen das Geräusch mit dem Schall, den das Herabgleiten grosser Schneemassen vom Dache des Hauses verursacht (Atzenbach, Fischbach), andere mit dem eines schnellfahrenden Eisenbahnzuges oder mit dem Rollen eines Lastwagens, der über gefrorenen Boden hinfährt; wieder andere glaubten nach dem Ton annehmen zu müssen, dass im oberen Stockwerk ein schwerer Gegenstand umgestürzt sei; manche vergleichen es mit dem Brausen eines Sturmwindes, mit dem Rauschen eines starkfliessenden Baches, mit dem Sausen, welches ein Schwarm vorbeifliegender Vögel hervorbringt. Vielfach wird das Erdbebengeräusch als unterirdisches Rollen, als rummelndes Getöse, als ferner Donner, als scharfer Knall wie bei einem Böllerschuss oder einer Explosion bezeichnet.

Die Beobachter in Fahrnau und Waldshut geben an, dass das Geräusch aus dem Boden kam, die in Müllheim aus der Luft, alle andern lassen es die Frage dahingestellt; jedenfalls kommt der Schall aber aus der Luft, wohin er von dem erschütterten Boden verpflanzt wird.

Ursache des Erdbebens und geognostische Uebersicht über das Schüttergebiet. Um die Ursache des Bebens kennen zu lernen, ist es vor allem nötig, einen tieferen Einblick von den geognostischen Verhältnissen des erschütterten Gebietes zu nehmen. Letztere sind aus der geognostischen Uebersichtskarte des Schwarzwaldes von Heinrich Eck ersichtlich. Ein Blick auf die Karte lehrt, dass das Schüttergebiet zwei geologisch wesentlich von einander verschiedene Gebiete umfasst; das eine gehört dem Grundgebirge des südlichen Schwarzwaldes an, das andere schliesst in sich die marinsedimentäre Vorbergszone, welche in Brüchen rings vom Horste des Schwarzwaldmassives abgesunken ist. Das Grundgebirge des Schwarzwaldes besteht bekanntlich vorwiegend aus krystallinen Schiefern, in welchen vier grosse Granitmassive aufsetzen, von denen zwei in unserem Gebiet liegen. 1. Das Blauenmassiv, welches am Westabfall des Gebirges zwischen Blauen und Kandern anhebt und sich ostwärts nach Herrenschwand und Wehr erstreckt, 2. das Schluchseemassiv, welches von Blössling und Oberwühl in nordöstlicher Richtung über Schluchsee nach Neustadt im Norden, Uihlingen im Süden und über Hammereisenbach nach Unterkirnach hinzieht. An ihrer nördlichen Grenze stossen die beiden Granitmassive zumeist an eine 4 km breite Zone von Grauwacken, Schiefern und Konglomeraten des Kulm; die Kulmzone verläuft in einem stark dislozierten Zuge von Badenweiler über Schönau bis Lenzkirch. Das Streichen der Kulmschichten richtet sich im allgemeinen in Ost und OstNO; ihr Einfallen ist ein steiles (70—80°) und gleichförmiges. Auf die Kulmschichten folgt nordwärts das ausgedehnte zusammenhängende Gneissgebiet des mittleren Schwarzwaldes. Ueber die Lagerung der Gneisse sind bis jetzt nur sehr unvollkommene Angaben bekannt. Doch gelangte man nach Steinmann* durch Kombination aller bekannten Beobachtungen zu der Ansicht, dass das Gneissgebiet ein System eng zusammengeschobener.

* Steinmann und Gräff: Geolog. Führer der Umgegend von Freiburg.

ziemlich steil stehender Falten sein müsse, deren Axen ungefähr SW—NO streichen und deren Schenkel meist nördlich fallen. Unterbrochen wird das kontinuierliche Gneissgebiet im Münstertal durch mächtige Decken und Gänge von Quarzporphyr, die auch im Granit, in den Kulmgrauwacken oberhalb vom Schluchsee, bei Lenzkirch und in den südlichen Gneissgebieten in der Umgebung der Alb und Wehratäler sich finden. Im Süden liegen zwischen den beiden Granitmassiven mehrere kleinere Gneissgebiete, so zu beiden Seiten des oberen Wehratales bei Todtmoos und Hornberg, im Vorwald bei Laufenburg und Hauenstein und im oberen Albtal unterhalb St. Blasien.

Durch ein System von Bruchlinien, das über Sexau, Freiburg—Staufen—Badenweiler, Kandern, Lörrach verläuft, ist das krystalline Grundgebirge im Osten von der marin sedimentären Vorbergszone im Westen getrennt. Es sind dies vorwiegend marine Sedimente der Trias, Jura und Tertiärformation in der Form von Konglomeraten, Sandsteinen, Mergeln und Tonen. Die Schichten sinken an Verwerfungsspalten, welche SSW—NNO verlaufen, treppenartig der Rheinebene zu. Die zerbrochenen Sedimentschollen fallen wenig gegen Westen ein; die am weitest abgesunkenen Schichten liegen heute tief unter dem Niveau der Rheinebene. Der Maximalbetrag der Verschiebung beträgt gegen 1800 m. Am Südrande des Schwarzwaldes füllen niedergesunkene Sedimenttafeln den ganzen Raum zwischen dem Granitstock des Blauen bei Badenweiler und dem Gneissgebiet des Vorwaldes bei Säckingen aus. Mitten durch das Gebiet fliesst die Wiese. Die Schichten sind nahezu horizontal gelagert. Durch eine Bruchlinie, welche von Kandern über Wisleth, Raith, Wehr, Brennet verläuft, sind sie vom Grundgebirge getrennt. Noch andere Bruchlinien durchziehen das Gebiet, deren eine von Rheinfelden nördlich an Degerfelden vorbei nach Lörrach, deren zweite südlich von Schopfheim streicht. Südlich des Rheines bei Basel, Rheinfelden, Laufenburg verschwinden die Sedimenttafeln unter der Juradecke. Im Osten trennen gleichfalls allerdings sehr minimale Verwerfungslinien die Sedimentärreihe von dem Grundgebirge. Rings um den Schwarzwald vollzieht sich demnach die Abtrennung der mesozoischen Tafeln vom alten Gebirge in mehr oder minder dem Gebirgsrande parallelen Brüchen, die häufig von Querbrüchen rechtwinklig gekreuzt werden.

Zusammenhang zwischen dem tektonischen Aufbau und der Erdbebenerscheinung. Geht man auf den Zusammenhang, der zwischen dem geologischen Untergrund und der Erdbebenerscheinung besteht, ein, so zeigt sich, dass der tektonische Aufbau von grossem Einfluss auf die Verbreitung, Art und Stärke der Erschütterung ist. Vor allem auffallend ist die Einwirkung der Verwerfungsspalten auf die Verbreitung des Bebens. Im Westen hat die Bruchlinie, welche die Vorbergszone des Schwarzwaldes von den diluvialen Schottermassen des Rheintales trennt, der Erdbebenwelle Halt geboten, ebenso die Grenzlinie zwischen Sedimentärformation und krystallinem Gebirge im Osten; nur im Südosten bei Alpfen pflanzte das Beben sich in die Sedimentschichten hinein fort, was sich aber dadurch erklärt, dass die Orte dem Erregungsherd ziemlich nahe liegen, die Intensität des Bebens mithin eine relativ starke gewesen sein muss, fähig, den Widerstand, den die Spalte entgegensetzte, zu überwinden. In seiner Bearbeitung des rheinisch-schwäbischen Erdbebens von 1886 hat Eck darauf hingewiesen, dass die Gneisse die Erdbebenwelle längs ihrer Streichrichtung besser leiten als senkrecht dazu. Das lässt sich auch für vorliegenden Fall konstatieren. Das gute Leitungsvermögen der Welle von seiten des Granites und Gneisses, besonders in der Streichrichtung bewirkte, dass das Erdbeben weiter nach NO sich ausbreitete als nach Westen und Osten. Bei dem Versuche, aus der Richtung der Erdbebenwelle das Epicentrum zu bestimmen, trat uns nicht wenig die Richtung N—S längs der Verwerfungslinie zwischen Grundgebirge und Vorbergszone entgegen; ebenso frappant war aber auch die grosse Intensität längs der Spalte. Beides erklärt sich nun gerade durch den Verlauf der Spalte. Bei der Annahme, das Erdbeben sei durch eine Verschiebung von Sedimentschollen im Wiesental entstanden, traf die Erdbebenwelle in nordwestlicher Richtung auf die Rheintalspalte: hier erfuhr sie einerseits eine Ablenkung von der theoretischen NW-Richtung nach N, andererseits erwies sich die Spalte durch Hervorrufung weiterer Störungen als Schütterlinie, wie es auch beim Beben von 1896 der Fall war, und verursachte den hohen Intensitätsgrad in Kandern, Sulzburg, Grunern. Gegen Westen zu wurde zum Teil durch die Spalte das Beben geschwächt. Ob die starke Wirkung des Bebens im Münstertal mit den alten paläozoischen Eruptionen in Verbindung gebracht werden kann.

wage ich nicht zu behaupten. Ganz unwahrscheinlich ist es nicht. Glaubte doch auch Futterer bei dem Beben von 1896 auf einen Zusammenhang hierselbst hinweisen zu müssen.

Ursache des Bebens. Stellt man sich die Frage, wo der Erregungsort und die Ursache des Bebens zu suchen ist, so ist von vornherein klar, dass das eine wie das andere in das Gebiet stärkster Erschütterung zu verlegen ist. Denn alle Orte nahe dem Erregungsherd müssen stärker betroffen werden als die entfernteren. Nun haben wir oben als epizentrales Gebiet das untere Wiesental bezeichnet. Nach der Ursache des Erdbebens unterscheidet die Geologie vulkanische, tektonische und Einsturzbeben. Die vulkanischen Beben haben ihre Ursache in der Reaktion des glutigen Erdinnern gegen ihre Oberfläche, die tektonischen in gebirgsbildenden Prozessen, die Einsturzbeben in Auswaschungserscheinungen. Es ist evident, dass ein vulkanisches Beben nicht vorliegen kann, da ein vulkanischer Herd im epizentralen Gebiet nicht vorhanden ist. Gegen die Annahme eines Einsturzbebens aber spricht der Umstand, dass diese nur lokale Phänomene sind und dass, wenn sie auftreten, sie sich in längerer Zeitdauer wiederholen. Beides trifft aber hier nicht zu. Als dritte Möglichkeit bleibt das tektonische Beben. Dafür sprechen auch mehrere Gründe. Erstens spricht dafür, dass die Erdbeben in der oberrheinischen Tiefebene die Aeusserungen des fortdauernden Einsinkens und Zusammenbruchs der gewaltigen Grabenversenkung zwischen Schwarzwald und Vogesen sind, mithin unser Erdbeben als solches nicht allein dasteht und mit gebirgsbildenden Prozessen im Zusammenhang ist; zweitens spricht für ein tektonisches Beben die verhältnismässig grosse Zahl von Verwerfungslinien, welche das epizentrale Gebiet durchkreuzen und drittens das im Verhältnis zu seiner Wirkung grosse Erschütterungsgebiet, was auch ein Hinweis darauf ist, dass der Erregungsort in relativ grosser Tiefe liegt. Wir stellen also fest, dass das Beben ein tektonisches ist, dass man es mit einer Verschiebung von Gebirgsschollen zu tun hat. Nachdem wir die Ursache kennen gelernt haben, so wollen wir jetzt den Erregungsort näher bestimmen, hauptsächlich die Frage prüfen, ob die Verschiebung längs der Rheintalspalte oder in einer dazu senkrechten Spalte stattfand. Um das Problem zu lösen, ist es nötig, das Erdbeben mit denjenigen zu vergleichen, welche das betroffene Gebiet gleichfalls heimsuchten. Es sind das die Beben vom

7. Dezember 1875, 24. Januar 1883 und 21. April 1885. Von diesen wurde das vom 24. Januar 1883 von Kloos bearbeitet, zudem ist es dasjenige, welches die grösste Aehnlichkeit mit dem vom 24. März 1901 hat. Das Beben vom 24. Januar 1883 erschütterte den südlichen Schwarzwald, die Vorbergzone und pflanzte sich bis in die Vogesen hinein fort. Südlich der Verwerfungsspalte, welche über Kandern, Wiesleth—Schönau läuft, zeigt es keine Erschütterungspunkte; nur Lörrach, weil es an der Hauptverwerfungsspalte liegt, ist getroffen worden. Die Dinkelbergverwerfung trat hier der Verbreitung entgegen. Kloos verlegte die Ursache des Bebens in eine Senkung der sedimentären Gebirgsschollen längs der Rheintalspalte von Kandern im Süden bis Keppenbach im Norden. Bei dem Beben vom Jahre 1901 scheint mir die Verschiebung jedoch nicht längs der Rheintalspalte stattgefunden zu haben, obwohl hier Orte stärkster Erschütterung liegen. Denn hätte die Verschiebung längs der Spalte stattgefunden, so ist nicht einzusehen, warum nicht westlich der Spalte auch Orte stärkster Erschütterung liegen — (ein laterales Beben liegt wohl kaum vor) —, warum die Erschütterung sich nicht auch bis in die Vogesen fortpflanzte; es erklärt sich aus der Annahme nicht die Lage des epizentralen Gebietes, das ja das untere Wiesental umfasst; dann spricht sehr dagegen, dass westlich von Lörrach und Kandern das Beben so wenig verspürt wurde. All dies aber erklärt sich durch die Annahme, dass die Verschiebung von Sedimentschollen im Wiesental stattfand an einer Verwerfungslinie senkrecht zur Rheintalspalte wahrscheinlich der Verwerfungslinie, die von Lörrach nach Rheinfeldern zieht. Denn hier verspürte man sukkussorische Stösse und dahin konvergieren die Richtungen.

Schluss. Fasst man kurz noch einmal die erhaltenen Resultate zusammen, so darf man wohl sagen: Das Erdbeben vom 24. März 1901 entstand durch eine Verschiebung von Sedimentschollen im unteren Wiesental. Es war ein tektonisches Beben. Von hier pflanzte das Beben sich weiter nach NO und SW fort als nach anderen Richtungen. Im O und W ist das Schüttergebiet durch Verwerfungslinien abgegrenzt. Die Rheintalspalte erwies sich als ausgezeichnete Schütterlinie.

Erdbeben am 22. Mai 1901.

Am 22. Mai morgens 8 Uhr wurde in Efringen, Leopoldshöhe, Lörrach, Grenzach und Säckingen ein Erdbeben verspürt.

Die Angaben über die Eintrittszeit schwanken zwischen 4^h 3' in Säckingen und 7^h 57' in Efringen und Grenzach. In Lörrach soll nach einem Bericht das Beben 8^h 30", nach einem andern 7^h 58' eingetreten sein, in Leopoldshöhe 8^h 1' und in Stetten bei Lörrach 7^h 58' 30". Es differieren mithin die Angaben um 6', und zwar fallen die Endwerte auf die von einander entferntesten Orte. Eine genaue Zeitangabe betreffs der Eintrittszeit des Bebens kann nicht angegeben werden. Die Angaben über die Dauer des Bebens variieren zwischen 2" in Grenzach und 4" in Leopoldshöhe. Jedenfalls ist die Dauer der Erschütterung sehr gering gewesen.

Das Beben äusserte sich teils als Stoss allein, wie in Leopoldshöhe, wo er mit dem Anprall einer Lokomotive an ein Haus verglichen wird, teils als Stoss verbunden mit Zittern wie in Säckingen, Efringen und Stetten, wo die Erschütterung mit dem Herabfallen eines schweren Gegenstandes verglichen wird; aus Lörrach werden zwei Stösse gemeldet.

Ueber die Richtung der Stösse sind gleichfalls einige Berichte eingegangen. Unter denen gestattet die Beobachtung aus Grenzach einen Schluss auf die Richtung zu ziehen. Es schwankte dort an der NO-Wand ein Sekretär von hinten nach vorn. Daraus ergibt sich als Stossrichtung NO—SW. Im allgemeinen konvergieren die Richtungen nach dem Dinkelberg hin. Die Intensität des Bebens war entsprechend seiner Art eine geringe; sie erreichte den zweiten Grad der Futtererschen Erdbebenskala. Nähere Angaben liegen nur aus Säckingen und Grenzach vor. In Säckingen schwankten leichtere Gegenstände, in Grenzach fielen in einem Kamin kleine Steine und Mörtel herab.

Ueberall war das Beben von Geräusch begleitet, das teils mit fernem Donner, teils mit dem, welches ein vorbeifahrendes Lastfuhrwerk verursacht, verglichen wird

Aussergewöhnliche Erscheinungen sind sonst nicht beobachtet worden.

Als Ursache dürfte auch in diesem Falle eine Verschiebung längs einer Verwerfungsspalte anzunehmen sein.

Die Rasse des schwedischen Volkes.

Von Dr. Ludwig Wilser.

Der Gegenstand, für den ich heute Abend Ihre Aufmerksamkeit erbitte, berührt uns näher, als vielleicht mancher von Ihnen beim Lesen der Ankündigung denken mochte. Denn einmal bewohnen die Schweden noch heute das Land, aus dem nach Sage und Geschichte¹ die germanischen Völkerschaften, teils schwäbischen, teils fränkischen Stammes, die unsere engere badische Heimat erobert und besiedelt haben, vor mehr als zwei Jahrtausenden ausgezogen sind,

unde genus Francis adfore fama refert,
wo es auch, wie die süddeutschen Schwaben noch im zwölften Jahrhundert zu erzählen wussten, ein nordisches, meerumschlungenes „Schwabenland“ gab (In plaga septentrionali quaedam provincia adiacet mari, quam Sueviam aiunt nuncupari), die alte Stammesheimat, noch lange unvergessen, besonders bei den Alemannen, die sich nach einer „althergebrachten“, von einem Geschlecht zum andern fortgeerbten Sage von jeher berühmten, „von den alten Schwediern abkomen seyn“. Dann aber hat der „Naturwissenschaftliche Verein“ unsere eigenen auf Ermittlung der Rasse oder, wie wir hier sagen müssen, Rassenmischung der badischen Bevölkerung gerichteten Bestrebungen von Anfang an mit wohlwollender Teilnahme verfolgt, wiederholt Vorträge und Berichte über deren Fortgang und Ergebnisse angehört und, vor allem, durch dauernde Zuschüsse die Vollendung und Veröffentlichung ermöglicht. Ich erachte es daher als Pflicht, Ihnen Bericht zu erstatten über ein Unternehmen, das durch unser Vorgehen angeregt und durch die „Anthropologie der Badener“² entschieden beeinflusst, unsere Voraussetzungen in glänzendster Weise bestätigt hat.

Als wir nämlich vor nunmehr 17 Jahren an den Mannschaften einzelner Truppenteile, mehrerer Kompagnien des Leibgrenadierregiments und des Infanterieregiments 111, sowie der reitenden

Batterie des Artillerieregiments 14, unsere ersten Versuche und Vorübungen machten, waren wir überzeugt, dass die Untersuchung schwedischer Soldaten wesentlich andere Ergebnisse haben müsse. Solche mit unsern eigenen zu vergleichen, musste sehr lehrreich sein. und wir, Herr Ammon und ich, hatten daher die Absicht, auf einer Nordlandsfahrt in Stockholm bei einigen dortigen Heeresabteilungen ähnliche Erhebungen zu machen. Da äussere Umstände die Ausführung dieses schönen Planes vereitelt haben, freuen wir uns umsomehr, dass durch das grossartige Unternehmen, über das ich zu berichten im Begriffe bin, alles, was wir damals hätten erreichen können, weit überboten ist. Dagegen ist die Hoffnung, unser Beispiel werde im In- und Auslande Nachahmung finden, nur teilweise in Erfüllung gegangen. In Deutschland wenigstens ist, obwohl die grosse Schulkinderuntersuchung³ nur als einleitende Vorarbeit gelten kann, von einzelnen örtlich beschränkten Versuchen⁴ abgesehen, seitdem so gut wie nichts mehr geschehen. Glücklicherweise ist in dieser Hinsicht das Ausland eifriger und tatkräftiger gewesen, so dass aus den meisten europäischen Ländern, wie Norwegen (Arbo), England (Beddoe und Haddon), Belgien (Houzé), Frankreich (Collignon), Spanien (Olóriz und Aranzadi), Italien (Livi und Nicolucci), Schweiz (Chalumeau), Österreich (Weisbach und Holl), Russland (Zograf und Bogdanow), Finnland (Westerlund), wissenschaftlich wertvolle Berichte über mehr oder weniger umfassende Erhebungen vorliegen. Nun hat die grosse schwedische Volksuntersuchung, deren Ergebnisse in diesem prachtvoll ausgestatteten, mit sehr anschaulichen Karten und Farbenkreisen versehenen Werke⁵ zusammengefasst sind, den Ring geschlossen und eine umso störender empfundene Lücke ausgefüllt, als unter allen Völkern unseres Weltteils gerade die Schweden eine Sonderstellung einnehmen.

Der geistige Urheber, zugleich auch der unermüdliche Förderer und werktätige Unterstützer dieses wissenschaftlich hochbedeutenden Unternehmens ist Gustaf Retzius, Professor der Anatomie in Stockholm, der es als Ehrenpflicht ansah, das von seinem schon 1860 gestorbenen Vater Anders Retzius, dem Begründer der Schädelmessung, begonnene Werk zu Ende zu führen. Von verschiedenen Seiten aufgefordert und ermächtigt, hatte er schon in den Jahren 1862/3 eine umfassende Ermittlung der Rassen-

merkmale des schwedischen Volkes ins Auge gefasst und teilweise begonnen; da aber der Freiherr v. Düben, seines Vaters Nachfolger, sein Vorgänger auf dem Lehrstuhl der Anatomie, sich auch mit solchen Dingen beschäftigte, trat Retzius rücksichtsvoll zurück und wandte sich hauptsächlich den Aufgaben seiner Fachwissenschaft zu, ohne jedoch der gewissermassen ererbten Vorliebe für anthropologische Arbeiten ganz untreu zu werden; davon legt die in den Jahren 1872—78 durchgeführte und veröffentlichte* Untersuchung der Finnen ein schönes Zeugnis ab. Nachdem v. Düben 1892 gestorben war, ohne etwas Abschliessendes erreicht, besonders auch ohne etwas Zusammenhängendes veröffentlicht zu haben, schien es geboten, in Schweden, „der eigentlichen Wiege“ der Anthropologie, aufs neue ans Werk zu gehen, obwohl in einem Lande, wo der „wissenschaftlichen Arbeiter auf jedem Gebiete nur wenige sind, die bedeutende Ausdehnung des Landes aber derartig statistischen Erhebungen recht grosse Schwierigkeiten bereitet, man es sich mehr als einmal bedenkt, ehe man eine solche Arbeit in Gang setzt“. Ausser Retzius trug sich auch Professor Fürst in Lund mit solchen Plänen, beide Gelehrten aber wurden immer wieder durch andere fachwissenschaftliche und Berufsarbeiten an der Ausführung verhindert. Endlich im Jahre 1896 wurde im Vorstand der Schwedischen Gesellschaft für Anthropologie und Geographie, wo schon 1888 durch Reichsantiquar Hildebrand auf die Wichtigkeit solcher Untersuchungen hingewiesen worden war, die Angelegenheit von Hultkrantz, der kurz vorher eine statistische Arbeit über die Körpergrösse der Schweden abgeschlossen hatte, wiederum zur Sprache gebracht. Da aber weder von der Gesellschaft noch von der Regierung die nötigen Geldmittel zu erhalten waren, musste die Sache einstweilen noch verschoben werden. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Noch im Oktober des gleichen Jahres, in der feierlichen Sitzung am hundertsten Geburtstage seines Vaters, hob Retzius in der Festrede über „die Geschichte der physischen Anthropologie“ nochmals mit Nachdruck die Bedeutung umfassender Untersuchungen hervor und stellte zugleich in hochherziger Weise 3000 Kronen für die sofortige Inangriffnahme zur Verfügung. Nun kam die Sache in Fluss, und es konnte mit den nötigen Vorarbeiten, Aufstellung eines Feldzugsplans, Entwurf der Fragebogen, Anschaffung von Werkzeugen u. dgl., begonnen

werden. Nachdem die Genehmigung der Behörden eingeholt und ein Stab von Ärzten, Professoren, Doktoren und Kandidaten, für die Untersuchung gewonnen war, wurden im Sommer 1897 an den verschiedenen Übungsorten nicht weniger als 22 708 Wehrpflichtige und Soldaten⁷ untersucht und gemessen, sämtlich 21 Jahre alt und mindestens 157 cm gross, denn ältere oder jüngere wurden übergangen und die Minderemässigen waren mit den Untauglichen nach der dortigen Heeresordnung schon vorher ausgemustert. Im Frühling und Sommer des folgenden Jahres 1898 wurden in gleicher Weise die Erhebungen fortgesetzt und weitere 22 980 Mann, zusammen also 45 688 aus allen Teilen des Königreichs aufgenommen. Nachträglich mussten aus verschiedenen Gründen etwa 700 wieder ausgeschieden werden, so dass für die Berechnung 44 900 Mann übrig blieben, d. h. 1,81 % der männlichen und 0,88 % der Gesamtbevölkerung (rund 5 100 000) von Schweden. Vergleichen wir damit unsere badischen Zahlen, so haben wir in den Jahren 1886—1895 untersucht 30 676 Wehrpflichtige und 2201 Schüler, zusammen 32 877, das sind nahezu zwei vom Hundert der damaligen Bevölkerung des Grossherzogtums. Wenn die Schweden, denen hauptsächlich „die vorzüglichen Arbeiten von Livi und Ammon als Muster“ gedient haben, bei aller Anerkennung unserer Leistungen doch das „bedeutend grössere Material“ hervorheben, das ihren Untersuchungen einen „höheren Wert“ verleihe, so rührt dies daher, dass Herr Ammon, um einen möglichst gleichwertigen Grundstoff zu haben, nur 6800 von ihm selbst gemessene Wehrpflichtige von rein ländlicher Abstammung seinen Berechnungen zu grunde gelegt hat. Diese peinliche Genauigkeit mag ihre Vorzüge haben, ich glaube aber doch, dass mein verehrter Mitarbeiter Ammon etwas zu viel von ihr erwartet hat, denn der Hauptwert solcher Volksuntersuchungen liegt in der gegenseitigen Vergleichung und in den grossen, jede Zufälligkeit ausschliessenden Zahlen. Allzu feine Arbeit wird nicht bezahlt und ist auch in diesem Falle durchaus nicht überall anerkannt⁸ worden; jedenfalls ist damit, da mit solcher Strenge anderwärts kaum je verfahren worden ist oder verfahren werden wird, für die Vergleichbarkeit nichts gewonnen worden. Hätten wir, wie ich wiederholt beantragt habe, neben der ins einzelne gehenden, unsern Stoff verkleinernden und zersplitternden Behandlung der 6800 Mann, die noch nicht den vierten Teil aller Unter-

suchten ausmachen, kurz und übersichtlich auch die Gesamtergebnisse veröffentlicht, so würden unsere Zahlen gegen die anderer Forscher und Länder bedeutend schwerer ins Gewicht fallen. Während bei uns in Baden, von einigen gelegentlichen Unterstützungen abgesehen, nur zwei Untersucher, deren einer den Löwenanteil auf sich genommen, tätig waren, verteilt sich in Schweden die Arbeit auf 15 Herren, von denen Professor Fürst. auf dessen Namen die meisten (6330) Einzeluntersuchungen fallen, etwas mehr Mannschaften als ich (6057) gemessen hat. Man hat also in Schweden auf die Fehlerquelle, die zweifellos darin liegt, dass verschiedene Beobachter niemals ganz gleichmässig schätzen und messen, kein grosses Gewicht gelegt, und wohl mit Recht, da auch derselbe Untersucher zu verschiedenen Zeiten, bei wechselnder Beleuchtung u. dgl. sich nicht völlig gleichkommt und die geringen unvermeidlichen Abweichungen bei grossen Zahlen sich gegenseitig ausgleichen. Bei der Um- und Ausrechnung haben in Schweden, bezeichnend für die nordischen Verhältnisse, nicht weniger als fünf Damen mitgewirkt, während bei uns diese mühsame, zeitraubende und aufreibende Arbeit allein auf den Schultern unseres Schriftführers Ammon und seines Hilfsarbeiters Stolz lag.

Die beträchtlichen Kosten des schwedischen Unternehmens, einschliesslich der in jeder Hinsicht mustergiltigen Veröffentlichung 15 500 Kronen, das sind rund 17 440 Mark, musste, da sie sonst nicht aufzubringen waren, Retzius ganz allein tragen. Obwohl die meisten Kulturstaaten für wissenschaftliche Zwecke, darunter oft recht fernliegende Dinge von zweifelhaftem Wert, grosse Aufwendungen machen, scheint man Ermittlungen der Rasse des Volkes, auf dessen Wehrfähigkeit und Steuerkraft doch die ganze Macht des Staates beruht, noch nicht gebührend zu würdigen. Wir erkennen es dankbar an, dass uns die grossherzogliche Regierung nicht nur durch Befürwortung und Genehmigung unserer Untersuchungen, sondern auch durch Gewährung ausgiebiger Geldmittel unterstützt hat. In den zwölf Arbeitsjahren haben wir rund 12 000 Mark verbraucht und der Verlagshandlung noch 1560 Mark zu den nicht unerheblichen Druckkosten beigesteuert.

Während die Zusammenstellung und Berechnung des bei der Untersuchung der Landwehrleute gesammelten Stoffes in vollem Gange war, fand Retzius Zeit, sein prachtvolles, durch Natur-

treue der Abbildungen und Genauigkeit der Beschreibung ausgezeichnetes Schädelwerk, *Crania suecica antiqua*⁹, das er seit vielen Jahren vorbereitet hatte, herauszugeben. Beide Werke, die ich Ihnen hier zur Einsicht und Vergleichung vorlege, gehören zu den wertvollsten Erscheinungen der anthropologischen Literatur und machen ihrem Herausgeber wie seinem Vaterlande alle Ehre; sie ergänzen sich gegenseitig und geben uns ein lückenloses Bild der Rassenentwicklung von der ersten Besiedlung des Landes in der Steinzeit bis zum heutigen Tage. Mit berechtigtem Stolz konnte Retzius in einer Rede¹⁰ über „den germanischen Rassentypus“, in der er die Hauptergebnisse der Volksuntersuchung mitteilte, von Schweden rühmen, dass es, was die Leibesbeschaffenheit seiner Bewohner in Vergangenheit und Gegenwart anlangt, nun zu „den bestuntersuchten und bestgekannten Ländern gehört“. Das ist um so wertvoller für die Völkerkunde, als das schwedische Volk „merkwürdig einheitlich“ ist und die Rasse der alten Germanen am besten bewahrt hat.

Wenn wir nach diesen einleitenden Bemerkungen nun mit Hilfe des vorliegenden Werkes auf die Ergebnisse der schwedischen Volksuntersuchung etwas näher eingehen, wird sich Gelegenheit genug bieten, unsere heimischen Verhältnisse zum Vergleich heranzuziehen und Fragen von allgemein wissenschaftlicher Bedeutung zu berühren.

Die schwedischen Fragebogen, am Kopf mit dem Namen des Truppenteils und des Untersuchers wie dem Tag der Untersuchung bezeichnet, geben über Folgendes Auskunft: Laufende Zahl (Namen), Geburtsort des Untersuchten und seiner beiden Eltern, Grösse, stehend und sitzend, Armbreite, Kopf, Länge und Breite, Gesicht, länglich oder breit, Augen, blau, grau, gemischt (melerade), braun, Haare, gelb, aschblond (cendré), braun, schwarz, rot, Bemerkungen. Da bei der schwedischen Landbevölkerung immer die gleichen Namen, wie Andersson, Pettersson, Johansson, Hansson Erikson u. a.¹¹ sich wiederholen, wurden diese meist weggelassen. Nach dem Geburtsort wurden die Wehrpflichtigen so auf die einzelnen Landschaften verteilt, dass, wenn Sohn und mindestens ein Elternteil in der gleichen Landschaft geboren waren, sie dieser zugerechnet wurden; waren beide Eltern in der gleichen, der Sohn aber in einer andern Landschaft geboren, so wurde er als zur ersteren gehörig betrachtet, waren alle drei verschieden, so war

der Geburtsort des Vaters entscheidend. Die Grösse wurde ganz ähnlich wie bei uns, im Stehen und Sitzen, mit einem an der Wand befestigten Bandmass und einem hölzernen Winkel ermittelt; ebenso die von uns ausser acht gelassene Armbreite. Zur Messung des Kopfes dagegen diente ein Stangenzirkel. Auch wir haben zuerst einen solchen gebraucht, uns aber später im Hinblick auf die „Frankfurter Verständigung“ und in der Hoffnung auf nachfolgende Untersuchungen in Deutschland, bestimmen lassen, die Köpfe nicht in ihrer grössten Länge, sondern in der Horizontalebene zu messen. Zu diesem Zwecke liessen wir bei Nestler in Lahr ein hölzernes Schiebermass anfertigen, das besonders bei grösseren Untersuchungen sehr leicht und handlich, jedoch wegen des Federns der Arme nicht ganz so zuverlässig ist wie der Zirkel. Da wir, wie gesagt, in Deutschland keine Nachahmung fanden und das Ausland beim Zirkel blieb, haben wir durch die „Frankfurter Horizontale“ die Vergleichbarkeit unserer Untersuchungsergebnisse nicht erhöht. Herr Ammon hat sich bemüht, den Fehler gut zu machen, und den aus beiden Messungsarten sich ergebenden Unterschied des Index¹³ auf durchschnittlich 0,47, rund 0,5, um welche Zahl der unsrige zu hoch ist, berechnet.

Das Gesicht wurde, wie auch bei uns, nur in den wenigsten Landesteilen gemessen, sonst bloss geschätzt. Von den Augen entsprechen „die gemischten“ unsern „grünen“, deren „Iris nicht grau und nicht braun, sondern aus graublauen und bräunlichen Sektoren bzw. Radien zusammengesetzt erschien, und die aus der Entfernung von 1 m, in der die Beobachtung gemacht wurde, den Gesamteindruck von grün¹³ hervorriefen“. Da in Schweden blaue und graue Augen als „helle“ zusammengezählt wurden und auch nach unserer Auffassung erst bei den „grünen“ die „dunkle Farbe der Augen zu überwiegen“ beginnt, so kommen sich die Bezeichnungen und Abteilungen sehr nahe, mit andern Worten, es gibt helle, gemischte und dunkle¹⁴ Augen. Auch die gelben und aschblonden (cendré) Haare wurden später zusammengerechnet, so dass sich auch hier drei grosse Gruppen ergeben, lichte, mittelfarbige und schwarze Haare, wozu aber noch die eine besondere Stellung einnehmenden roten kommen. Die Abgrenzung der aschblonden gegen die braunen Haare erwies sich als schwierig und schwankend, besonders da die meisten Landwehrleute die Haare während der sommerlichen Übungszeit ganz kurz geschnitten

trugen; die von uns als zweckmässig befundene Musterlocke hat man in Schweden nicht benützt.

Bei der endgiltigen Ausarbeitung verteilten die beiden Herausgeber den umfangreichen Stoff so, dass Retzius die Masse, Fürst die Farben übernahm, doch in stetem Einverständnis und Zusammenwirken.

Dem Ganzen dient als Einleitung ein „Blick auf die Vorgeschichte und Geschichte Schwedens“ aus Retzius' Feder, mit besonderer Rücksicht auf die erste Besiedelung, Einwanderungen und jetzige Bevölkerung, sowie auf frühere Ansichten und Untersuchungen über die Rassenverhältnisse des Landes. Nur nach Norden und Westen hängt dieses mit andern Ländern, Finnland und Norwegen zusammen, und zwar durch gebirgige und waldige, meist öde und wüste oder doch nur ganz schwach bevölkerte Grenzgebiete; sonst ist es vom Meer umflossen. Die Küsten sind meist felsig und durch vorgelegte Schären wie mit einem Schutzwall umgeben. Da in alten Zeiten „die Schifffahrt sehr gefährlich und wenig entwickelt war“ (*immensus ultra utque sic dixerim adversus oceanus raris ab orbe nostro navibus aditur*, sagt noch Tacitus, Germ. 2), war das Land wie wenig andere von der Aussenwelt abgeschlossen und gegen grössere Einwanderungen und feindliche Einfälle geschützt. Nach dem Abschmelzen des Inlandeises hatte auch der Mensch, „von Süden her“ vordringend, von dem Lande Besitz ergriffen. „Alles weist darauf hin, dass die älteste Bevölkerung von den dänischen Inseln“ gekommen ist und sich allmählig im Lande ausgebreitet hat. Sie stand noch auf der von Torell¹⁵ „mesolithisch“ genannten Entwicklungsstufe und hat erst in Schonen die verhältnismässig hohe Gesittung der neueren Steinzeit erreicht. Damals waren Schonen, Blekinge, Halland, Westgotland, und Bohuslän die „hauptsächlichsten „Bevölkerungscentra“. Während der Bronze- und Eisenzeit „drangen die Ansiedler immer mehr nach den östlichen und nördlichen Gegenden des Landes vor, und die Verbindungen mit den umgebenden Ländern über das Meer wurden allmählig zahlreicher“. Die Wikingerflotten, die später nicht nur die Nord- und Ostsee, sondern sogar das Mittelmeer befuhren, brachten oft Gefangene heim, und der sich entwickelnde Handel wie auch das Christentum führten allerlei fremdes Volk ins Land. Von Nordosten her breiteten sich die Lappen aus, ohne jedoch weit nach Süden vorzudringen und die

Zusammensetzung der Bevölkerung erheblich zu beeinflussen. Die Verbindungen mit Finnland führten zuerst mehr Auswanderer hinüber als Einwanderer herüber, aber im 16. und 17. Jahrhundert wurden von mehreren schwedischen Königen zahlreiche Finnen zur Urbarmachung unbewohnter Waldländereien in Schweden angesiedelt. Diese sind trotz anfänglicher Feindseligkeit fast ganz in den Schweden aufgegangen, so dass jetzt nur noch wenige alte Leute finnisch verstehen. Ganz im Norden, in Västerbotten an der russischen Grenze, wohnt dagegen noch im wilden Waldland eine geschlossene finnische Bevölkerung von 20 000 Seelen. Zum Betrieb der Bergwerke sind im 17. Jahrhundert auch viele Wallonen ins Land gekommen, deren Nachkommen jetzt auf ungefähr 5000 Seelen geschätzt werden; von ihrer Sprache ist mit Ausnahme einiger Fachausdrücke nichts übrig geblieben, doch machen sich, gerade wie bei uns die Waldenser- und Hugenottengemeinden, die Wallonen noch teilweise durch ihre Namen und dunkleren Farben bemerklich. Nicht ohne Einfluss konnten selbstverständlich die grossen Kriege unter Gustav Adolf und Karl XII. bleiben; viele schwedische Offiziere und Soldaten, die lange im Ausland gedient hatten, brachten fremde Frauen mit nach Hause, und zahlreiche Ausländer nahmen Kriegsdienste in den schwedischen Heeren und folgten ihren siegreichen Fahnen. Daher kommt es, dass der schwedische Adel grösstenteils fremden Ursprungs ist. Der sich mehr und mehr entwickelnde Handel und Seeverkehr führte viele ausländische Handelsleute, darunter auch Juden, in die Hafenstädte, die sich dort aus Geschäftsrücksichten zumteil dauernd niederliessen und entweder Weib und Kind mitbrachten oder Töchter des Landes heirateten. Daher finden sich gerade im Bürgerstand der Städte auffallend viele Familien „mit fremden, gewöhnlich deutschen oder holländischen, seltener englischen, französischen oder italienischen Namen“. Es wäre daher durchaus nicht zu verwundern, wenn genauere Untersuchungen auch der städtischen Bevölkerung ergäben, dass diese rundköpfiger¹⁶ ist als die ländliche.

Dass das schwedische Volk ein germanisches ist und als solches zu dem grossen indogermanischen oder arischen Sprachstamm gehört, ist unbestritten, dass es in „seinen Grundbestandteilen“ von der Rasse abstammt, die seit der Steinzeit das Land bewohnt, haben die anthropologischen Untersuchungen, um die

sich besonders Retzius Vater und Sohn und v. Düben verdient gemacht, unzweifelhaft dargetan; dass die Rasse der Vorzeit nicht nur die Schädelgestalt, sondern auch die übrigen Merkmale, helle Farben und hohen Wuchs, mit der heutigen Bevölkerung gemein hatte, „ist in hohem Grade wahrscheinlich“. Es sei hier gestattet beizufügen, dass naturwissenschaftliche Forschung die Wahrscheinlichkeit zur Gewissheit erhoben hat. Vor ungefähr zwölf Jahren hat im chemischen Laboratorium in Kopenhagen Bille Gram die Menschenhaare aus sechs Baumsärgen der Bronzezeit einer genauen Prüfung unterworfen¹⁷ und gefunden, dass die durch Feuchtigkeit und Gerbsäure dunkel gefärbten Haare nach chemischer Reinigung eine ganz helle Farbe bekamen. Mit hellen Haaren sind aber, wenn es sich nicht um Mischlinge handelt, nach dem Naturgesetz auch blaue Augen und weisse Haut verbunden.

Haben wir nun die Berechtigung, diese Rasse „gemanisch“ zu nennen? Retzius ist der Ansicht, dass „sich die Forscher in dieser Hinsicht im allgemeinen dahin geeinigt haben, als in anthropologischem Sinne germanisch die Teile der arischen Rasse zu bezeichnen, welche, wenigstens soweit die Geschichte reicht, im nördlichen Europa gewohnt haben, dolichocephal (resp. mesocephal) und orthognath sind und eine hohe Statur, helles Auge, helle Haut und blondes Haar besitzen“. Beide Ausdrücke aber, „germanisch“ wie „arisch“, sind von geschichtlichen Völkernamen abgeleitet, und ich habe wiederholt, besonders in einem Vortrag¹⁸ über „Rassen und Völker“ auf dem 7. Internationalen Geographen-kongress, Berlin 1899, darauf hingewiesen, welche Verwirrung durch die Bezeichnung rein naturwissenschaftlicher Begriffe mit geschichtlichen Namen entsteht. Die einzige Ausnahme, die ich gelten lasse und selbst mache, ist „germanische Rasse“, weil unsere Vorfahren beim Eintritt in die Geschichte von völlig reiner Rasse¹⁹ waren und weil, wie gerade das vorliegende Werk unwiderleglich beweist, diese Rasse bei dem nicht ausgewanderten Teil der Germanen sich bis auf den heutigen Tag trotz dem ins Ungeheuere gesteigerten Weltverkehr nahezu unvermischt erhalten hat. Die Ansichten von der „Wiege“ und dem „Urheim“ der Germanen in Skandinavien entbehren nach Retzius' Meinung „noch einer wissenschaftlich sicheren Begründung“. Er hält es für „erlaubt“, überall in Europa (von Asien spricht er nicht mehr) nach demselben zu suchen, findet es aber „erklärlich

und natürlich“, dabei auch an die Gegenden zu denken, wo „die Germanen sich am reinsten erhalten“ haben. Ebenso vorsichtig, mit der Zurückhaltung des wahren Naturforschers, äussert er sich auch in den *Crania suecica antiqua*; in dem Bericht über die schwedische Ausgabe²⁰ habe ich mir jedoch erlaubt, dazu folgendes zu bemerken: „Wenn ich am Schlusse der Besprechung dieses schönen und wertvollen Werkes meine eigene Ansicht äussern darf, so geht sie dahin, dass man bei strengster Wissenschaftlichkeit doch etwas weiter gehen darf als der Verfasser, dem die Lehre vom Verbreitungszentrum der langköpfigen, hellfarbigen und hochgewachsenen Rasse (*Homo europaeus* Linné) in Skandinavien noch nicht genügend begründet scheint. Haben in dem, soweit unsere Kenntnis reicht, von Ariern bewohnten Schweden seit der ersten Besiedelung des Landes nach der Eiszeit keine Einwanderungen²¹ mehr stattgefunden, so ist die Blutsverwandtschaft, sowie die sprachliche und kulturelle Übereinstimmung der skandinavischen mit den übrigen arischen oder indogermanischen Völkern nur durch Auswanderungen zu erklären“. Übrigens hat mir Retzius brieflich sein Bedauern ausgesprochen, meine Arbeiten über die Herkunft der Arier²² damals noch nicht gekannt zu haben, und in sehr liebenswürdiger Weise die Aufnahme eines kürzlich in der Zeitschrift *Ymer* erschienenen Aufsatzes von mir über die Einwanderungsfrage vermittelt.

Das Königreich Schweden ist bei einer Länge von 1600, einer Breite von 400 km (442 126 qkm) nur wenig kleiner als das Deutsche Reich, enthält aber viele schwach bevölkerte Teile, so dass die Zahl der Einwohner nur 5 140 000, darunter 2 486 500 männliche und 2 611 000 weibliche, beträgt. Wie gross die Vermehrungsfähigkeit der Bevölkerung ist, geht daraus hervor, dass sie Ende des 16. Jahrhunderts noch keine Million ausmachte und sich im letzten Jahrhundert trotz starker Auswanderung verdoppelt hat. Es gibt zwar 95 Städte, darunter aber viele kleine und nur zwei grosse, Stockholm mit 300 000 und Gottenburg mit 140 000 Einwohnern. Das Land ist reich an Wasser und, besonders in seinen südlichen Teilen, sehr fruchtbar. Ungefähr vier Fünftel der Bevölkerung wohnen auf dem Lande und mehr als die Hälfte nährt sich, obgleich auch hier Handel und Industrie sich mächtig entwickelt haben, noch von Ackerbau und

Fischerei. Unter den Arbeitern befinden sich mehr als 60 000 Wald- und Holzarbeiter, deren Lebensweise sich nicht viel von der bäuerlichen unterscheiden wird.

Das Königreich zerfällt von Süden nach Norden in drei Hauptteile, Götaland, Svealand und Norrland, mit 10, 6 und 8, zusammen 24 Landschaften (landskap); es ist eingeteilt in 25 Verwaltungsbezirke oder Hauptmannschaften (län) und zahlreiche Gerichtssprengel (häradar) und Kirchspiele (socknar).

Gehen wir nun zu den Einzelheiten über, so haben wir zunächst die von Retzius bearbeitete Körpergrösse der Schweden zu beachten. Frühere Beobachter, z. B. Baxter,²³ die sich aber nur auf eine beschränkte Zahl von Messungen stützen konnten, gaben die Durchschnittsgrösse auf etwa 1,70 m an. Im Jahre 1875 hatte der norwegische Militärarzt Arbo eine statistische Arbeit²⁴ herausgegeben, die für uns besondere Bedeutung hat, weil sie, wie die ganz ähnliche²⁵ aus Ammons Feder, eine Zunahme (0,075 Zoll, schwedisch oder norwegisch?, d. h. ungefähr 2 cm in 30 Jahren, gegen 1 cm bei uns in 24 Jahren) der Länge bei den schwedischen Wehrpflichtigen feststellt; die Vergleichbarkeit beider Untersuchungen ist um so grösser, als sie die selbe Zeit, 1840—1870 und 1840—1864, behandeln. Beide Forscher, der nordische wie der badische, stimmen darin überein, dass sie als Ursache dieser Zunahme die Verbesserung der Lebensverhältnisse ansehen; Ammon macht dazu die ohne Zweifel berechtigte Bemerkung, dass es sich hierbei wohl weniger um ein „Grösserwerden der Rasse“ als um eine Beschleunigung der Entwicklung handelt. Die erste eingehendere Untersuchung über die Körpergrösse der Schweden wurde vor einigen Jahren von Hultkrantz²⁶ angestellt auf Grund der amtlichen Berichte, die seit den Jahren 1887—1894 an das Landwehrkommando eingeschickt worden waren und 232 367 Mann, d. h. ungefähr den zehnten (im Text steht irrtümlich „fünften“) Teil der männlichen Bevölkerung Schwedens, umfassen. Er hat die mittlere Grösse der schwedischen Männer im Alter von 21 Jahren auf 1,695 m berechnet. Da die nordische Rasse in diesem Lebensalter noch nicht ausgewachsen ist, sondern nach Gould im dritten Jahrzehnt noch um etwa 1 cm zunimmt, ergibt sich auch aus dieser auf grossen Zahlen beruhenden Berechnung eine Durchschnittsgrösse der vollständig erwachsenen Männer von 1,70 m. Bemerkenswert ist, dass auch

Hultkrantz eine Zunahme von 0,5 cm in 7 Jahren gefunden hat, aber doch, wie schon Ecker²⁷, die Abstammung als das den Wuchs hauptsächlich bestimmende ansieht. Er knüpft an seine Ergebnisse noch allerlei Fragen, deren Lösung er von einer umfassenden Volksuntersuchung erwartet.

Bezüglich des Wachstums der schwedischen Jugend hatte schon vorher Key²⁸ sehr bemerkenswerte Messungen an Schülern im Alter von 9 bis zu 21 Jahren ausgeführt. Darnach waren die Jünglinge höherer Stände mit 19 Jahren durchschnittlich 1,70, mit 20 1,71 und mit 21 1,72 m gross. Dass dieser Unterschied nicht bloss auf schnellerem Wachsen, sondern auch auf höherem Wuchs der wohlhabenden städtischen Bevölkerung beruht, geht aus den Mitteilungen hervor, die Forssberg 1891 in der Gesellschaft der Ärzte in Stockholm gemacht hat: 514 junge Leute unter 25 Jahren und den ärmeren Volksschichten angehörend, waren durchschnittlich 1,70, 58 der oberen dagegen 1,78 m gross. Die gleiche Erscheinung trat auch beim weiblichen Geschlecht hervor.

Die grosse Untersuchung der Jahre 1897/8 ist der Hultkrantzschen insofern nicht ganz gleichwertig, als die Mindermässigen, unter 1,57 m, schon vorher ausgeschieden waren, was selbstverständlich die Durchschnittszahl etwas erhöht. Es finden sich in den Listen unter rund 45 000 Mann aber doch 107 unter 1,57 m, die durch ein Versehen eingestellt und mitgemessen wurden und einigermaßen den Fehler wieder ausgleichen. Aber auch die Grösse von 1,57 m ist nur durch 120 Mann vertreten, woraus hervorgeht, dass ein so niederer Wuchs in Schweden überhaupt selten ist. Im ganzen hat sich ein noch grösseres Durchschnittsmass²⁹ ergeben als das von Arbo (1860—70) auf 1,696, von Hultkrantz (1887—94) auf 1,695 berechnete, nämlich 1,709 m; die Grossen, über 1,70 m, machen jetzt ungefähr 60% der Bevölkerung aus, gegen 50% nach Hultkrantz. Die grössten Mannschaften, über 1,72 m, haben die Landschaften Härjedalen, Hälsingland, Bohuslän und die Insel Gotland gestellt, die kleinsten, mit 1,69 m, Lappland, die einzige Landschaft, die wegen Beimengung lappischen Blutes unter 1,70 m bleibt.

Die gebirgige oder ebene Beschaffenheit, hohe oder tiefe Lage der einzelnen schwedischen Landschaften scheint den Wuchs ihrer Bewohner ebensowenig zu beeinflussen wie die Wohlhabenheit;

das arme Hälsingland und Härjedalen bringt grössere Menschen hervor als das reiche Ostgotland und Schonen.

Leider hat man früher die in alten Gräbern gefundenen langen Knochen wenig beachtet; doch scheint aus den von Guldberg³⁰ in Norwegen gemachten Erfahrungen hervorzugehen, dass der Wuchs der vorzeitlichen skandinavischen Bevölkerung von dem der lebenden kaum verschieden war.

Es ist hier vielleicht am Platze, einige Worte über den Wert zweigipfelter Kurven, aus denen man früher weitgehende Schlüsse auf Mischung verschiedener Rassen gezogen hatte, einzuschalten. Retzius erkennt mit Livi und Ammon³¹ an, dass hierbei meist der Zufall sein Spiel treibt, und „hält es für einen Gewinn, die Wahrheit auch in solchen Fällen, wo sie unsere Kartenhäuser zerschlägt, zu ermitteln“. In der Tat gibt sich eine Rassenmischung viel mehr durch Streckung und Verflachung als durch Spaltung der Kurve zu erkennen.

Ziehen wir unsere badischen Ergebnisse zum Vergleich heran, so stehen wir mit einer Durchschnittsgrösse von 1,652 m und nur 23,5 % Grossen, allerdings bei einer um ein Jahr jüngeren Mannschaft, recht tief unter Schweden. Ein Überblick über die anderen europäischen Länder lehrt, dass im allgemeinen, von einigen Inseln hochgewachsener Bevölkerung wie Oberbayern und Bosnien abgesehen, der Wuchs abnimmt, je weiter wir uns von Schweden entfernen: Norweger 1,697, Engländer 1,696 (etwas zu hoch, weil es dort keine „Wehrpflichtigen“ gibt), Dänen und Schleswiger 1,692, schwedische Finnländer 1,684, Finnen 1,669, Elsass-Lothringer 1,666, Franzosen 1,654, Badener 1,652, Württemberger 1,651, Russen 1,642, Spanier 1,640, Schweizer 1,636, Italiener 1,624, Portugiesen 1,622 m. Schweden ist demnach der Ausstrahlungsmittelpunkt der Grossen in Europa.

In ähnlicher Weise wie bei uns wurde auch die Sitzgrösse und ausserdem die Armbreite gemessen. Aus diesen Massen geht hervor, dass die Schweden ziemlich langgliedrig sind und dass die grössten Leute auch die längsten Arme und Beine haben. Die Armbreite ist immer etwas grösser als die Leibeslänge, im Mittel 1,764 m, Index 104.

Ehe ich nun zu den ungleich wichtigeren, von Retzius bearbeiteten Kopfmassen übergehe, möchte ich vorausschicken, dass gerade die grosse Volksuntersuchung in Schweden, dem Ge-

burtslande der Schädelmessung, für Jeden, der sehen will, die grosse Bedeutung des Längenbreitenverhältnisses als Rassenmerkmal⁸³ unwiderleglich dargetan hat. Welch ein Unterschied zwischen unseren nordischen Stammverwandten und den Süddeutschen, beispielsweise uns Badenern, die wir uns doch auch germanischer Abkunft berühmen! Das kann unmöglich auf Zufall beruhen.

Vor 60 Jahren schon⁸⁴ hat Anders Retzius, allerdings nur an wenigen ausgewählten Schädeln der anatomischen Sammlung, festgestellt, dass die Gestalt des Schwedenschädels eine längliche ist, indem die Breite zur Länge sich wie 773:1000 verhält (Index 77,3). Sein Nachfolger v. Düben gibt für die neuzeitliche Bevölkerung durchschnittlich 77,1, für die vorzeitliche 73,1 als Schädelindex an. Clason, der ohne genügenden wissenschaftlichen Grund zwei Arten von Schädeln (ovale und elliptische) unterscheidet, hat für Schädel aus Begräbnisstätten in der Nähe von Upsala⁸⁵ folgende Durchschnittszahlen gefunden: steinzeitliche 72,4, mittelalterliche 74,5, neuzeitliche 76,3. Er zieht daraus den nicht unberechtigten Schluss, dass die Schädelgestalt in seinem Vaterlande von der ältesten bis zur neuesten Zeit allmählig ein wenig rundlicher geworden ist. In den andern Ländern, besonders in Süddeutschland, finden wir ein wesentlich anderes Verhalten; während die Steinzeit ganz der schwedischen gleicht, gibt sich in den folgenden Zeitaltern ein wiederholtes An- und Abswellen der Länge des Schädels zu erkennen, je nachdem Einwanderungen stattgefunden haben. Die germanische Völkerwanderung bringt dann wieder Schädel von ausgesprochenem Langbau, der sich, wie wir an den Schädelfunden aus Reihengräbern, Gräften, Beinhäusern und Friedhöfen feststellen können, von Jahrhundert zu Jahrhundert mehr und mehr verliert und in die rundliche Gestalt übergeht. Schon daraus lässt sich schliessen, dass bei uns infolge von Einwanderungen eine wiederholte Zufuhr reiner Rasse stattgefunden hat, die immer wieder in einer Mischlingsbevölkerung aufgegangen ist, während in Schweden die Rasse stets die gleiche war und man höchstens von einem spärlichen Einsickern fremden Blutes reden kann.

Sehen wir, was die neuesten Erhebungen bezüglich der Kopfform der lebenden Bevölkerung ergeben haben. Als wichtigste und während des Lebens unveränderliche Masse müssen Länge und Breite gelten, deren Verhältnis sich in dem sog. „Index“

ausdrückt und der Einteilung der gesamten Menschheit in Langköpfe (Dolichocephale, Index unter 80) und Rundköpfe (Brachycephale, Index 80 und darüber) zu grunde liegt. Da das Verhältnis der beiden Durchmesser am lebenden Kopf selbstverständlich ein anderes ist als am Schädel, bespricht Retzius auch die Art der Umrechnung des Kopf- in den Schädelindex. Obgleich ihm nach seinen eigenen Berechnungen der Abzug von zwei Einheiten „etwas zu gross“ und „ungefähr $1\frac{3}{4}$ “ das Richtigste scheint, obwohl er zugibt, dass derselbe bei länglichen oder runden Köpfen verschieden sein muss, bleibt er doch, da die „entstehenden Fehler im ganzen unbedeutend sind“, bei der von Broca angegebenen Durchschnittszahl. Fürst hat sich der Mühe unterzogen, die Dicke der Kopfschwarte mittels einer geölten Nadel an 14 Leichen zu messen, und daraus den Unterschied zwischen Kopf- und Schädelindex auf 1,83 berechnet. In der abgedruckten Zusammenstellung sind jedoch einige Fehler enthalten, besonders ist der Unterschied von 3,63, welche Zahl mir sogleich auffiel, beim vierten Kopf zu gross; nach Berichtigung dieser Versehen ermässigt sich der durchschnittliche Unterschied auf 1,70. Ich kann in dieser für den messenden Anthropologen immerhin nicht unwichtigen Frage nur wiederholen, was ich in dem schon angeführten Vortrag über „Schädelmessung“ gesagt habe: „Durch Untersuchungen an 19 Leichen hatte er (Broca, der zuerst sein Augenmerk auf diese Frage⁸⁵ gerichtet hat) festgestellt, dass an dem mit Hüllen umgebenen Kopf der Längsdurchmesser durchschnittlich um 0,6 cm, der Querdurchmesser um 0,8 cm, der Index um 1,68 grösser ist als am Schädel, glaubt aber, bei Vergleichen mindestens zwei Einheiten vom Kopfindex abziehen zu müssen, während andere Anthropologen wie Topinard, Virchow, Stieda, Livi teils damit übereinstimmen, teils überhaupt keinen nennenswerten Unterschied zugeben. Die Wahrheit liegt buchstäblich in der Mitte, und es ist nur zu verwundern, dass eine so einfache Sache nicht schon früher endgiltig entschieden worden ist. Wie 1889 zuerst Ammon auf der hiesigen (Heidelberger) Naturforscherversammlung, dann in seinem Buch Die natürliche Auslese beim Menschen⁸⁶ auseinandergesetzt, kann das Verhältnis gar kein gleichmässiges sein, sondern hängt ganz vom Index ab, da ein Bruch seinen Wert ändert, wenn Zähler und Nenner um den gleichen Betrag vergrössert werden.

Während bei einem vollkommen runden Schädel eine gleichmässig dicke Weichteilhülle den Index 100 gar nicht beeinflusst, muss sie bei einem sehr schmalen, beispielsweise von Index 60, diesen erheblich vergrössern. Streng genommen muss man also, um Schädel und Kopf vergleichen zu können, die Durchmesser des ersteren um die Dicke der Weichteile verlängern und dann erst den Index berechnen. Da beim Querdurchmesser des Kopfes auf beiden Seiten die behaarte Haut und die Ausstrahlung des Kaumuskels in Betracht kommt, da ferner nach Welckers³⁷ Untersuchungen auch die Durchtränkung der lebenden Knochen diesen Durchmesser etwas verbreitert, müsste eigentlich für ihn etwas mehr angesetzt werden. Aus Gründen der Zweckmässigkeit habe ich aber schon vor Jahren³⁸ vorgeschlagen, in beiden Fällen 1,0 cm zu nehmen, was für den Längsdurchmesser wohl etwas zu viel ist, aber gerade dadurch³⁹ den Fehler ausgleicht. Nach dieser Berechnung entspricht einem Schädelindex von 80 ein Kopfindex von 81, und da schon v. Baer⁴⁰ diesen Index als den mittleren des gesamten Menschengeschlechts bezeichnet hat, so wird man in den meisten Fällen und besonders bei grossen Zahlen der Wahrheit am nächsten kommen, wenn man vom Kopfindex, um ihn mit dem des Schädels vergleichen zu können, eine Einheit⁴¹ (nicht wie bisher meist zwei) abzieht; wer noch genauer sein will, kann bei Indices, die um 70 liegen, 1,5, bei solchen um 90 dagegen 0,5 abziehen, bezw. zuzählen.

In den Tabellen der „Anthropologia suecica“ ist nicht der Kopfindex, sondern nach Abzug von zwei Einheiten der Schädelindex angegeben; die Bruchteile sind weggelassen.

Das sehr bemerkenswerte Gesamtergebnis, unter 45 000 Landwehrleuten 87 % Langköpfe (Index unter 80, darunter 30 % echte Dolichocephale mit Index unter 75) und nur 13 % Rundköpfe (Index 80 und darüber), weicht erheblich von unserm badischen ab, 11 % Langköpfe (darunter nur 0,4 % echte Dolichocephale) gegen 89 % Rundköpfe. Das Verhältnis ist also gerade umgekehrt. Dabei ist aber zu bemerken, dass auch bei uns, wenn wir die nördlichen Landesteile in die Berechnung einbezogen hätten, eine etwas grössere Zahl von Langköpfen herausgekommen wäre. Auch in Schweden verhalten sich die einzelnen Gegenden nicht gleichmässig: acht Landschaften, die ziemlich die Mitte des Landes einnehmen, haben unter 10 % Rundköpfe und

über 30 % echte Dolichocephale; darunter ragt Dalsland hervor mit nur 5 % Rundköpfen und 45 % echten Dolichocephalen. In Lappland macht sich mit 24 % Rundköpfen die Nachbarschaft der fremdrassigen oder mischblütigen Lappen und Finnen bemerkbar. „Quer durch das mittlere Schweden läuft ein breites Band“ ausgesprochener Langköpfigkeit, während nach Norden wie nach Süden zu die Rundköpfe zunehmen. Fünf farbige Karten machen das Verhältnis sehr anschaulich.

Der durchschnittliche Kopfindex in Schweden ist 77,85, in Baden 84,14 oder nach Ausgleichung der verschiedenen Messungsarten 83,67, ein Unterschied von nahezu sechs Einheiten, der allerdings aus den erwähnten Gründen wohl etwas zu gross⁴² sein dürfte. Der rassenhafte Langbau des Schädels prägt sich besonders im Längsdurchmesser aus, der in Schweden sehr beträchtlich ist, in allen Landschaften über 19 cm, im Durchschnitt 19,29 cm, gegen 18,28, bzw. 18,38 cm in Baden, d. h. um nahezu 1 cm grösser. Für 63 von Ecker und mir⁴³ gemessene männliche Schädel aus südwestdeutschen Reihengräbern habe ich eine mittlere Länge von 18,8 cm berechnet; führen wir durch Abzug der durch die Versuche dreier Anatomen ermittelten Durchschnittszahl von 0,77 cm die schwedische und die badische Kopflänge auf die des Schädels zurück, so erhalten wir 18,52 und 17,61 cm; die erstere ist also seit der altgermanischen Zeit ziemlich die gleiche geblieben, die letztere um mehr als 1 cm zurückgegangen. All das lässt sich nur durch eine bei uns sehr bedeutende, in Schweden dagegen kaum merkliche Rassenmischung erklären.

Da die Breite der schwedischen Köpfe nur wenig hinter der der badischen, 15,10 und 15,38, zurückbleibt, so ist das Runderwerden des Schädels in Süddeutschland hauptsächlich auf eine Verkürzung desselben, die den Hohlraum nicht vergrössert haben kann, zurückzuführen.

Seit der Steinzeit hat sich die Schädelgestalt der Bevölkerung von Schweden kaum geändert. Für die drei Vorzeitalter berechne ich aus 117 in „Crania suecica antiqua“ beschriebenen Schädeln einen mittleren Index von 75,2, und ziehen wir von dem Kopfindex von 77,8, um ihn in den Schädelindex zu verwandeln, 1,25 ab, was für diese Kopfform der Wahrheit ziemlich nahe kommen wird, so erhalten wir 76,6; der Index hat also seit Jahrtausenden um wenig mehr als eine Einheit sich erhöht. Welch ein Unter-

schied gegen Süddeutschland! Nach Ausgleichung der verschiedenen Messungsarten ergibt sich für 70 von Ecker und mir untersuchte Schädel⁴⁴ ein mittlerer Index von 73,8, das ist um ungefähr neun Einheiten weniger als der Schädelindex 82,7 (nach Abzug von 1,0, was für diese Form annähernd das Richtige) der jetzt lebenden badischen Bevölkerung; da die deutschen Alpenländer noch höhere Indices aufweisen, beträgt hier der Unterschied zehn und mehr Einheiten. In Böhmen, das allerdings jetzt grösstenteils von Slaven bewohnt wird, hat sich der Index seit der Markomannenzeit von 74 auf 86, also um zwölf Einheiten, erhöht.

Ein vergleichender Überblick über die andern europäischen Länder lehrt wieder, dass von Schweden aus die Langköpfigkeit nach allen Seiten hin abnimmt, besonders nach Osten und bis zu den Alpen; im Süden und Westen unseres Weltteils liegen die Verhältnisse etwas anders, denn hier kommen wir in das Verbreitungsgebiet (ein Mittelpunkt lässt sich nicht finden) der ebenfalls langköpfigen Mittelmeerrasse (*Homo mediterraneus*). Der Kopfindex beträgt in England 77,8, schwedisch Finnland 77,9, Spanien 78,2, den Ostseeprovinzen 78,5, Westfinnland (Tawastland) 78,9, Norwegen ungefähr 79, Ostfinnland⁴⁵ (Karelien) 80,8, Österreich 82,5, Belgien 83,1, Luxemburg 87,4, Frankreich 83,5, Kleinrussland 84,0, Polen 84,4, Tirol 84,8, Grossrussland 85,4, Bosnien 85,7, Rumänien 86,2, Böhmen 86,3 und in Pamir, auf dem „Dache der Welt“, wo manche Leute noch heute den Ursprung der Arier suchen, 87.

Eine Erscheinung, die bei uns in Baden, wenn auch nicht sehr ausgesprochen und nicht in allen Landesteilen, sich bemerkbar gemacht hat, ist in Schweden noch deutlicher hervorgetreten, nämlich die Neigung des Langbaus des Schädels, sich mit hohem Wuchs zu verbinden, was Ammon „das Gesetz der Langköpfigkeit der Grossen“ genannt hat. Unter der grossen (1,70 m und darüber) schwedischen Mannschaft befinden sich 62,8 % echte Dolichocephale (Index unter 75), unter der kleinen nur 31,2 %. Ganz ähnliche Beobachtungen hat auch Zograf⁴⁶ in Russland gemacht. Er sagt: „Die sehr seltenen Fälle reiner Dolichocephalie (4 unter 191 Mann des Gouvernements Wladimir) wurde nur bei Grossen angetroffen, und im Gouvernement Kostroma zeigte sich die merkwürdige Tatsache, dass unter den Grossen 15 % Dolichoide, 12 % Meso- und 73 % Brachycephale waren, während umgekehrt

bei den Kleinen gar keine Dolicholoiden, nur 2% Meso-, dagegen 98% Brachycephale sich fanden.“ Collignons Ergebnisse⁴⁷ waren entsprechend, wenn auch nicht so augenfällig, und Weisbach kam bei seinen Untersuchungen der Salzburger⁴⁸ zu dem Schlusse: „Die Männer dolichoider Kopfgestalt sind immer höheren Wuchses als die Brachycephalen.“ Ammon ist dadurch auf den zweifellos richtigen Gedanken gekommen, „dass die Grösse und Langköpfigkeit des nordeuropäischen Typus einerseits und die Kleinheit und Rundköpfigkeit des alpinen Typus anderseits noch jetzt mit einer gewissen Bevorzugung zusammen vererbt werden, trotz der vielfachen Kreuzungen“. Weitergehende Schlüsse darf man aber nicht ziehen, ein anderer ursächlicher Zusammenhang fehlt, und ein Gesetz, wie es Welcker⁴⁹ aus den zufälligen Befunden an der kleinen Zahl von 15 Schädeln glaubte ableiten zu dürfen, dass nämlich nach der Grösse geordnete Skelette „zugleich geordnet sind nach den Graden ihrer Brachy- und Dolichocephalie“, gibt es nicht. Gerade die grössten Menschen, Patagonier und Bosnier (letztere durchschnittlich 1,72 cm gross bei Index 85,7), sind ausgesprochene Rundköpfe; obgleich die vorgeschichtlichen Bewohner von Bosnien langköpfig⁵⁰ waren und auch die später einwandernden Slaven ursprünglich der nordeuropäischen Rasse⁵¹ angehörten, haben hier doch besondere Mischungsverhältnisse und Lebensbedingungen zusammengewirkt, die Langköpfigkeit zu verdrängen, den hohen Wuchs dagegen zu erhalten, bezw. zu begünstigen. Dass das Verhältnis in Italien sich umkehrt, darf uns nicht wundern, denn hier gehört die Mehrheit der Bevölkerung der Mittelmeerrasse (*Homo mediterraneus*) an, die zwar langköpfig, aber klein ist.

Das Gesicht ist, wie schon erwähnt, nur in den beiden Landschaften Dalarne und Västmanland von Retzius gemessen (Jochbogenbreite und Höhe vom Kinn bis zur Nasenwurzel), in den übrigen von den andern Beobachtern nur geschätzt (länglich oder rund) worden. Darnach hätten die geschätzten Landschaften $\frac{4}{5}$, die gemessenen dagegen nur $\frac{1}{4}$ längliche Gesichter aufzuweisen, Ergebnisse, die schwer zu vereinigen sind und vorläufig noch keine sicheren Schlüsse zulassen. Wie schon der ältere Retzius lege auch ich auf die Gesichtsbildung als Rassenmerkmal weniger Wert. Die Rasse von Cro-Magnon (*Homo priscus*), von der die nordeuropäische (*Homo europaeus* Linné) abstammt, hat wegen

der stark ausgebildeten Kiefer ein zwar breites, aber durchaus nicht kurzes⁵³ Gesicht mit ziemlich schmaler Nase. Bei der mit der zunehmenden Gesittung Hand in Hand gehenden Rückbildung der Kiefer verschmälerte sich auch das Gesicht, blieb aber bei gewissen bäuerlichen, schwer arbeitenden und in mancher Hinsicht dem Urzustande noch näherstehenden Bevölkerungen etwas breiter. Eine besondere langköpfige und breitgesichtige Rasse anzunehmen, wie sie z. B. von Kollmann⁵³ vorausgesetzt wird, ist nicht geboten.

Auch die von Fürst behandelten Farbenmerkmale bieten des Beachtenswerten genug. Die Schweden gehören zu den hellfarbigsten Völkern: „eigentlich braune Haut kommt in unserm Lande gar nicht vor“. Die feineren Schattierungen gleichmässig zu beurteilen und scharf zu unterscheiden, wäre einer grösseren Zahl von Beobachtern gar nicht möglich gewesen; daher ist die Haut in die Fragebogen nicht aufgenommen. In eingehender Weise wird die Frage des Nachdunkelns behandelt, da Pfitzner⁵⁴ behauptet hatte, um zwei Bevölkerungen mit einander vergleichen zu können, müsse man Leute von 40—50 Jahren untersuchen, denn erst in diesem Lebensalter hätten die Haare ihre endgiltige Färbung erreicht. Es ist nun zweifellos richtig und durch die Untersuchungen des Strassburger Anthropologen bestätigt, dass die hellen Haare mit den Jahren immer dunkler werden; ebenso sicher ist es aber auch, dass die dunkeln Haare schon im Jünglingsalter ihre dauernde Farbe erlangt haben und im reiferen Mannesalter zu ergrauen, bezw. zu bleichen beginnen. Dieses Alter eignet sich also ebensowenig wie das kindliche, in dem die Farbstoffablagerung noch nicht beendet ist, zu anthropologischen Untersuchungen. Auch sind schon aus äusseren Gründen reife und selbständige Männer für solche Zwecke nicht zu haben, während der Heeresdienst die jungen Leute zusammenführt und einem höheren Willen unterwirft. Wehrpflichtige und Soldaten werden daher immer den geeignetsten und zugänglichsten Stoff für grössere Untersuchungen abgeben. Das späte und langsame Nachdunkeln ist ja gerade ein Merkmal der nordischen Rasse; viele Schweden behalten bis ins hohe Alter gelbe Haare, die dann unmittelbar die weisse Greisenfarbe annehmen. Dass die Regenbogenhaut, wie Pfitzner meint, während des Lebens unverändert bleibe, ist nicht richtig; auch sie dunkelt, wie Jeder an seinen eigenen Kindern beobachten kann, nach. Sogar die Negerkinder

kommen mit rötlicher Haut und hellen Augen zur Welt, nehmen aber sehr rasch — das ist eben auch eine Rasseneigentümlichkeit — die dunkle Färbung an.

Da sich das blaue Auge vom grauen weniger durch die Farbstoffmenge — beide sind arm an Farbstoff — als durch Brechungsverhältnisse und grössere oder geringere Durchsichtigkeit der Regenbogenhaut unterscheidet, haben die schwedischen Forscher recht daran getan, beide Farbenstufen unter der Bezeichnung „helle Augen“ zusammenzufassen. Das empfiehlt sich auch schon aus Zweckmässigkeitsgründen; denn die Farben „blau, stahlblau, wasserblau, blaugrau, graublau, grau“ sind selbst von einem einzelnen Beobachter bei gleicher Beleuchtung schwer auseinanderzuhalten. Die „grünen“ oder „gemischten“ Augen mit ihren dunklen Einsprengungen auf hellem Grunde lassen sich dagegen leicht von den durchaus hellen wie von den gleichmässig dunkeln unterscheiden. In Schweden wie bei uns ist das „gemischte“ Auge wohl in den meisten Fällen auch ein Mischlingsauge; es ist aber anzunehmen, dass auch ohne Blutmischung, allein durch Veränderung der äusseren Verhältnisse, Aufhellung oder Verdunkelung der Regenbogenhaut in ähnlicher Weise vor sich gehen würde, indem einzelne Stellen derselben zuerst den Farbstoff verlieren oder aufnehmen.

Helle Augen hatten von den schwedischen Wehrpflichtigen rund 30000 Mann, d. i. 66,7 %, darunter rein blaue 47,4 % und graue 19,3 %. Rein braune Augen kamen nur bei 1970 Mann, d. h. 4,5 % vor; die übrigen 28,8 % fallen auf die gemischten. Unsere badischen Zahlen weichen hiervon nicht erheblich ab (64,5 % helle, darunter 41,3 % blaue, und 12,6 % braune Augen), doch haben die Schweden mehr rein blaue, wir dagegen dreimal so viel braune Augen. Blond (gelbe und aschfarbene Haare vereinigt) waren 75,3 %, drei Viertel der schwedischen Mannschaft, braun 21,6 %, rot 2,3 % und schwarz nur 0,8 %; bei den Haaren macht sich also ein grösserer Unterschied bemerklich, da wir nur 41,6 % blonde und 1,7 % rote, dagegen 37,7 % braune und 18,0 % schwarze haben. Die Roten sind nach Fürsts Meinung zu den Blondinen zu rechnen, und es ist möglich, dass in Schweden mehr als im Süden eine goldene, ins Rötliche spielende Haarfarbe vorkommt. Bei uns, und gewiss zumteil auch im Norden, ist das rote Haar entschieden ein Mischlingsmerkmal, das besonders dann beobachtet wird, wenn ein Elternteil schwarz, der

andere hell ist. „Wie von manchen Anthropologen beliebte Vereinigung mit den blonden“, sagt auch Ammon, „halten wir für unzulässig, denn die blonden Haare stellen im ganzen eine viel weniger gemischte Klasse dar als die roten.“ Meistens sind die roten Haare mit weisser Haut, die sich aber leicht fleckig bräunt (Sommersprossen), und blauen Augen verbunden, glücklicherweise, denn die seltene Verbindung brauner Augen mit roten Haaren wirkt entschieden unschön. Sicher ist, dass diese Haarfarbe grosse Neigung hat, sich zu vererben, so dass man in Schweden ganze „Geschlechter“ von Rotköpfen und sogar „rote Gegenden“ beobachten kann. Mehr als die Hälfte, 54,4%, der Bevölkerung hat dort zugleich helle Augen und lichte Haare, bei uns nur 33%. Umgekehrt ist das Verhältnis in Italien: 10,3% helle und 69,1% braune Augen, 8,2% lichte und 31,1% schwarze Haare. Baden nimmt, was auf drei Farbkreisen sehr anschaulich dargestellt ist, eine vermittelnde Stellung ein. Das Verhältnis der gemischten Augen ist ein von Norden nach Süden fallendes, 28,8, 22,9 und 20,6%, was wohl so zu erklären ist, dass in Schweden ein dunkeläugiger Grundstock gar nicht vorhanden ist und vereinzelte Einwanderer mit braunen Augen meist sofort durch Blutmischung in der helläugigen Urbevölkerung sich verlieren. Zu den hellsten Landschaften, mit 60%, gehören Dalsland und Westgotland, die dunkelste, mit 37% wegen der Nachbarschaft der fremdrassigen Lappen, ist Lappland.

Sehr zu beachten ist, was Fürst über die Wirkung der Ein- und Auswanderung sagt: „Weil unser Land wahrscheinlich relativ mehr hell als jedes andere Land hat, so ist anzunehmen, dass wir bei der Auswanderung überwiegend helle Elemente verlieren und bei der Einwanderung dunkle erwerben. Also wird unser heller Stamm ganz gewiss beiderseits bedroht, d. h. für unser Volk steht eine, wenn auch langsame, Farbenverdunkelung in Aussicht.“ Daran ist nicht zu zweifeln; dass aber trotzdem Schweden heute immer noch das hellste Land⁵⁵ ist, das beweist eben, dass es ein anderes Verbreitungszentrum für hellfarbige Menschen nicht gibt und dass seit der Urzeit die Auswanderung immer viel stärker war als die Einwanderung.

Die Verbindungen und Wechselbeziehungen der Merkmale sind von beiden Herausgebern gemeinsam bearbeitet worden. So deutlich ein Zusammenhang zwischen hohem Wuchs und Lang-

köpfigkeit hervortritt, so wenig ist ein solcher bei den Farben und dem Knochengerüste zu bemerken: die verschiedenen Farben und ihre Verbindungen sind, wie auch bei uns, ziemlich gleichmässig auf alle Grössenstufen und Kopfformen verteilt.

Von ganz besonderer Bedeutung in dieser Hinsicht ist die Verbindung derjenigen Merkmale, deren Vereinigung als Kennzeichen der „germanischen Rasse“ (besser, wie schon auseinander-gesetzt, rein naturwissenschaftlich als „nordeuropäische“, *Homo europaeus* Linné, bezeichnet) betrachtet wird, der echten Doliocephalie (Index unter 75), der Hellfarbigkeit (helle Augen und lichte Haare) und des hohen Wuchses (1,70 m und darüber). Solcher völlig rassenreiner Germanen finden sich in ganz Schweden mehr als zehn vom Hundert, 10,7%, am meisten in den Landschaften Dalsland 18,3%, Södermanland 16,2%, Härjedalen 16,0% und Dalarne 14,7%, am wenigsten wieder in Västerbotten und Lappland, 4,9 und 5,1%. Die Farben der Karte XIII zeigen deutlich, dass die reine Rasse in der Mitte und im Innern des Landes, „nach der norwegischen Grenze zu, in Gegensatz zu dem Küstenlande“, am besten gegen das Eindringen fremden Blutes geschützt war.

Damit kann sich kein anderes Land unseres Weltteils vergleichen. Obwohl die Germanen, wie aus den Berichten der Augenzeugen und aus den Grabfunden hervorgeht, zurzeit der Römerkriege und der Völkerwanderung noch von reiner, oder doch nahezu reiner Rasse waren, konnten sie trotz aller Abneigung gegen Blutmischung in den eroberten Ländern auf die Dauer die Reinheit ihres edlen Blutes nicht bewahren. Auch wo ihre Sprache die Oberherrschaft behalten hat, ist die von den Alten angestaunte Einheitlichkeit der äusseren Erscheinung (*habitus quoque corporum, quamquam in tanto hominum numero, idem, Tac. Germ. 4*) dahin.

Das Vorkommen des äussersten „Gegensatzes“, d. h. die Vereinigung der Merkmale der rundköpfigen Rasse (*Homo brachycephalus*, den man in Mitteleuropa auch *Homo alpinus* nennen kann), rundlicher Schädelbau, dunkle Farben, untersetzte Gestalt, ist in Schweden sehr selten, nur 0,14%, obwohl im nördlichen Teil des Landes etwa 7000 Lappen wohnen.

In Baden haben wir unter 6800 Mann nur 57 gefunden, die „blauäugig, blond, weisshäutig, langköpfig und mindestens 1,70 m gross sind“; von unserer Volke gehören also nur 0,88 oder nach

Ammons Umrechnung, da „wir die Grenze der Langköpfe zu weit ausgedehnt haben“, sogar nur 0,56% der nordeuropäischen Rasse der germanischen Eroberer an. Diese Zahlen sind zwar mit den schwedischen nicht ohne weiteres zu vergleichen, weil die 6800 Mann aus den angeführten Gründen kein genaues Bild der ganzen Bevölkerung geben, weil wir nur die blauen, nicht alle hellen Augen zu grunde gelegt, dagegen als „Langköpfe“ nicht nur die echten Dolichocephalen (mit Index unter 75) sondern auch die Mesocephalen (mit Index unter 80) angesehen haben, weil endlich in Schweden der Schädelindex bei uns aber der Kopfindex berechnet ist. Diese verschiedenen Abweichungen werden sich aber wohl gegenseitig nahezu ausgleichen, so dass wir schliesslich doch wieder auf die Zahlen 0,5 (bei 0,4% echten Dolichocephalen) gegen 10,7% zurückkommen; während also von hundert Schweden zehn von rein germanischer oder nordeuropäischer Rasse sind, entspricht bei uns von 200 Menschen kaum einer der gleichen Anforderung. Die reine rundköpfige Rasse ist bei uns auch nicht viel stärker vertreten als in Schweden, 0,39 gegen 0,14% dagegen besteht unsere Bevölkerung fast durchweg aus Mischlingen.

Ammon und Fürst sprechen beide von einem „Block“ reiner nordeuropäischer Rasse, der allmähig durch Blutmischung zersplittert würde: in Baden habe dieser Block ursprünglich aus zwei Dritteln, in Schweden aus 85% der Bevölkerung bestanden. Dass er bei uns infolge einer seit anderthalb Jahrtausenden wirk-samen Rassenkreuzung mit einer fremdrassigen, übrigens durch-aus nicht mehr einheitlichen, sondern aus Mischlingen bestehenden Urbevölkerung bis auf die dürftigen Trümmer von $\frac{1}{2}$ % zu-sammengeschmolzen ist, lässt sich begreifen; es ist sogar anzu-nehmen, dass auch diese nicht von reinrassigen Vorfahren abstammen, sondern nur zufällig durch Erbschaft und Rückschlag die aus-einander gesprengten Merkmale der Stammrasse wieder vereinigt haben. In Schweden dagegen könnte, wenn seit Jahrtausenden in ähnlicher Weise eine wahllose Mischung stattgefunden hätte, von dem germanischen Block nicht ein völlig unangegriffener Kern von einem Zehntel der Bevölkerung übrig geblieben sein. Hier muss, wie auch Fürst anzunehmen geneigt ist, der Vor-gang sich etwas anders gestaltet haben. Die stetig, aber nur in geringer Menge, gewissermassen tropfenweise eindringenden fremden Bestandteile⁵⁶ wurden zuerst vollständig aufgesaugt und

gleichartig gemacht; erst als mit dem zunehmenden Weltverkehr die Einwanderung stärker und stärker wurde, konnte die Rasse der Ureinwohner nicht mehr mit ihr fertig werden, und es begann sich eine Mischlingsbevölkerung zu bilden. Gehen die Dinge so wie bisher weiter, so besteht, da die Einwanderer wohl meist dunkler sein werden als die Einwohner und Auswanderer, die Gefahr, dass der rassenreine Kern immer kleiner wird und ein allgemeines Dunklerwerden der Bevölkerung eintritt. Wenn auch in den Nachkommen aus der Verbindung eines Weissen mit einer Schwarzen noch nach mehreren Geschlechterfolgen das Negerblut sich bemerklich macht, so wird es sich doch allmähig, wenn kein neues dazu kommt, verlieren. So überwindet auch die mächtige Vererbungskraft einer rein gezüchteten, lebenskräftigen Rasse geringe fremde Bestandteile, die sich vollkommen einfügen und nicht, wie Ammon vorauszusetzen⁵⁷ scheint, ein Pfahl im Fleisch bleiben und immer wieder durchschlagen.

Das durch eine deutsche Übersetzung der Vergessenheit entrissene und weitverbreitete Buch Gobineaus über „Die Ungleichheit der Menschenrassen“ hat zunächst, da die grosse Mehrzahl der Leser die darin enthaltenen Irrtümer⁵⁸ von der Wahrheit nicht zu scheiden vermochte, mehr Unheil gestiftet als Gutes gewirkt: wie Pilze nach dem Regen sind zahlreiche andere Rassenbücher entstanden, deren Verfasser meist nicht einmal über den Grundbegriff „Rasse“ im klaren waren und daher unter ihrem, zum Teil sehr ausgedehnten und begeisterten Leserkreis, statt Aufklärung nur Verwirrung verbreitet haben. Um so freudiger dürfen wir daher das schöne, wahrhaft wissenschaftliche Rassenwerk begrüßen, dessen hochbedeutender Inhalt weiteren Kreisen allerdings erst mundgerecht gemacht werden muss. Es hat nicht nur aufs neue allen Zweifeln gegenüber die Wichtigkeit der durch zwei Handgriffe leicht festzustellenden Schädelgestalt dargetan, es hat auch über die Verbreitung der Rassen in unserem Weltteil sehr bemerkenswerte, wir dürfen sagen entscheidende, Aufschlüsse gegeben. Wohl wäre es sehr wünschenswert, wenn auch in den Nachbarländern, Norwegen, Dänemark und besonders Norddeutschland, derartig umfassende, freilich auch mühsame, zeitraubende und kostspielige Volksuntersuchungen angestellt würden, viel Neues könnten sie aber, ausser einer genaueren Abstufung der Mischungsverhältnisse, nicht mehr bringen. Das Verbreitungs-

zentrum der nordeuropäischen Rasse, die wir auch „germanisch“ nennen dürfen, ist durch das grossartige, nun glücklich zu Ende geführte schwedische Unternehmen unzweifelhaft festgestellt. Dass die geschichtliche Überlieferung mit diesem auf rein naturwissenschaftlichem Wege erreichten Endergebnis vollständig übereinstimmt, dient beiden zur Bekräftigung. Die Auswanderung aller Germanen aus der skandinavischen Halbinsel — ich stehe nicht an, dies immer aufs neue zu wiederholen — ist eine geschichtliche Tatsache⁵⁹ und bildet den wertvollsten, leider aber aus Vorurteil oft noch übersehenen oder absichtlich verschwiegenen Inhalt der mit so grossen Mühen und Kosten gesammelten und herausgegebenen *Monumenta Germaniae*. Nur auf dieser, ihrer natürlichen Grundlage wird die deutsche Geschichte verständlich, kann das über unsern Anfängen ruhende Dunkel erhellt, die lange vermisste Brücke zur Vorgeschichte geschlagen werden. Damit ist die Voraussagung Eckers, dass die Anthropologie die „vornehmste Hilfswissenschaft der Geschichte“ werden müsse, in Erfüllung gegangen, und ich freue mich, bei dieser Gelegenheit unserem Landsmanne und meinem verehrten Lehrer, einem der scharfsinnigsten Anthropologen, einige Worte der Dankbarkeit und der Anerkennung widmen zu dürfen. Vor bald 40 Jahren schon, als mit Ausnahme von zwei oder drei Predigern in der Wüste alle Welt noch an unsere Herkunft aus Asien glaubte, war er aufgrund seiner Vergleichung unserer Reihengräberschädel mit schwedischen der Wahrheit sehr nahe gekommen. „Die Franken“, sagt er,⁶⁰ „sind ein Bestandteil des grossen von Norden kommenden Völkerstammes, der mit gewaltigem Stoss das mächtige römische Reich zertrümmerte . . . und damit stimmt auch überein, dass die alten Wohnsitze der Alemannen ebenfalls an der Nord- und Ostsee lagen und dass sie sich erst im Laufe der Zeit gegen Süden und Westen bewegten . . . dass ihre Schädelform, die noch heute im skandinavischen Zweig des deutschen Stammes (der „in seinen alten Wohnsitzen“ und daher „unvermischt“ geblieben) erhaltene dolichocephale ist.“ Da die andern sprach- und stammverwandten Völker mit den Germanen auch durch ihre leiblichen Merkmale im innigsten Zusammenhang⁶¹ stehen, so muss ihre Urheimat mit der unsrigen zusammenfallen, und damit ist die berühmteste Streitfrage⁶² der alten Geschichte und Völkerkunde endgiltig entschieden.

Anmerkungen.

¹ Vergl. u. a. meine Abhandlungen „Stammbaum und Ausbreitung der Germanen“, Bonn, P. Hanstein, 1895, und „Wanderungen der Schwaben“, Beilage zum Staatsanzeiger für Württemberg Nr. 7—10, 1902. — Die angeführten Stellen finden sich bei Ermoldus Nigellus (carm. in hon. Hludovici, IV 13), Goldastus (Rerum suevicarum scriptores aliquot veteres, Frankfurt 1605) und Stumpff (Chronik IV 9, Zürich 1548). — Die Einheit der Namen „Schweden“ und „Schwaben“ (aschw. Svæthiud, an. Svithiod = Sueothiuda, Schwabenvolk) habe ich zuerst im Jahr 1890, Ausland No. 46 und 47, nachgewiesen.

² Zur Anthropologie der Badener. Im Auftrage der Kommission bearbeitet von Otto Ammon. Mit 24 in den Text gedruckten Figuren und 15 Tafeln in Farbendruck. Jena, G. Fischer, 1899.

³ Gesamtbericht im Archiv für Anthropologie XVI, 1886.

⁴ So die Untersuchungen von Meisner über die Körpergrösse der Wehrpflichtigen in Mecklenburg und den Elbherzogtümern (Archiv f. Anthr. 1891) und von Schliz an Schulkindern im Oberamt Heilbronn (in einigen Dörfern war auch ich beteiligt; Bericht auf der Anthropologenversammlung in Lindau, 1899).

⁵ Anthropologia suecica. Beiträge zur Anthropologie der Schweden, ausgearbeitet und zusammengestellt von Gustaf Retzius und Karl M. Fürst. Mit 130 Tabellen, 14 Karten und 7 Proportionstabellen in Farbendruck, vielen Kurven und anderen Illustrationen. Deutsche Ausgabe. Stockholm 1902.

⁶ Finska Kranier etc., skildrade af Gustaf Retzius, Stockholm 1878. — Vergl. auch die Beiträge Sur l'étude craniologiques des races humaines und Caractères ethniques des races finnoises im Compte rendu des 7. internat. Anthropologenkongresses von 1874, Stockholm 1876.

⁷ Nach der schwedischen Wehrverfassung besteht das Heer aus einem kleinen Stamm angeworbener (värfvade) oder eingeteilter (indelta) Mannschaft und der Landwehr (beväring), die im Sommer zu einer 90tägigen Übung einberufen wird.

⁸ Vergl. z. B. das absprechende, aber etwas zu weitgehende Urteil von Gumplovicz in dem Aufsatz „Anthropologie und natürliche Auslese“, Polit.-anthrop. Revue I, 2.

⁹ Crania suecica antiqua. Beschreibung schwedischer Vorzeitschädel (117) aus der Steinzeit, dem Bronze- und Eisenalter u. s. w. von Gustaf Retzius. Mit 100 Tafeln in Lichtdruck. Stockholm, schwedische Ausgabe 1899, deutsche 1900.

¹⁰ Om den germaniska ras-typen. Rede bei der Niederlegung des Vorsitzes in der k. Akademie der Wissenschaften gehalten von Gustaf Retzius. Stockholm 1901. — Von mir in der Naturwissenschaftlichen Wochenschrift N. F. I, 29 besprochen.

¹¹ Das kommt davon her, dass in Schweden, wie auch in den Elbherzög-tümern erst im vorigen Jahrhundert Familiennamen eingeführt wurden und das Christentum mit wenigen Heiligennamen die unerschöpfliche Fülle der heidnischen verdrängte.

¹² Centralblatt für Anthropologie II, 1 und L'Anthropologie VII, 6. Der Längsdurchmesser verkürzt sich in der Horizontalen durchschnittlich um 1,0 mm, was selbstverständlich bei runden Köpfen den Index etwas mehr beeinflusst. Ob, wie Ammon glaubt annehmen zu dürfen, der Längenunterschied bei mittleren Köpfen geringer ist als bei länglichen und runden, scheint mir nicht ganz sicher.

¹³ Anthropologie der Badener, S 125/6. „Das grüne Auge verrät durch seine Farbenzusammensetzung seinen Charakter als Mischlingsauge, denn es ist fast nie einfarbig grün, sondern meist aus braunen, sternförmigen Strahlen, die vom Pupillenrand ausgehen, und aus blauen oder grauen Sektoren, die vom Ciliarrand hineinreichen, zusammengesetzt.“

¹⁴ Manche Anthropologen, z. B. Livi, unterscheiden nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauch auch schwarze (neri) Augen, doch ist, auch bei den farbstoffreichsten Rassen, die Regenhogenhaut nie rein schwarz.

¹⁵ Congrès Internat. d'anthrop. à Stockholm 1874, Comptes rendus.

¹⁶ Nyström, Archiv f. Anthropologie XXVII, hat dies auf Grund von angeblich 500 Untersuchungen behauptet. Da aber der übrige Inhalt der Abhandlung „Über die Formveränderungen des menschlichen Schädels und deren Ursachen“ entschieden verfehlt ist, der Verfasser in seiner Heimat auch nicht im Rufe eines zuverlässigen Forschers steht, müssen weitere einwandfreie Untersuchungen abgewartet werden. — Wie viele Deutsche am Ende des dreissigjährigen Krieges in den schwedischen Heeren gedient haben, geht u. a. aus einer Taufkanne der Kirche von Altenheim a. Rh. hervor, die laut Inschrift im Jahre 1649 von vier „schwedischen Dragonern, M. Bohn, Fendrich, G. Kratz, Korporal, H. Ohrdorff, R. Schuhmann“ (lauter deutsche Namen) zu „immerwährendem Gedächtnus“ gestiftet worden ist.

¹⁷ Undersögelser af archaeologisk materiale etc., Aarbøger f. nord. oldkyndighed 1891. — Die Untersuchungen sind auch sonst sehr lehrreich.

¹⁸ Verhandlungen des 7. Internat. Geographenkongresses. Berlin, London, Paris 1901.

¹⁹ Vergl. u. a. meinen Aufsatz „Germanische Rasse“ in der Deutschen Zeitschrift, II-6, 1900.

²⁰ Naturwissenschaftl. Wochenschrift, N. F. I 10, 1901.

²¹ In bezug auf Einwanderungen sagt der schwedische Forscher: „Aus der Untersuchung der zugänglichen Vorzeitschädel geht hervor, dass in den genannten Zeitaltern Einwanderungen neuer Rassenbestandteile in irgend erheblichem Masse nicht stattgefunden, dass vielmehr die nämlichen Rassen Schweden in der ganzen uns bisher bekannten Vorzeit bewohnt haben; dem kann man das Urteil beifügen, dass die heutige Bevölkerung in ihren Grundbestandteilen unmittelbar von dem Vorzeitvolke abstammt, wenn auch im Laufe der Zeiten das Eindringen fremden Blutes nicht ganz zu vermeiden war.“

²² So besonders „Herkunft und Urgeschichte der Arier“, Heidelberg, Hörning, 1899. — Vergl. auch meine auf M. Muchs „Heimat der Indogermanen“ sich beziehende Auseinandersetzung in den Mitteilungen der Wiener Anthr. Gesellschaft, XXXII 5/6, „Gehört Dänemark mit zur Urheimat der Arier?“

²³ Statistics, medical and anthropological, compiled under direction of the secretary of war. New-York 1875.

²⁴ Sessions-undersögelsernes og recruterings-statistikens betydningen for videnskaben og staten. Kristiania 1875.

²⁵ Die Körpergrösse der Wehrpflichtigen im Grossherzogtum Baden in den Jahren 1840—1864, Karlsruhe 1894.

²⁶ Om svenskarnes kroppslängd, Ymer 1896. — Antropologiska undersökningar å värnpliktige, Tidskrift för militär hälsovård XXII, 1897. — Über die Körperlänge der schwedischen Wehrpflichtigen, Centralblatt für Anthropologie, I 4, 1896.

²⁷ Archiv für Anthropologie IX, 1876.

²⁸ Redogörelse för den hygieniska undersökningen, Stockholm 1885.

²⁹ Wenn wir annehmen, dass die 21jährige Mannschaft noch nicht ausgewachsen ist und die höheren Stände noch grösser sind, ergibt sich für die Schweden das sehr beträchtliche Durchschnittsmass von 1,72 m.

³⁰ Anatomisk-antropologiske undersøgelser af de lange extremitet — knokler fra Norges befolkning i oldtid og middelalder. Videnskabselskabets skrifter I. Kristiania 1901.

³¹ Antropometria militare, Roma 1896. — Antropometria, Milano 1900. — Zur Anthropologie der Badener, Jena 1899.

³² Im berechtigten Widerspruch gegen die Auswüchse und Übertreibungen der Schädelmessung sind einige Anthropologen zu weit gegangen und haben das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Vergl. meinen Vortrag „Geschichte und Bedeutung der Schädelmessung“, Vrhdl. d. naturhist.-med. Vereins zu Heidelberg, N. F. VI 5.

³³ Om formen af Nordboernes Cranier, Stockholm 1842.

³⁴ Om ett fynd af mennisko-skeletter etc. Läkareförenings förhandlingar, N. F. II, Upsala 1896/7.

³⁵ Bulletins de la Soc. d'Anthr. de Paris, 2s III, 1868. — Auf den Unterschied zwischen länglichen und runden Köpfen hat Broca nicht geachtet.

³⁶ Jena, G. Fischer, 1893.

³⁷ Wachstum und Bau des menschlichen Schädels. Leipzig 1862.

³⁸ Badische Schädel, Archiv für Anthropologie XXI.

³⁹ Insofern als ein Abrundungsfehler beim Querdurchmesser viel mehr ins Gewicht fällt. Setzen wir nach den Leichenversuchen von Welcker (10), Broca (6), Fürst (7,3) die durchschnittliche Dicke der Weichteile im Längsdurchmesser gleich 7,7 mm, im Querdurchmesser (9,5, 8, 9) gleich

8,8 mm. so würde beispielsweise ein 20 cm langer und 16 cm breiter Kopf mit Index 80 einen Schädelindex von 78,6 haben, mit meiner Abrundung dagegen von 78,9, ein sehr geringfügiger Unterschied.

⁴⁰ *Crania selecta*, Petersburg 1859.

⁴¹ In einer Anmerkung auf S. 94 der „Anthropologie der Badener“ tritt auch Ammon dieser Anschauung bei: „Es ist leicht einzusehen, daß die Brocasche Angabe von zwei Einheiten schon bei dolichocephalen Köpfen zu gross ist und dass der Unterschied um so kleiner wird, je mehr die Köpfe sich der runden Form nähern. Nach Welcker schwankt die Dicke der Kopfschwarte in der Längsrichtung von 5 bis 15 mm, in der Breite von 6 bis 13 mm, im Mittel beträgt sie also 10 mm, wie auch Wilser angibt. Der Abzug von 1,0 cm ändert das Verhältnis der Durchmesser einer Ellipse, bei einem Kreis aber tritt keine Änderung ein . . .“

⁴² Es darf nicht unerwähnt bleiben, dass der aus der durchschnittlichen Länge und Breite sich ergebende Index 78,27 um 0,42 höher ist als der aus den Indices der einzelnen Landschaften berechnete von 77,85; es rührt dies von den weggelassenen Dezimalen her. — Grosse Erleichterung des mühsamen Rechengeschäfts bringen dem Anthropologen die kürzlich von Fürst herausgegebenen, sehr handlichen und zweckmässigen „Indextabellen“, Jena. G. Fischer, 1902.

⁴³ *Crania Germaniae meridionalis occidentalis*. Freiburg 1875. — Badische Schädel, Archiv für Anthropologie XXI.

⁴⁴ Die von Ammon zu Grunde gelegte Kollmannsche Zusammenstellung (Korrespondenzblatt für Anthropologie 1882) gibt kein richtiges Bild, da sie zu viele Schädel aus späterer Zeit und von offenbar fremder Rasse (über 30 % Rundköpfe) enthält; aber auch sie zeigt einen mittleren Index von nur 77.

⁴⁵ Nach früheren, allerdings nicht sehr zahlreichen Untersuchungen von v. Haartman (*Försök at bestämma den genuina racen af de i Finland boende folk*, 1845) und Retzius (*Finska Kranier*) schien es, als seien die Karelrier weniger rundköpfig. Diese von vornherein wenig wahrscheinliche Annahme ist nun durch Westerlunds umfassende Erhebungen berichtigt (*Studier i Finlands antropologi*, Helsingfors 1900).

⁴⁶ Vergl. meinen Auszug im Globus (LXII 22) aus seinem russischen Werke: *Anthropometrische Untersuchungen der männlichen grossrussischen Bevölkerung etc.*, mit 34 Lichtdrucktafeln, 16 Karten und 3 Holzschnitten. Moskau 1892.

⁴⁷ *Etude anthropométrique élémentaire des principales races de la France*. Paris 1883.

⁴⁸ *Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien*. N. F. XV, 1895.

⁴⁹ a. O.

⁵⁰ Unter den Schädeln von Glasinae sind 66 % länglich (Index unter 80) und 34 % rundlich. Weisbach, *Altbosnische Schädel*, *Mitteilungen der Anthr. Ges. in Wien*, N. F. XVII, 1897.

⁵¹ Viele Skelette und Schädel aus slavischen Gräbern sind von germanischen nicht zu unterscheiden, gehören also der reinen nordeuropäischen Rasse (*Homo europaeus* Linné) an.

⁵² La face en réalité n'est point courte, sagt Broca (a. a. O.).

⁵³ Die Formen des Ober- und Unterkiefers bei den Europäern. Vortrag, Sonderabdruck aus der Schweiz. Vierteljahrsschrift für Zahnheilkunde. Zürich 1892. Von mir im Globus (LXII 20) besprochen. — In einem Aufsatz über „Menschenrassen“ (Archiv f. Anthr. XXVII, Globus LXXXII 24) spricht Kollmann nur noch von der „temporären Persistenz“ derselben. Eine völlige Unveränderlichkeit annehmen, heisst ja auch die Entwicklungslehre leugnen. Jede Rasse ist, obwohl der Mensch das Endglied einer langen Entwicklungskette bildet, selbstverständlich veränderlich, kann aber, wenn äussere Anstösse fehlen und Blutmischung ausgeschlossen ist, durch Jahrtausende sich ziemlich gleich bleiben. Wenn K. sagt, jede neue Rasse müsse in einer „Periode der Mutation“ auftreten und die Rassen zwar für „variabel“, aber nicht für „mutabel“ erklärt, so ist dies ein Widerspruch. Mutationen nach de Vries gibt es wahrscheinlich nur bei Pflanzen.

⁵⁴ Der Einfluss des Lebensalters auf die anthropologischen Charaktere. Sozial-anthropologische Studien I. Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie I, 1899.

⁵⁵ Nach den allerdings nicht sehr zahlreichen und zumteil an Kindern ausgeführten Untersuchungen von Arbo, Faye, Hansen (veröffentlicht durch Topinard, Revue d'Anthropologie, 3. s. IV 1889) und Westergaard (Skoleboernes har- og oejenfarve. Nationaløkonomisk Tidsskrift, Kjøbenhavn 1893) sind Norwegen und Dänemark Länder mit ziemlich hellfarbiger Bevölkerung; die hellen Farben nehmen aber von der schwedischen Grenze nach Westen ab, so dass Dänemark entschieden dunkler ist als Schweden. Westerlund (Fennia XVIII 2, Kuopio 1900) hat an 4650 Mann festgestellt, dass in Finnland die Schweden die hellsten sind, die Finnen von Westen nach Osten dunkler werden. Aus der deutschen Schulkinderuntersuchung geht trotz ihren, zumteil unvermeidlichen, Mängeln doch hervor, dass die hellen Farben von Norden nach Süden abnehmen. England ist nach Beddoe (9080 Erwachsene) ziemlich hell (60% helle Augen und 67% lichte, blonde und hellbraune Haare), die dunkeln Farben nehmen aber von Osten nach Westen merklich zu. In Russland sind die Anwohner der Ostsee die hellsten, die Bewohner des Binnenlandes die dunkelsten. Für Frankreich ist durch Topinard festgestellt, dass die nördlichen Teile am Ärmelkanal die hellsten, die südlichen am Mittelmeer die dunkelsten sind. Von den Italienern haben nach Livi nur drei vom Hundert blaue Augen mit hellen Haaren, 25 dagegen braune Augen mit schwarzen Haaren. In Spanien kommen (nach Hoyos Sainz und Aranzadi) auf 16% helle, 20% dunkelbraune Augen. Retzius kann daher in seinem Rückblick mit vollem Recht als Endergebnis anführen, dass die skandinavische Halbinsel „ein helläugiges blondhaariges Zentrum“ bildet und dass von diesem aus die hellen Farben „radialwärts nach verschiedenen Richtungen hin“ abnehmen.

⁵⁴ Grössere Einwanderungen, von denen Altertumskunde und Geschichte nichts wissen, können auch aus naturwissenschaftlichen Gründen, wie dies Arbo (Ymer 1900, Heft 1, Globus LXXVIII 6 und Intern. Centralblatt für Anthropologie VII 4, 1902) versucht hat, nicht gefolgert werden. Vgl. meinen Aufsatz „Hafva folkinvandringar ägt rum i Skandinavien?“, Ymer 1902, Heft 4.

⁵⁷ Zur Theorie der reinen Rassentypen. Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie II 3. — Man darf diese Dinge nicht rein mathematisch behandeln.

⁵⁸ Vgl. meinen Aufsatz „Gobineau und seine Rassenlehre“, Politisch-anthropologische Revue I 8, 1902.

⁵⁹ Schon in meiner „Herkunft der Deutschen“, 1885, habe ich das im allgemeinen, später in zahlreichen Vorträgen und Abhandlungen im einzelnen nachgewiesen, so z. B. den „Wanderungen der Schwaben“, Beilage des Staatsanzeigers für Württemberg 1902, No. 7—10, in „Worms und die Burgunden“ Zeitschrift „Vom Rhein“ I 1902, und den „Wanderungen der Wandalen“, Deutsche Erde 1903.

⁶⁰ a. O.

⁶¹ Kimbern, Teutonen, Ambronen haben gleiches Anrecht auf den Namen „Germanen“ wie auf „Kelten“. Vgl. meinen Aufsatz „Kelten und Germanen“, Deutsche Zeitschrift II 11, 1900.

⁶² Diese Ansicht wurde zum erstenmal öffentlich ausgesprochen in meinem Vortrag über die „Keltenfrage“ im Karlsruher Altertumsverein am 29. Dezember 1881.

Die Tätigkeit der Bakterien im Boden.

Von Dr. Franz Muth,

Assistent an der Grossh. badischen landwirtschaftlichen Versuchsanstalt Augustenberg und
Privatdozent für Botanik an der Grossh. Technischen Hochschule in Karlsruhe.

Zu den bedeutungsvollsten Gebieten der naturwissenschaftlichen Forschung, welche ihre Entwicklung den letzten Dezennien des durch weittragende, wissenschaftliche Errungenschaften so bemerkenswerten vergangenen Jahrhunderts verdanken, gehört ohne Zweifel die Bakteriologie. Spielen doch die Bakterien, diese kleinen Lebewesen eine so wichtige Rolle im grossen Haushalt der Natur, als ständige Mitarbeiter und Regulatoren bei deren ewigem Kreislauf, als Vermittler organischen Werdens und Vergehens, Lebens und Sterbens. Von grösster Wichtigkeit sind hierbei die biologischen Vorgänge im Boden oder wie der Dichter sagt, der Mutter Erde, an welcher in erster Linie wiederum Bakterien beteiligt sind. Wenn unsere Kenntnisse über diese Vorgänge und über die Bakterien im Boden zurzeit auch noch in den ersten Stadien ihrer Entwicklung begriffen sind, so genügen sie doch, die grosse Bedeutung der Bodenbakteriologie in nationalökonomischer, hygienischer und wissenschaftlicher Beziehung uns vor Augen zu führen.

Die bakteriologischen Verhältnisse und Vorgänge im Boden haben deshalb auch die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich gelenkt und dürfte es manchem erwünscht sein, einen Einblick in das Bakterienleben des Bodens zu gewinnen. Diesem Zweck möchten unsere Ausführungen dienen, die einen kurzen und in keiner Weise erschöpfenden, sondern nur das Wichtigste berücksichtigenden Überblick über den jetzigen Stand unserer Kenntnisse der Bodenbakterien und ihrer Tätigkeit bieten möchten.

Auf die geschichtliche Entwicklung der Bakteriologie, sowie auf die vielseitige, täglich gewaltig wachsende Literatur über die Bodenbakterien wollen wir nicht näher eingehen, da dies nicht im Rahmen eines kurzen Referates über den Stand einer Frage liegt. Die wichtigste Literatur findet man im bakteriologischen Zentralblatt, besonders in dessen zweiter Abteilung und im Jahres-

bericht für Gärungsorganismen von A. Koch, ferner in dem ersten Bande der technischen Mycologie von Franz Lafar und dem System der Bakterien von Walther Migula. Besonders erwähnt sei ferner Wollnys bekanntes Werk über die Zersetzung der organischen Stoffe und die Humusbildungen, sowie die Vorlesungen über Bakterien von Alfred Fischer. Einen unser Thema speziell in landwirtschaftlicher Beziehung in der Hauptsache erschöpfenden Überblick hat J. Behrens in einem bemerkenswerten Vortrag über die Arbeit der Bakterien im Boden und im Dünger gegeben, der in den Arbeiten der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft 1901, Heft 64, pag. 108—144 veröffentlicht ist.

Es seien nun zunächst einige kurze, allgemeine Bemerkungen über die Bakterien vorausgeschickt. Dieselben sind ausserordentlich kleine, mitunter an der Grenze des mittelst unserer heutigen optischen Hilfsmittel noch Sichtbaren stehende, einzellige, zu den Spaltpflanzen (Schizophyta) gehörende chlorophyllose Organismen. Sie vermehren sich durch Zweiteilung, „Spaltung in der Mitte“, weshalb man sie mit den in dieser Beziehung ähnlich sich verhaltenden, vielfach, aber nicht mit Recht als ihre Stammeseltern angesehenen Spaltalgen (Schizophyceae) zu der bereits erwähnten Abteilung der Spaltpflanzen vereinigt hat. Manche der höher organisierten, zu den sogenannten Scheidenbakterien gehörende Arten besitzen ausserdem die Fähigkeit, sich durch teils unbeweglich, teils bewegliche Gonidien zu vermehren. (Vergl. die Fig. 19 u. 20 S. 120 u. 121). Es sind dies aus dem gemeinschaftlichen Verbande in der Scheide entweder direkt oder nach besonderen, nur bei der Gonidienbildung zu beobachtenden Teilungsvorgängen heraustretende, sich nach dem Verlassen der Scheide zu neuen Kolonien entwickelnde Zellen.

Viele, aber nicht alle Arten vermögen sog. Dauerzellen oder Endosporen zu bilden, die sich durch eine bedeutend festere und dickere Membran, sowie durch ihre Widerstandsfähigkeit gegen Hitze, chemische Mittel und andere Einwirkungen der vegetativen Zelle gegenüber auszeichnen. Während nach den Untersuchungen von Brefeld die letzteren z. B. bei dem allerwärts verbreiteten Heubazillus (*Bacillus subtilis* Fig. 1) nach 20 Minuten dauerndem Aufenthalt in siedendem Wasser sicher vernichtet sind, bedarf es bei den Sporen dieses Organismus eines dreistündigen Kochens, um sie zu töten.



Manche Bakterien vermögen sich zu bewegen. Dies geschieht fast ausschliesslich durch feine, an einem oder den beiden Polen der Bakterienzelle befindliche oder über deren ganze Oberfläche zerstreute Plasmafäden, den sog. Geisseln. (Vergl. die Fig. 1 a, 9, 10, 11, 12, 13, 18 b.) Die Bakterien leben entweder einzeln oder sie sind infolge einer vielen Arten eigenen Gallerthülle zu verschieden gestalteten Kolonien vereinigt. Durch weitgehende Gallertbildung entstandene Kolonien, die dabei von fester Konsistenz sind, bezeichnet man mit dem Namen Zoogloea. (Vergl. die Fig. 12 und 13.)

Die Bakterien wachsen teils nur bei Luftzutritt, also bei Gegenwart von freiem Sauerstoff (sog. Aërobionten), teils sowohl bei Luftzutritt, als auch bei Luftabschluss (fakultative Anaërobionten), während wieder andere Arten sich nur bei vollständigem Luftabschluss zu entwickeln vermögen. Es sind dies die obligatorischen Anaërobionten. Die meisten Bakterien kann man auf künstlichen Nährböden züchten, die sich in ihrer Zusammensetzung möglichst den natürlichen Ernährungsverhältnissen des zu züchtenden Organismus nähern müssen. Man unterscheidet flüssige und feste Nährböden. Mit der Einführung der letzteren und der Plattenkultur durch Robert Koch war eine brauchbare Methode zur Reinkultur geschaffen und der Grundstein zur erfolgreichen, wissenschaftlichen bakteriologischen Forschung gelegt. Diejenige Temperatur, bei der ein Organismus am besten gedeiht, ist sein Wachstumsoptimum, diejenige niederste oder höchste Temperatur, bei welcher er gerade noch wächst, sein Minimum resp. Maximum. Bei einigen Arten treten in der künstlichen Kultur unter besonderen Umständen abweichende Gestalten auf, die wir als Degenerations- oder Involutionsformen bezeichnen. (Vergl. die Fig. 7 v. x. y.)

Von hohem wissenschaftlichem Interesse und grosser praktischer Bedeutung sind die Bakterien in physiologischer Beziehung.



Fig. 1.

Bacillus subtilis Ehrenberg. (Heubazillus).

a. Schwärmende Stäbchen mit Geisseln,

b. Sporen bildende Fäden.

500fache Vergr. Nach Migula.

Einige vermögen sich vollständig autonom zu ernähren, sich ausschliesslich mit anorganischen Nährsubstanzen begnügend; die meisten aber sind auf organische Verbindungen angewiesen, verschiedenartige und oft weitgehende, als Gärungen bezeichnete Zersetzungen ihres Nährsubstrates hervorrufend. Unter Gärungen verstehen wir hier in des Wortes weitester Bedeutung alle unter Mitwirkung von Mikroorganismen verlaufenden chemischen Vorgänge. Wir unterscheiden hauptsächlich Oxydations-, Reduktions-, hydrolytische und synthetische Gärungen. Eine vollständige bis zur Mineralisierung, d. h. bis zur Bildung von Kohlensäure, Wasser und Ammoniak gehende Oxydationsgärung organischer Substanzen nennen wir Verwesung, während wir als Fäulnis solche biologische Prozesse bezeichnen, die bei Luftabschluss oder bei ungenügendem Luftzutritt unter Bildung von übelriechenden Gasen verlaufen. Neuerdings versteht man unter Fäulnis auch speziell die komplizierten Gärungserscheinungen der Eiweisskörper. Vermoderung nennt man eine noch nicht genügend aufgeklärte, im Boden besonders bei Gegenwart von pflanzlichen, stickstoffarmen, cellulosehaltigen Stoffen auftretende, durch die Bildung von Huminsubstanzen charakterisierte Zersetzung. Die meisten dieser chemischen Prozesse werden, wie man annimmt, durch von den Bakterien erzeugte Enzyme ausgelöst. Über die chemische Konstitution und den Wirkungsmechanismus dieser in den Organismen weitverbreiteten, in der Regel ausserordentlich leicht zersetzlichen Enzyme wissen wir zurzeit noch nichts Sicheres. Ihre Wichtigkeit für die lebende Bakterienzelle besteht in erster Linie in der Umbildung der Nährmedien in für dieselbe assimilierbare Verbindungen und in der Energieerzeugung durch Oxydationsprozesse oder durch Wärme erzeugende exothermische Spaltungsvorgänge. Die Bakterien sind, wie wir wissen, mit einigen wenigen Ausnahmen bei ihrer Ernährung auf organische Verbindungen angewiesen. Viele derselben leben von toten Körpern, andere dagegen auf resp. in lebenden Organismen. Die ersteren begnügen sich gleichsam damit, sich in Häusern, die von ihren Bewohnern verlassen wurden, anzusiedeln, dieselben einzureissen, dabei das für sie Brauchbare verwendend, und der Natur Bausteine für neue Bauten zu liefern. Wir nennen solche Arten Saprophyten. Andere aber dringen, um bei dem Bilde zu bleiben, auch in bewohnte Häuser ein, wo sich dann ihr Verhältnis zu deren

Bewohnern bald freundlich, bald feindlich gestaltet. Im ersteren Falle sprechen wir von Symbiose. Ein schönes Beispiel dafür werden wir später bei den Knöllchenbakterien der Leguminosen kennen lernen. Wirt und Gast vertragen sich hier sehr gut und sind sich in ihrem Fortkommen durch gegenseitige Leistungen behilflich. Aber nicht immer gestalten sich die Dinge so friedlich; oft fällt der Eindringling über seinen Wirt in räuberischer Absicht her, ihn aussaugend und schliesslich tötend. Wir sprechen dann von Parasitismus. Zwischen diesen beiden Extremen gibt es viele Zwischenstufen, wo sich das Verhältnis zwischen Wirt und Gast mehr oder weniger günstig für den ersteren gestaltet.

Interessant ist die Erscheinung, dass manche Arten sowohl als Saprophyten, wie auch als Parasiten auftreten können. Wir bezeichnen solche Arten als fakultative Saprophyten resp. Parasiten, während wir die Bakterien, die nur als Saprophyten oder als Parasiten zu leben im stande sind, obligatorische Saprophyten resp. Parasiten nennen. Von besonderer Wichtigkeit ist die Frage, auf welche wir später noch einmal zurückkommen werden, welche Saprophyten vermögen parasitäre Eigenschaften anzunehmen und unter welchen Umständen tun sie dies? Sehr verschieden und mannigfaltig sind die Stoffwechselprodukte der Bakterien. Nach der Art derselben hat man die Schizomyceten auch in zymogene, chromogene und pathogene eingeteilt, eine Einteilung, die mehr auf empirischen Beobachtungen, als auf wissenschaftlichen Grundlagen beruht. Die zymogenen, die Erreger der gewöhnlichen Gärungen, erzeugen hauptsächlich Kohlensäure, Alkohole, fette Säuren etc., die chromogenen bilden Farbstoffe, die pathogenen Ptomaine, Toxine und Toxalbumine. Unter Ptomainen verstehen wir ungiftige, unter Toxinen giftige Stoffwechselprodukte der Bakterien von ähnlicher chemischer Konstitution, wie die Alkaloide. Von ganz anderer chemischer Zusammensetzung und von hervorragender Giftigkeit sind die Toxalbumine, die eine ähnliche molekulare Konstitution, wie die Eiweisstoffe haben, denen sie ausserordentlich nahe stehen und von denen sie wahrscheinlich abstammen.

Die Bakterien, über deren Abgrenzung die Ansichten zum Teil noch auseinandergehen, hat man in verschiedener Weise eingeteilt. Am meisten Verbreitung und Anerkennung haben in den letzten Jahren das System von Alfred Fischer und dasjenige

von Walther Migula gefunden. Die Hauptgruppen des letzteren seien hier mitgeteilt:

1. Ordnung: Eubacteria.

1. Familie Coccaceae (Kugelbakterien) (Fig. 8).
2. „ Bacteriaceae (Stäbchenbakterien) (Fig. 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 b).
3. „ Spirillaceae (Schraubenbakterien) (Fig. 18 a).
4. „ Chlamydobacteriaceae (Scheidenbakterien) (Fig. 19 und 20).

2. Ordnung: Thiobacteria (Schwefelbakterien).

1. Familie Beggiatoaceae (Farblose Schwefelbakterien) (Fig. 18 c).
2. „ Rhodobacteriaceae (Rote oder violette Schwefelbakterien) (Fig. 18 a und b).

Bei den Chlamydobacteriaceen sind die cylindrischen Zellen zu Fäden angeordnet, die von einer mehr oder weniger deutlich sichtbaren scheidenartigen Membran umgeben sind. Die Schwefelbakterien unterscheiden sich von ihren Kollegen in erster Linie in physiologischer Beziehung; es scheint, dass bei denselben der Schwefelwasserstoff bei der Atmung dieselbe Rolle spielt, wie bei den übrigen Organismen die Kohlenstoffverbindungen. Die zweite Familie ist durch einen Bakteriopurpurin genannten Farbstoff, über dessen Funktion noch keine zuverlässigen Untersuchungen vorliegen, ausgezeichnet.

Betrachten wir zunächst jetzt den Boden als Träger von Bakterien. Ausser diesen finden wir im Boden noch mancherlei andere Mikroorganismen, die für die biologischen Prozesse in demselben von Bedeutung sind. Die wichtigsten Vertreter dieser kleinen Lebewesen gehören zu den Schimmelpilzen und zu den Hefearten; auch tierische Organismen sind von Bedeutung; ferner verdienen die den Bakterien nahe verwandten Spaltalgen hier besondere Erwähnung.

Schon in der Mitte des 8. Dezenniums des vergangenen Jahrhunderts haben Birch-Hirschfeld und von Fodor, allerdings mit ungenügenden Hilfsmitteln den Boden auf seinen Bakteriengehalt untersucht. Sie fanden, dass schon in wenigen Milligrammen der oberflächlichen Bodenschichten Bakterien enthalten sind, während die in einer Tiefe von vier Metern entnommenen Proben meist

steril waren. Sie beobachteten auch schon, dass die im Boden vorkommenden Spaltpilze meistens zu den Stäbchenbakterien gehören. In die Tiefe gelangen die Bakterien unter normalen Umständen, wie bereits von Fodor durch Versuche nachgewiesen hat, sehr schwer. Um Bodenproben vollständig rein aus beliebiger Tiefe zur bakteriologischen Untersuchung, die zur Erzielung sorgfältiger Resultate sofort nach Entnahme ausgeführt werden muss, holen zu können, sind verschiedene Instrumente konstruiert worden. Das bekannteste ist wohl das von E. Fränkel angegebene. Dieser sogenannte Röhrenbohrer hat unten einen circa 12 cm langen, 2 cm tiefen mit einer Hülse verschliessbaren, löffelförmigen Ausschnitt zur Aufnahme der Erdprobe. Die Hülse ist so konstruiert, dass sie sich bei Linksdrehung schliesst, bei Rechtsdrehung öffnet.

Um die Zahl der in einer Bodenprobe vorhandenen Bakterienkeime zu bestimmen, geht man in der Regel in der Weise vor, dass man eine abgemessene, kleine Quantität ($\frac{1}{50}$ ccm) des Materials in ein Reagenzröhrchen mit geschmolzener Nährgelatine einfüllt, die Probe dann gründlich in der Gelatine verteilt und die letztere durch Drehung des Röhrchens in geeigneter Lage an dessen Wandungen nach der Esmarch'schen Methode ausrollt. Bei sehr keimreichen Erdproben empfiehlt es sich, eine grössere Menge in einer bestimmten Quantität Wasser durch Schütteln zu verteilen und davon erst einen Bruchteil in die Gelatine zu bringen. Diese letztere wird nach der vielfach variirten Vorschrift von Robert Koch in folgender Weise dargestellt. In Fleischwasser, das man durch 24stündiges Macerieren von feingehacktem, möglichst fettfreiem Rindfleisch mit seinem doppelten Gewicht Wasser und vorsichtiges Auspressen gewonnen hat, löst man 10% Gelatine, 1% Pepton und $\frac{1}{2}$ % Kochsalz. Neuerdings verwendet man auch mit Bodeninfus hergestellte Nährböden. Aber sowohl diese wie die gewöhnliche Nährgelatine haben den Nachteil, dass viele Bodenbakterien auf denselben nicht wachsen. Wir werden in den sog. Nitrifikationsorganismen z. B. Bakterien kennen lernen, die auf Nährböden mit löslichen organischen Verbindungen überhaupt nicht zu gedeihen vermögen. Wenn auf diese Weise die quantitative bakteriologische Bodenuntersuchung auf Schwierigkeiten stösst, so ist dies bei der qualitativen noch mehr der Fall, da es bei sehr vielen Kolonien

oft ausserordentlich schwierig ist, eine sichere Diagnose zu stellen. Neuerdings hat Gottheil in allerdings richtiger Erkenntnis, dass die Systematik der Bodenbakterien noch sehr mangelhaft ist, in dankenswerter Weise versucht, etwas mehr Sicherheit und Klarheit in die Verhältnisse zu bringen. In wie weit ihm dies gelungen ist, wird die Zukunft zeigen.

Wie bereits erwähnt, nimmt die Zahl der Bakterien nach der Tiefe rasch ab, und zwar ist diese Abnahme zuerst eine allmähliche bis etwa $1\frac{1}{4}$ m. Dort wird dieselbe plötzlich eine sehr rapide, so dass schon wenige Decimeter tiefer der Boden fast vollständig keimfrei angetroffen wird. Die Schichte des Grundwassers ist gewöhnlich keimfrei. Im allgemeinen finden sich an der Oberfläche mehr aërobe, der Tiefe zu mehr anaërobe Arten. Folgende im Jahre 1886/87 von E. Fränkel mit Boden aus der Umgebung von Potsdam erhaltenen Zahlen mögen hier mitgeteilt sein.

Tiefe der Boden- schicht	Menge der in 1 ccm etwa vorhandenen Bakterienkeime									
	24. April	27. Mai	12. Juni	9. Juli	14. August	4. Sept.	2 Oktober	8. Nov.	16. März	
Oberfläche . .	—	150000	110000	—	300000	95000	130000	55000	80000	
1/2 Meter . .	70000	200000	90000	—	240000	65000	100000	75000	85000	
3/4 " . .	250000	—	—	—	40200	3000	—	8000	—	
1 " . .	1000	2000	2000	4300	80000	600	40000	7000	3000	
1 1/2 " . .	200	15000	2000	400	500	700	600	200	300	
2 " . .	—	2000	600	300	400	—	700	100	200	
2 1/2 " . .	250	500	700	—	100	—	150	—	150	
3 " . .	—	3000	100	—	—	150	—	1500	100	
3 1/2 " . .	—	—	800	—	—	100	1400	50	700	
4 " . .	—	—	150	300	—	—	600	—	—	

Die Zahlen, die natürlich keinerlei Anspruch auf absolute Zuverlässigkeit haben, zeigen uns ferner, dass der Bakteriengehalt des Bodens zu verschiedenen Jahreszeiten bedeutend wechselt, dass also das Klima einen nicht zu verkennenden Einfluss auf die Entwicklung der Bodenmikroorganismen hat. Ausserdem sind für den Gehalt an Art- und Individuenzahl noch andere Umstände von Bedeutung. Schon die Art, die Beschaffenheit und die Reaktion des Bodens spielen hierbei eine grosse Rolle; in sauren und nassen Moorböden z. B. treten die Bakterien überhaupt den Schimmelpilzen gegenüber zurück. Eine interessante Studie über das Vorkommen von Bakterien in verschiedenen Böden hat Fülles in der Nähe von Freiburg i. B. ausgeführt; er suchte neben der Zahl der vorhandenen Keime auch die Art derselben nach Möglichkeit festzustellen. Dabei zeigte es sich, dass die verschiedenen untersuchten Wiesen- und Walderden das bunteste Gemenge von Bakterien enthielten, regelmässiger waren die Verhältnisse bei Weinberg- und bei Ackererde. In verschiedenen Tiefen fand Fülles einen deutlichen Unterschied der Arten. Eine auffallende Regelmässigkeit und Einfachheit zeigte die Bakterienflora auf grösseren Höhen des Schwarzwalds. Fülles beobachtete bei Bodenproben von dem Gipfel des Rosskopfs und des Schauinsland fast stets nur ein Gemenge des Heubazillus (*Bacillus subtilis*) (Fig. 1) und des Wurzelbazillus (*Bacillus mycoides*). Im allgemeinen zeigte sich der Waldboden am ärmsten an Bakterien; es folgte dann die Weinbergerde, hierauf der Wiesengrund und schliesslich der Ackerboden. In stark verschmutzten Böden in der Nähe von Wohnungen sind die Bakterien in der Regel überaus zahlreich vorhanden. So fand A. Maggiora in einem Gramm einer Bodenprobe, die er einem Turiner Strassendamm entnommen hatte, 78 Millionen Bakterien. Im allgemeinen dürfte der Bakteriengehalt des Bodens proportional seinem Gehalt an organischer Substanz sein.

Besondere Erwähnung verdient die in ihren Ursachen nicht genügend aufgeklärte Tatsache, dass gewisse Arten plötzlich in grosser Menge auftreten und ebenso rasch wieder verschwinden, um entweder dem gewöhnlichen Bakteriengemisch zu weichen oder aber durch eine andere stark verbreitete Art ersetzt zu werden. Diese Erscheinung ist besonders in epidemiologischer Beziehung von grossem Interesse.

Über den Einfluss des Pflanzenbestandes auf die Bakterienflora des Bodens unter sonst gleichen Bedingungen sind die Ansichten geteilt. Während Caron auf Grund von Untersuchungen auf seinem Gut Ellenbach angibt, dass der Bakteriengehalt am grössten ist nach der Schwarzbrache, der die Hackfrüchte und dann der Klee folgen und die Halmfrüchte mit dem geringsten Bakteriengehalte am Schluss stehen, behauptet Remy gestützt auf diesbezügliche Versuche, dass sich nirgend ein bestimmter Einfluss der angebauten Pflanzen auf die Bakterienflora des Bodens nachweisen lasse. Neuerdings hat man auch versucht, aus dem Bakteriengehalte des Bodens auf dessen Fruchtbarkeit Schlüsse zu ziehen. Remy, der diese Frage näher verfolgt hat, ist zur Ansicht gelangt, dass aus dem Bakteriengehalt ein einigermaßen sicheres Urteil über den Zustand eines Bodens nicht gewonnen werden könne. Ein zahlreicher Bakterienstand, meint Remy, sei wohl als ein erwünschtes Symptom zu betrachten, welches im Gefolge, bzw. als Begleiterscheinung sorgsamer Bodenkultur aufzutreten pflege; doch die Frage, inwieweit der grossen Bakterienzahl Bedeutung als Ursache der Bodenfruchtbarkeit zukomme, lasse sich an der Hand von Zählungen natürlich nicht entscheiden.

Wie gelangen nun die Bakterien in den Boden?

Von aussen her durch die Luft, durch das Wasser, durch die Dungstoffe, durch Tiere und Pflanzen, bei letzteren hauptsächlich mit den Samen. Auch in sogenannten jungfräulichen Boden gelangen Bakterien und andere Mikroorganismen auf diese Weise. Bei der Bildung der Böden durch Verwitterung und der Umwandlung von nacktem Sand in Heide spielt die Übertragung von Bakterien eine wichtige Rolle. Es wurde bereits einmal darauf hingewiesen, dass Luft, Wasser und Boden in bakterieller Beziehung in steter Wechselwirkung mit einander stehen. Der Haupt- und Stammsitz der meisten Bakterien ist aber stets der Boden; von ihm aus werden sie durch das Wasser und besonders durch die Luft überall hin verbreitet. Im praktischen Leben finden wir deshalb die Bakterien bald bei erwünschter, bald bei unerwünschter Tätigkeit. Bei der Bereitung von Brot, Butter, Käse, Getränken, Essig, in unsern Nahrungsmittelkonserven, bei der Fermentation des Tabaks, bei der Selbsterhitzung und der eventuellen Selbstentzündung von aufgehäuften Pflanzenstoffen, wie Heu, Baumwolle, Hopfen, in der Gerberei, bei der Zucker-

fabrikation, überall finden wir die Bakterien bald als angenehme oder unentbehrliche Helfer, bald als sehr unangenehme und schädliche Gäste. Auf die schlimmsten der letzteren, auf die pathogenen Bakterien, soweit sie im Boden vorzukommen pflegen, werden wir später noch besonders einzugehen haben. Hier wollen wir zunächst die Tätigkeit der Bakterien im Boden selbst verfolgen, die wir in eine physikalische, die Bodenstruktur beeinflussende und in eine chemische einteilen können. In ersterer Richtung hat Suringar interessante Beobachtungen gemacht, die sich allerdings auch auf andere Bodenmikroorganismen erstrecken. Er nimmt auf Grund seiner Versuche an, dass die sogenannte Krümelstruktur des Bodens in erster Linie das Produkt biologischer Vorgänge ist. Bereits vor Suringar hatte J. Behrens an die Wahrnehmung, dass Schimmelpilze in trockenem Tabakpulver eine krümelartige Struktur, wie sie der Ackerkrume eigen ist, erzeugten, die Vermutung geknüpft, dass die Gare des Bodens wenigstens zum Teil das Werk von Schimmelpilzen und Bakterien ist, welche die kleinsten Bodenteilchen untereinander zu grösseren Krümeln verbinden. Auch die Untersuchungen von Gräbner über die Entstehung der norddeutschen Heide, welche in der von Engler und Drude herausgegebenen Sammlung pflanzengeographischer Monographien veröffentlicht sind, haben in dieser Beziehung beachtenswerte Resultate ergeben. Gräbner geht nämlich bei Erörterung der Probleme der Heideforschung auch auf die Bedeutung der Mikroorganismen bei der Bildung der Heide aus nacktem Sand ein. Es kommt hierbei nach seinen Ausführungen ausschliesslich die Tätigkeit niederer Organismen in Frage, namentlich die von blaugrünen Algen (Schizophyceen), welche als Pioniere der Vegetation die losen Sandkörner fest verbinden, dadurch allmählich eine Bodendecke schaffend, die auch andere Pflanzen aufzunehmen vermag.

Von Bedeutung für die physikalische Beschaffenheit des Bodens sind die Mikroorganismen auch durch ihren Gasaustausch und die günstige Wirkung des Stalldüngers auf die Beschaffenheit des Bodens, dürfte nicht in letzter Linie auf dieser Ursache beruhen; unter Umständen dürften sie ferner bis zu einem gewissen Grad Einfluss auf die Bodentemperatur haben.

Wenden wir uns nun zur chemischen Tätigkeit der Bakterien im Boden; sie erstreckt sich sowohl auf dessen anorganische,

wie auf dessen organische Bestandteile, vorwiegend aber auf die letzteren. Bei dem organischen Kreislauf der Natur sehen wir die Bakterien überall als Helfer und Vermittler und der Kreislauf des Stickstoffs ist, wie wir nach den bisherigen Untersuchungen wenigstens annehmen müssen, ausschliesslich ihr Werk. Dass das Absorptionsvermögen des Bodens für organische Stoffe und seine Bindekraft durch einen hohen Bakteriengehalt erhöht wird, ist bekannt. Die Einwirkung der Bakterien auf die anorganischen Bodenbestandteile erstreckt sich hauptsächlich auf die Karbonate, Phosphate, Sulfate des Calciums und des Magnesiums sowie auf die Silicate der Alkalimetalle. Diese Fähigkeit der Bakterien macht dieselben, es sei dies hier nebenbei bemerkt, auch zu Mitarbeitern bei manchen geologischen Vorgängen unserer Erde.

Weitgehend und tief eingreifend ist ihre Einwirkung auf die organischen Bestandteile des Bodens. Fällt ihnen doch vor allem die Aufräumung und Mineralisierung der tierischen und pflanzlichen Leichen zu, ohne welche der organische Kreislauf alsbald ins Stocken geraten müsste. Wir werden die hier in Betracht kommenden organischen Verbindungen in stickstoffhaltige und in stickstofffreie einteilen und die einzelnen Körperklassen mit den entsprechenden Bakteriengruppen nach Möglichkeit einzeln verfolgen.

Zuerst wollen wir die Bodenbakterien in ihrer gewaltigen und wichtigen Arbeit beim Kreislauf des Stickstoffs näher betrachten. Dabei können wir fünf Bakteriengruppen unterscheiden, von welchen die Angehörigen der ersten Gruppe insofern die grösste Bedeutung haben, weil fast sämtlicher gebundener Stickstoff unseres Planeten durch sie festgelegt wird und die bei den übrigen vier Gruppen in Betracht kommenden Stickstoffverbindungen den Vertretern der ersten ihre Entstehung verdanken.

Erste Gruppe: Die stickstoffbindenden Bakterien; sie vermögen den freien Stickstoff der Atmosphäre zu assimilieren und den Kulturpflanzen nutzbar zu machen.

Zweite Gruppe: Die Ammoniakbildner; sie liefern bei ihrem Lebensprozess aus stickstoffhaltigen organischen Substanzen Ammoniak.

Dritte Gruppe: Die Nitrosobakterien; sie oxydieren das Ammoniak zu salpetriger Säure; man nennt sie zusammen mit der nächstfolgenden Gruppe Nitrifikationsorganismen.

Vierte Gruppe: Die Nitrobakterien; sie oxydieren die salpetrige Säure zu Salpetersäure.

Fünfte Gruppe: Die Denitrifikationsbakterien; sie reduzieren Salpeter und salpetrige Säure unter Ausscheidung von Stickstoff.

Wenden wir uns nun zu den Vertretern unserer ersten Gruppe, die den sonst so schwer zugänglichen und so passiv sich verhaltenden elementaren Stickstoff der Atmosphäre, dieser unerschöpflichen Stickstoffquelle bei ihrem Stoffwechsel festzulegen imstande sind. Wir kennen bisher nur einen rein anorganischen Vorgang in der Natur, bei welchem freier Stickstoff in nennenswerter Menge in gebundenem Zustand übergeführt wird, nämlich beim Durchschlagen des elektrischen Funkens durch ein Gemisch von Stickstoff, Sauerstoff und Wassergas wie dies bei Gewittern der Fall ist und wobei salpetrigsaures und salpetersaures Ammonium gebildet wird, das mit den atmosphärischen Niederschlägen auf den Boden füllt. Die auf diese Weise in den Boden gelangenden Stickstoffverbindungen sind indes so gering, dass sie in keiner Weise genügen würden, den Stickstoffbedarf unserer Kulturpflanzen zu decken. Auch das natürlich vorkommende Kalium-, Natrium- und Calciumnitrat ist auf biologischem Wege entstanden. Neuerdings hat sich die Technik mit dem Problem, den Luftstickstoff auf elektrischem Wege in gebundenem Zustand zu gewinnen, beschäftigt. Inwieweit dieser Weg zu dem heiss ersehnten Ziele führen und inwieweit die Elektrizität den Bodenbakterien Konkurrenz zu machen imstande ist, darüber lässt sich bei den noch im Versuchsstadium befindlichen Bemühungen zur Zeit noch nichts sagen. Erwähnt sei indes noch, dass sich in Amerika in der Atmospheric Products Company eine Gesellschaft gegründet hat, welche einen Teil der Kräfte des Niagara zur Oxydation des Luftstickstoffs auf elektrischem Wege auszunützen sucht. Zu diesem Zwecke wird die atmosphärische Luft durch einen zylinderförmigen Apparat getrieben, der 414 000 elektrische Funken in der Minute erzeugt. Ein Teil des Stickstoffs wird oxydiert und durch Auffangen in Soda- oder Pottaschelösung als Nitrit oder Nitrat gewonnen. Neuerdings wird das Reaktionsprodukt in Schwefelsäure aufgefangen und in Form von Nitroschwefelsäure gewonnen. Nach den in letzter Zeit veröffentlichten Versuchen über die Oxydation des Stickstoffs in der elektrischen Flamme von W. Muthmann und H. Hofer ist die Menge des oxydierten

Stickstoffs ungefähr proportional der Geschwindigkeit des Luftstroms und dem Druck, unter welchem dieser Luftstrom steht, umgekehrt proportional der Entfernung der Elektroden infolge der höheren Temperatur der elektrischen Flamme und dem rascheren Wechsel des Stromes.*

Bei den stickstoffbindenden Bakterien haben wir frei im Boden lebende und in Gemeinschaft (Symbiose) mit andern höheren Pflanzen lebende (Knöllchenbakterien) zu unterscheiden. Betrachten wir zunächst die ersteren.

Der Nachweis, dass in unbebautem Boden eine Bindung und Festlegung des Stickstoffs der Luft und zwar durch Mikroben stattfindet, ist das Verdienst von Berthelot, der im Jahre 1885 die ersten diesbezüglichen Beobachtungen machte. Der Beweis, dass es sich hierbei um biologische Vorgänge handelt, lieferte die einfache Operation der Sterilisation, nach welcher eine Stickstoffzunahme im Boden ausblieb. Sehr interessant war sodann ein Versuch von Déhérain, welcher zeigte, dass in einem kräftig nitrifizierenden Boden, dessen Stickstoffgehalt in sieben Monaten von 1,72 g auf 2,29 g pro 1 kg bei richtiger Versuchsanstellung stieg. Dass in der Ackererde von den Bodenmikroorganismen nur die Bakterien die Fähigkeit, den Luftstickstoff zu binden, besitzen, haben zuerst Berthelot und Kossowitz nachgewiesen. Ersterer

* In letzter Zeit hat sich in Berlin eine Gesellschaft unter der Leitung der Firma Siemens und Halske zur technischen Gewinnung von Stickstoffverbindungen aus der Luft gebildet. Durch Pressen von Luft, die durch Leiten über metallisches Kupfer zum grössten Teil von ihrem Sauerstoffgehalt befreit ist, in geschmolzenes Calciumcarbid bildet sich Calciumcyanamid ($\text{CN} \cdot \text{N} \cdot \text{Ca}$). Die gleiche Verbindung, der man den Namen Kalkstickstoff gegeben hat, entsteht, wenn man in die mittelst des elektrischen Stromes geschmolzene Mischung von Kohle und kohlensaurem Kalk, das Ausgangsmaterial des Carbids, Stickstoff leitet. Der Kalkstickstoff, der nach den Versuchen von M. Gerlach und P. Wagner bereits selbst einen hohen Wert als Stickstoffdünger für unsere Kulturpflanzen hat, liefert bei der Behandlung mit überhitztem Wasserdampf Ammoniak, so dass nach der Ansicht der beiden Forscher auf diese Weise die Gewinnung von Ammoniakverbindungen in unbegrenzter Menge ermöglicht ist. Es sei hier auch noch an die Nitride erinnert, die bei der Zersetzung ebenfalls Ammoniak liefern und die vielleicht einmal Bedeutung für dessen technische Darstellung gewinnen können. Besonders das Stickstoffmagnesium Mg_2N_2 , das sich leicht durch Leiten von Stickstoff über Magnesiumfeile bei Rotglut als grünlichgelbes Pulver darstellen lässt und das mit Wasser in Ammoniak und Magnesiumoxydhydrat zerfällt, hat bereits die Aufmerksamkeit auf sich gelenkt.

war es auch, der zuerst die Arten zu ermitteln suchte, welche diese merkwürdige Eigenschaft besitzen. Während er aber diese Fähigkeit verschiedenen Bodenbakterien zuschreibt, kam später Winogradsky, welchem genialen Forscher wir die bedeutendsten Untersuchungen auf dem Gebiete der Bodenbakteriologie verdanken, auf Grund seiner Untersuchungen zu dem Schlusse, dass nur das von ihm isolierte und als *Clostridium Pasteurianum* bezeichnete Bakterium dies zu tun vermag. Doch scheint es nach den neuesten Untersuchungen von Beyerinck, von Gerlach und Vogel und von Winogradsky selbst, dass *Clostridium Pasteurianum* nicht der einzige Organismus im Boden ist, der zur Stickstoffassimilation befähigt ist. Die wichtigsten Arbeiten Winogradskys über diesen Mikroorganismus sind in den Jahren 1895 bis 1900 erschienen. Seine schwierige Reinkultur gelang dem Forscher mit Hilfe der von ihm geschaffenen elektiven Kultur. Das Prinzip derselben besteht nach der Definition seines Schülers Omeliansky darin, dass man zunächst Bedingungen ausfindig macht, bei welchen der gewünschte Prozess am sichersten hervorgerufen und durch eine Reihe von Generationen mit den Eigenschaften und Intensität zu erhalten ist. Sind die Bedingungen richtig getroffen, so bewirkt die Kultur eine Auslese oder Selektion in dem Ausgangsmaterial in dem Sinne, dass die gesuchte Art bald die Oberhand gewinnt und die übrigen, denen das Substrat schlecht bekommt, bald verdrängt. Die Kulturen werden dann an der spezifischen Art so reich, dass es kaum Schwierigkeiten bietet, dieselben aufzudecken und ihre Eigenschaften zu studieren. Erst dann sucht man sie weiter zu reinigen und schliesslich zu isolieren.

Das *Clostridium Pasteurianum* ist ein streng anaërober, sporenbildender, mit geringer Bewegungsfähigkeit ausgestatteter, zu den Buttersäurefermenten gehörender Organismus. Er vermag in stickstofffreien Nährmedien zu leben unter Assimilation des atmosphärischen Stickstoffs, indem er Zucker in einem gewissen Verhältnis zur Stickstoffassimilation vergärt. Dabei dient ihm als Kraftquelle zur Assimilation des Stickstoffs die bei der Gärung des Zuckers frei werdende Energie.

Bemerkenswert ist, dass das, wie bereits erwähnt, streng anaërobe *Clostridium Pasteurianum* auch aërob gezüchtet werden kann, doch nur bei Gegenwart von andern aëroben, den Sauer-

stoff absorbierenden Mikroorganismen, ein Verhältnis, das wohl den natürlichen Bedingungen im Boden entspricht.

Im verflossenen Jahre hat Winogradsky eine genaue Darstellung der Morphologie der *Clostridium Pasteurianum* und seiner Eigenschaften als Buttersäureferment gegeben. Als beste Nährlösung verwendet Winogradsky eine solche von folgender Zusammensetzung:

Kaliumphosphat 1,0,
Magnesiumsulfat 0,2,
Chlornatrium, Eisensulfat, Mangansulfat sehr geringe Spuren.
Dextrose 20,0,
Destilliertes, ammoniakfreies Wasser 1 l.

Dieser Lösung wird frisch gewaschene Kreide im Überschuss zur Neutralisation der bei der Gärung entstehenden Säuren zu-




Fig. 2.

Clostridium Pasteurianum Winogradsky.

Schematische Figuren. Nach Winogradsky. Erklärung im Text.

gegeben. In einer solchen Nährlösung werden für 1 g vergorenen Zuckers $2\frac{1}{2}$ —3 Milligramm Stickstoff gebunden.

Die Wichtigkeit und das grosse Interesse, welches das *Clostridium Pasteurianum* für Theorie und Praxis hat, rechtfertigt es wohl, dass wir dasselbe etwas näher betrachten, umso mehr, als dieser Bazillus nach Winogradskys Angaben einen der höchst differenzierten bakteriellen Organismen darstellt.

Winogradsky unterscheidet acht Stadien seines Entwicklungszyklus, die durch die beistehenden schematischen Figuren 1—8 illustriert werden; er beschreibt dieselben folgendermassen:

„Stadium 1. Junge Bazillen meistens $1,2$ — $1,3 \mu$ ($1 \mu = \frac{1}{1000}$ mm) dick, $1,5$ — 2μ lang; bleiben bei günstigen Bedingungen gewöhnlich kurz infolge der wiederholten lebhaften Teilungen; sie sind meistens gerade, zylindrisch, mit abgestutzten Enden; färben sich rasch und intensiv mit gewöhnlichen basischen Anilinfarben. Jod lässt sie gelb. Das ist das Stadium der Vermehrung des Mikrobiums, das eigentliche Propagationsstadium. Dies dauert.

durch immerwährende Zweiteilungen neu entstehend, bis die Vermehrung und auch die Gärung ihren Höhepunkt erreicht hat. Mit dem Aufhören der Teilungen wird das nächste Stadium eingeleitet.

Stadium 2. Die verlängerten Stäbchen, statt sich zu teilen, haben sich zur Spindelform aufgebläht (daher die Bezeichnung *Clostridium* vom griechischen *κλωστήρ*, Spindel), in dem gleichzeitig ihr Plasma das charakteristische körnige Aussehen bekommt. Anilinfarben färben jetzt schwächer, durchsichtiger, dagegen ruft Jod die intensive violettbraune Färbung hervor.

Stadium 3. Es tritt an einem Pole der Spindel ein sporogenes Korn (in Einzahl) auf, das gleich bei seinem Auftreten die ovale Form der fertigen Sporen besitzt, doch kleiner ist; Methylenblau färbt es fast schwarz, die übrigen Teile der Zelle dagegen hellblau. Umgekehrt wird durch Jod der durch Methylenblau hell gefärbte Teil ganz dunkel violettbraun, das sporogene Korn fast farblos.

Stadium 4. Das sporogene Korn wird grösser und wendet sich ab; es färbt sich jetzt nur schwer mit gewöhnlichen Anilinfarben, behält aber schon etwas die Ziehlsche Färbung. Die Mutterzelle färbt sich noch mit Jod, aber schwächer.

Stadium 5. Die Spore bekommt ihre endgültige Grösse und liegt meistens nicht mehr ~~polar~~, sondern mehr in der Mitte der Mutterzelle und ist mit einem hellen Hof umgeben. Jod gibt nur noch in der Peripherie einen schwachen violetten Saum oder gibt der Zelle ein eigentümliches marmoriertes oder gesprenkeltes Aussehen.

Stadium 6 beginnt mit dem Verschwinden der charakteristischen Jodfärbung. Die Spore ist reif und trotzdem zeigt die dieselbe umschliessende Mutterzelle keine Zeichen der Verquellung oder Zerstörung, wie man das so allgemein bei der endogenen Sporenbildung der Bazillen beobachtet; sie ist nunmehr mit einer hyalinen Substanz (um die Spore herum) gefüllt, immer aber scharf konturiert; die hyaline Substanz dagegen kaum. Nun wird, höchst wahrscheinlich durch die aufquellende „hyaline Substanz“ die Membran der Mutterzelle an einem Pole gesprengt und weit geöffnet.

Stadium 7. Die reife Spore, $1,6 \mu$ lang, $1,3 \mu$ breit, liegt jetzt in einem abgerundet dreieckigen Gallertpolsterchen, der

„Sporenkapsel“ eingebettet, das an zwei Seiten scharfe und an der dritten — der Öffnung — verwachsene Konturen zeigt. Am schärfsten treten die Verhältnisse hervor, wenn man die reifen Sporen nicht in Flüssigkeit, sondern in feuchter Luft untersucht, indem man also das Wasser von unten unter dem Deckglase wegsaugt oder fast austrocknen lässt. Es kann selbstverständlich kein Zweifel aufkommen, dass diese Sporenkapsel ein Produkt der Metamorphose der Mutterzelle ist. Sobald man frisch gereifte, sowie mehrere Jahre alte Sporen in frische, zuckerhaltige Nährlösung unter anaëroben Bedingungen bringt, beginnt sofort die Keimung, welche in ganz charakteristischer Weise erfolgt. Die Spore schwillt bedeutend an und wird als erstes Zeichen der beginnenden Keimung, durch wässriges Methylenblau oder Gentiana färbbar. Dann wird die Sporenwand an dem gegen die Kapselöffnung gerichteten Pole der Spore durchlöchert und das junge Stäbchen tritt, die Sporenwand zurücklassend, aus dieser und der Sporenkapsel heraus.

Stadium 8. Es ist bemerkenswert, dass die polare Keimung immer in der Richtung gegen die Kapselöffnung erfolgt, woraus zu erhellen scheint, dass diese Richtung von dem Bau der Sporenkapsel bestimmt wird. Manchmal beginnt das noch in der Kapsel teilweise steckende Stäbchen sich sofort zu teilen und auf diese Weise entstehen Bazillenpaare, sowie kurze Ketten, auf deren einem Ende die Sporenkapsel wie ein Fingerhut noch aufsitzt.“

Wie diese Beschreibung zeigt, steht das *Clostridium Pasteurianum* den *Amylobacter*- und den *Granulobacter*-Arten morphologisch sehr nahe, nur in der Bildung und der Keimung der Sporen unterscheidet er sich von diesen so nahverwandten Formen. Das *Clostridium Pasteurianum* besitzt nach den Angaben Winogradskys zweifellos eine allerdings sehr begrenzte Schwärmfähigkeit. Wird der Organismus auf Kartoffeln oder Mohrrüben im Vacuum oder im sauerstofffreien Raume gezüchtet, so treten Involutionenformen, vermutlich infolge der gebildeten Fettsäuren auf. Setzt man die Kultur auf den bezeichneten Nährböden fort, so wachsen die Stäbchen immer mehr zu Fäden heran, während die *Clostridium*-Bildung und mit ihr die Sporenbildung zurücktritt. Endlich wird das Mikrobium gänzlich asporogen und es gelingt nicht wieder, die Fähigkeit Sporen zu erzeugen zu restituieren, es entsteht gleichsam eine asporogene Varietät. Nicht weniger interessant

ist, wie Winogradskys Untersuchungen zeigen, der Organismus in physiologischer Beziehung. Wie wir bereits erörtert, ist es ein obligat anaërobes Buttersäureferment mit der uns hier besonders wichtigen Eigenschaft, ohne gebundenen Stickstoff als Nahrung zu benötigen, den atmosphärischen Stickstoff assimilieren zu können.

Clostridium Pasteurianum gehört zu den am wenigsten polyphagen Buttersäurefermenten; es vermag nur Dextrose, Laevulose, Rohrzucker, Inulin, Galactose und Dextrin zu vergären. Dabei wird das Kohlehydrat unter fast ausschliesslicher Bildung von Buttersäure, Essigsäure, Kohlensäure und Wasserstoff gespalten. Auf die Fettsäuren entfallen dabei 42—45 % des Zuckers, wie sich Winogradsky ausdrückt, der Rest wird vergast. Als unbeständige Nebenprodukte treten geringe Mengen von verschiedenen Alkoholen und Spuren von Milchsäure auf. Eigentümlich ist, dass *Clostridium Pasteurianum* unter den gewöhnlichen Bedingungen eines anaëroben Gärversuchs gegen die Qualität der Stickstoffnahrung sehr empfindlich ist. In Gegenwart von Ammon als einziger Stickstoffquelle werden nur Dextrose, Rohrzucker und Inulin angegriffen.

Von den verschiedenen von Winogradsky ausgeführten Gärversuchen sei der folgende hier erwähnt:

40,0 Dextrose in 1000 ccm der oben angegebenen Salzlösung gelöst ergaben im Stickstoffstrome innerhalb 20 Tagen:

53,6 mg Gewinn an Stickstoff, davon entfallen auf den abfiltrierten Bodensatz 42,3 mg, auf das Filtrat selbst 11,3 mg. An flüchtigen Säuren, die nach Duclaux bestimmt wurden, waren 3,714 g Essigsäure und 14,164 g Buttersäure, insgesamt also 17,878 g erzeugt worden. Das Verhältnis der bei der Gärung auftretenden Gase, der Kohlensäure und des Wasserstoffs wechselt während deren Verlauf. So bestand das Gasgemisch bei einem Versuch am Anfang der Gärung aus 11,00 % Kohlensäure und 89,00 % Wasserstoff, während der Mitte aus 40,2 % Kohlensäure und 59,8 % Wasserstoff und am Schlusse aus 54,9 % Kohlensäure und 45,10 % Wasserstoff. Die Gärprodukte sind indes nicht konstant in den gegenseitigen Verhältnissen, sondern auch bei genau der gleichen Versuchsanstellung nach der Ausdrucksweise Winogradskys aus inneren Gründen verschieden. Auch über die Verbreitung des *Clostridium Pasteurianum* im Boden sind im Winogradskyschen

Institut Untersuchungen angestellt worden. Nach diesen findet man dasselbe nicht in jedem Boden. So konnte der Organismus in 18 aus verschiedenen Teilen Russlands stammenden Bodenproben nicht konstatiert werden. An seiner Stelle aber trat in diesen ein ähnliches, stickstoffassimilierendes Buttersäureferment auf, das Winogradsky ebenfalls als eine *Clostridium*-Art bezeichnet. Dieselbe konnte bisher nur unvollständig untersucht werden, da sie noch auf keinem festen Nährsubstrat gewachsen und deshalb ihre Reinkultur bis jetzt noch nicht gelungen ist.

Winogradsky ist der Ansicht, dass die beiden von ihm beobachteten *Clostridium*-Arten die einzigen Bodenbakterien sind, welche die Fähigkeit der Stickstoffassimilation besitzen. Im Gegensatz zu ihm schreibt Beyerinck diese Eigenschaft noch andern Missorganismen zu, diese als oligonitrophyle bezeichnend. Darunter versteht Beyerinck solche Mikroben, welche in freier Konkurrenz mit der übrigen Mikrobenvelt sich in Nährmedien entwickeln ohne absichtlich zugefügte Stickstoffverbindungen, aber auch ohne Entfernung der letzten Spuren derselben. Sie haben nach Beyerinck das Vermögen, den freien atmosphärischen Stickstoff binden und zu ihrer Ernährung verwenden zu können; es werden als solche Organismen nicht nur Bakterien, sondern auch niedere Algen bezeichnet. Beyerinck hat aus Gartenerde zwei oligonitrophyle Bakterien isoliert; den einen Organismus hat er als *Azotobacter chroococcum*, eine nach seinen späteren Ausführungen sehr variable Art, den andern als *Azotobacter agilis* bezeichnet.

Gerlach und Vogel haben aus verschiedenen Böden grosse Bazillen isoliert, welche die Eigenschaft der Stickstoffassimilation besitzen und die sie zur *Azotobacter*-Gruppe Beyerincks stellen. Ob diese eventuell mit den von Winogradsky aufgestellten stickstoffassimilierenden beiden *Clostridium*-Arten, von denen die zweite allerdings der näheren Untersuchung noch harrt, identisch sind oder ob es sich wirklich um verschiedene Organismen handelt, dürften erst eingehende Untersuchungen zeigen. Beyerinck hat dem bereits erwähnten *Azotobacter chroococcum*, den die Figur 3 in Reinkultur zeigt, zusammen mit A. van Delden eine grössere Studie gewidmet. Die beiden Forscher kommen zu dem Ergebnis, dass *Azotobacter chroococcum* in Reinkultur in einer stickstoffarmen Nährlösung nicht zu einer beträchtlichen Stickstoff-

assimilation befähigt ist und dass dessen Wachstum und Vermehrung darin, trotzdem die Kohlenstoffquelle noch lange nicht erschöpft ist, bald aufhört. Sie ziehen daraus den Schluss, dass die Vermehrung des Organismus in sogenannten Rohkulturen, d. h. zusammen mit andern Bodenmikroorganismen, die mit dem vollständigen Verbrauch der Kohlenstoffnahrung und Stickstoffbindung begleitet ist, auf der Symbiose mit anderen Mikroben beruhe. Die Symbionten werden in sporenbildende, zur Gattung *Granulobacter* gehörende, und in sporenlose unterschieden, wovon *Aërobacter aërogenes* und *Bacillus radiobacter*, eine als neu und als formenreich bezeichnete Art, in ihrem Verhalten weiter verfolgt werden.

Alle *Granulobacter*-Arten, sowohl die aëroben, wie die anaëroben besitzen nach der Angabe von Beyerinck an und für sich schon die Fähigkeit, den freien Stickstoff zu binden; doch zeigen sie erst bei der Symbiose mit *Azotobacter chroococcum* ihre Fähigkeit in dieser Beziehung in Vollendung. *Aërobacter aërogenes* und *Bacillus Radiobacter* dagegen können in Reinkultur keinen Stickstoff binden, erlangen diese Fähigkeit aber bei der Symbiose mit *Azotobacter chroococcum*. Über die Symbiose von *Granulobacter*-Arten und *Azotobacter chroococcum* bemerken die Forscher, dass die Anzahl der *Granulobacter*-Bazillen, welche in der Nährlösung zum üppigen Wachstum von *Azotobacter* genügen, so gering sei, dass man sie zwischen den Tausenden *Azotobacter*-zellen mikroskopisch nur schwierig finden könne. Daraus schliessen sie: „Es scheint ausgeschlossen, dass die Bedeutung der Symbiose mit *Azotobacter chroococcum* für die stickstoffbindenden Bakterien ausschliesslich in einer Herabsetzung des Sauerstoffdrucks durch das intensive Wachstum der letzteren gelegen sein kann, obschon es feststeht, dass diese Herabsetzung für die Stickstoffbindung, wenigstens für *Granulobacter* sicher günstig ist.“

Man müsste daraus die Folgerung ziehen, dass das erste Assimilationsprodukt des freien Stickstoffs eine Stickstoffverbindung ist, welche in der Flüssigkeit ausserhalb der erzeugenden Bakterien in freiem Zustand vorkommt und für alle diejenigen



Fig. 3.

Azotobacter chroococcum
Beyerinck.

Bakterien aus einer jungen Kultur
nach 24 Stunden; nach dem Photo-
gramm Beyerincks gezeichnet.
1000fache Vergr.

Mikroben oder andere Organismen erreichbar ist, welche damit ihr Stickstoffbedürfnis befriedigen können, so dass hier der eine Organismus (Bakterie) die Leguminose vertreten würde. Welcher Art dieses Stickstoffassimilationsprodukt ist, kann man sich zur Zeit nur in beweislosen Vermutungen ergehen.

Aus diesen Untersuchungen, deren Richtigkeit vorausgesetzt, müssen wir den wichtigen Schluss ziehen, dass die sogenannten oligonitrophylen Mikroorganismen das von den Buttersäurebakterien, denen Beyerinck ganz allgemein das Stickstoffbindungsvermögen zuschreibt, erzeugte Stickstoffassimilationsprodukt in sich aufnehmen, während die stickstoffbindenden Organismen dies selbst gar nicht oder nur in ganz bescheidenem Masse zu tun vermögen. Nur das *Clostridium Pasteurianum* soll hierin eine wesentliche Ausnahme machen, indem es sein Stickstoffassimilationsprodukt selbst aufzunehmen vermag. Diese Eigenschaft soll nun *Azotobacter chroococcum*, das im Boden nach Beyerinck und van Delden ganz allgemein vorkommt, in ganz hervorragender Weise besitzen und zwar soll der gebundene Stickstoff in *Azotobacter chroococcum* in der Hauptsache als Protoplasma gegenwärtig sein. Im Boden soll nun nach den weiteren Ausführungen von Beyerinck und van Delden „dieses Bakterieneiweiss durch andere Bakterien zu Ammonsalz abgebrochen werden,“ das dann durch die Nitrifikationsorganismen in Nitrat übergeführt würde; auf diese Weise würde also in kurzer Zeit der freie atmosphärische Stickstoff in Nitrat verwandelt.

Für die Stickstoffgabe ist aber nach den allerdings sehr hypothetisch erscheinenden Ausführungen der *Azotobacter chroococcum* und seine Analogen zu uns unbekannten Gegendiensten den stickstoffbindenden Bakterien gegenüber verpflichtet, so dass also nur in dieser Symbiose und in der dazu nötigen Akkomodation der beiden Organismen die Stickstoffestlegung stattfinden kann und damit ein ähnliches Verhältnis existiert wie bei den Knöllchenbakterien der Leguminosen.

Diesen Angaben und Schlussfolgerungen Beyerincks und van Delden haben Gerlach und Vogel widersprochen. Sie sind auf Grund ihrer Beobachtungen wieder zu dem bereits oben angeführten Ergebnis gelangt, dass *Azotobacter chroococcum* in Reinkultur zur Stickstoffassimilation befähigt ist. Diese soll nach der Ansicht der beiden Forscher im Innern des Bakterienleibes

durch direkte Anlagerung des elementaren Stickstoffs an organische Kohlenstoffverbindungen erfolgen. Die auf diese Weise gebildeten stickstoffhaltigen Stoffe sollen dann in der Zelle in Eiweiss übergeführt werden, das erst nach dem Absterben der Bakterien in gewöhnlicher Weise abgebaut und in Verbindungen übergeführt würde, die auch unseren Kulturgewächsen bei ihrer Ernährung zugänglich sind.

Wenden wir uns jetzt zur Stickstoffbindung durch die Knöllchenbakterien der Leguminosen. Schon die alten Römer wussten, dass Hülsenfrüchte den Boden verbessern und der bekannte und verdiente Schultz-Lupitz hat in richtiger Erkenntnis der grossen Bedeutung derselben, speziell für die Kultur leichter Böden die Gründüngung mit Leguminosen in sein Wirtschaftssystem mit bestem Erfolg eingeführt. Es war sodann das grosse Verdienst von Hellriegel und Willfahrt, gezeigt zu haben, dass die Hülsenfrüchte betreffs der Stickstoffernährung sich anders verhalten, wie die Halmfrüchte, dass die ersteren im Gegensatz zu den letzteren den Stickstoff der Luft zu ihrer Ernährung zu verwenden vermögen und dass sie an ihren Wurzeln normal kleinere oder grössere Anschwellungen, Knöllchen besitzen (vergl. Fig. 4 und 5) von deren Zahl und Ausbildung das Gedeihen der ganzen Pflanze abhängt. Die diesbezüglichen klassischen Untersuchungen sind in den Jahren 1884—1886 ausgeführt. Woronin hatte 1866 zuerst erkannt, dass im Innern der Zellen dieser Knöllchen massenhaft Bakterien leben, deren erste Reinkultur Beyerinck 1888 auf Leguminosenblättersud-Gelatine gelang. Prazmowski, dem wir wichtige Untersuchungen über das Eindringen der Bakterien in die Wurzel und über die Entwicklung der Knöllchen verdanken, erzeugte einige Jahre später mit Reinkulturen an Hülsenfrüchten typische Wurzelknöllchen. Dass diese, die bereits von Malpighi im Jahre 1687 erwähnt werden, in sterilisiertem Boden nicht erscheinen, hat zuerst Frank konstatiert. Es ist nicht möglich, hier weiter auf die vielseitige und interessante Literatur über die Wurzelknöllchen der Leguminosen einzugehen. Eine verdienstliche Zusammenstellung derselben, sowie über die Assimilation des freien elementaren Stickstoffs überhaupt hat E. Jacobitz im VII. Bande (1901) der zweiten Abteilung des Zentralblattes für Bakteriologie, Parasitenkunde und Infektionskrankheiten Seite 783 u. f. gegeben.

Die in den Wurzelknöllchen der Hülsenfrüchte lebenden Bakterien dürften, wie zuerst Beyerinck angenommen hat, wohl alle der von diesem als *Bacillus radicolica* bezeichneten Stammart angehören. Vielfach ist diese Frage erörtert und verfolgt worden, besonders Nobbe und Hiltner haben sich eingehend damit beschäftigt. In letzter Zeit hat Buhler diese bezügliche Untersuchungen mit folgendem Ergebnis ausgeführt:



Fig. 4.

Wurzeln mit Bakterienknöllchen.

a. Keimpflanze der Futterwicke (*Vicia sativa*).

b. Keimpflanze der Erbsen (*Pisum sativum*).

c. Robinie (*Robinia Pseud-Acacia*)

I. Wurzel mit jungen Knöllchen.

II. Alte Knöllchen.

d. Schwarz-Erle (*Alnus glutinosa*).

$\frac{1}{2}$ der natürl. Grösse. Nach der Natur gezeichnet von Rudolf Dittmann.

1. Die Bakterien der Leguminosenknöllchen gehören sämtlich einer Art *Bacillus radicolica* Beyerinck an.

2. Die aus den Knöllchen einer bestimmten Leguminosenspecies stammenden Bakterien sind gerade dieser Art scharf angepasst.

3. Wegen dieser Anpassung an die Art kann eine gegenseitige Vertretung der Bakterien, die von der Arteinheit abgeleitet werden müsste, nicht ohne weiteres statthaben.

Demnach würden wir also die den einzelnen Leguminosenspezies angepassten Bakterien als Rassen einer Stammart auffassen müssen. Allerdings fehlt es nicht an Forschern, die auf Grund von Untersuchungen dieser Ansicht widersprechen. So behauptet Déhérain, dass die Wurzelknöllchen der gelben Lupine von nur für diese spezifischen, von denen der blauen und weissen Lupine verschiedenen Bakterien erzeugt werden, aus welchem Grunde die Einführung der Kultur der gelben Lupine auf Böden, die noch nie vorher damit bebaut gewesen, auf grosse Schwierigkeiten stosse. Auch Thiele zieht aus der Beobachtung, dass in demselben Boden perennierende Lupinen unter normaler Knöllchenbildung sich gut entwickelten, während einjährige Lupinen nicht gedeihen, den Schluss, dass die für die letzteren spezifischen von denen der mehrjährigen Lupine verschiedenen Bakterien nicht vorhanden waren. Es ist also trotz der vielen, über die Knöllchenbakterien ausgeführten Arbeiten die Frage noch nicht als gelöst anzusehen. :

Im Boden sind die Organismen, wie wir aus dem Gedeihen der Hülsenfrüchte in den meisten Böden schliessen müssen, jedenfalls sehr weit verbreitet; wo sie nicht vorhanden sind, gedeihen auch keine Leguminosen. Man kann diesem Übelstand durch Übertragung von Erde, der sogenannten Impferde aus Feldern, auf denen Leguminosen gut gedeihen und die man als leguminosensicher bezeichnet, oder durch Impfung der betreffenden Äcker mit Wurzelknöllchen-Reinkulturen in der Regel abhelfen.

Verfolgen wir nun diese überaus wichtigen und merkwürdigen Organismen und ihr Verhalten bei künstlicher Kultur und im Boden, soweit die Verhältnisse in letzterer Beziehung erforscht sind; allerdings harrt hier trotz der vielen Untersuchungen über diese Bakterien noch mancher Punkt der Aufklärung. Wie bereits erwähnt, gedeihen die Mikroben auf künstlichen Nährböden von passender Zusammensetzung; am besten hat sich hier ein Absud von Leguminosenblättern mit 7 % Gelatine $\frac{1}{2}$ % Rohr-




Fig. 5.

Längsschnitt eines jungen
Lupinenknöllchens
mit Bakteriengewebe (b).

Kar: Gefässbündel,

Kork: Korkgewebe.

(Nach Tschirch.)

zucker und $\frac{1}{4}\%$ Asparagin bewährt. Die Kolonien sind nach Migula ziemlich gross, trübe, weiss, durchscheinend feucht, rundlich oder unregelmässig umrandet von wenig charakteristischem Aussehen. Unter dem Mikroskop sind sie glatt, fast strukturlos erscheinend; die Kolonien verflüssigen Gelatine nicht. Beyerinck beobachtete in diesen künstlichen Kulturen zweierlei Gebilde,




Fig. 6.

Schnitt durch das Bakteroiden-Gewebe
von *Lathyrus silvestris*.

k. Zellkerne mit Kernkörperchen, am. Stärkekörner,
mi. Mikrosomen, v. Vacuole, f. Infektionsfäden, bact.
Bakteroiden. 400fache Vergr. Nach Beyerinck.

kleine, sehr bewegliche, die er als Schwärmer bezeichnet, die jedoch von andern Forschern in der Kultur nicht gefunden werden konnten, und grosse Stäbchen. Diese letzteren haben nicht immer die regelmässige Stäbchenform, häufig zeigen sie gelappte Formen und verschiedenartige, gabelige Verzweigungen, wie sie in den Zellen der Wurzelknöllchen lebenden Bakterien eigen sind. (Vergl. Fig. 7 v, x, y.) Man hat sie als Bakteroiden bezeichnet und als Involutionsformen aufgefasst. Ihre Bildung soll nach den Beobachtungen von Hiltner und Stutzer durch Zusatz von Leguminosenwurzelextrakt sowie von organischen

Säuren und sauren phosphorsauren Salzen begünstigt werden. Im Boden sollen nun die bereits erwähnten Schwärmer angelockt durch von den Wurzelhaaren ausgeschiedene Stoffe sich an den letzteren ansammeln, sie ihrerseits alsbald durch Ausscheidungen zu eigentümlichen Verkrümmungen und Verzerrungen veranlassend. Die Schwärmer gelangen dann durch die so gelockerte Membran der Wurzelhaare in dieselben, wo sie sich alsbald vermehren und die sogenannten Infektionsfäden (vergl. Fig. 6) erzeugen. Diese stellen Stränge von schleimhüllten Bakterienkolonien dar, die

durch Verschmelzung der gequollenen äusseren Membranschicht der an der Aussenseite dieser fadenförmigen Kolonien befindlichen Bakterien gebildet wird. Der Infektionsfaden dringt nach Durchwachsung des Wurzelhaars in die Rindenzellen der Wurzeln ein, unter eigener Vermehrung diese zu lebhafter Vermehrung anregend, deren Produkt die bekannten Wurzelknöllchen darstellen. In den grossen Zellen des sogenannten Bakteroidengewebes (vergl. Fig. 6 und 7) nehmen die Bakterien die uns bereits bekannten als Bakteroiden bezeichneten Involutionsformen an. Bei manchen Leguminosen erfolgt die Knöllchenbildung ohne Infektionsfaden durch einzelne direkt nach dem Eindringen in die Wurzelhaare vorwärts dringende Bakterien.

Wie gestaltet sich nun das Verhältnis zwischen Wirt und Gast, zwischen der Leguminose und den Bakterien? Die erstere liefert den ihre Gastfreundschaft geniessenden Spaltpilzen Zucker und wahrscheinlich noch andere Nährstoffe zu ihrer Ernährung, die Bakterien verwenden die bei der Zersetzung des Zuckers freiwerdende Energie zur Fixierung des Stickstoffs, von dem die Wirtspflanze einen grossen Teil in für sie brauchbarer Form als Gegengabe empfängt. Bei diesem Verhältnis gedeihen beide Symbionten sehr gut und der Boden kann auf diese Weise eine schätzenswerte Stickstoffbereicherung erfahren.

Ausser bei den Leguminosen, von welchen bisher nur *Gleditschia* frei von Wurzelknöllchen gefunden wurde, hat man solche Gebilde noch bei der Erle, bei den Ziersträuchern *Elaeagnus* und *Hippophaë*, sowie bei *Podocarpus*, einer Konifere gefunden. Neuerdings hat dann A. Trotter noch bei der im Orient heimischen *Datisca cannabina* solche Wurzelanschwellungen beschrieben. Die Knöllchenpilze dieser Pflanzen sollen von denen der Leguminosen verschieden sein. Kurz berührt sei hier die vielfach diskutierte




Fig. 7.

Bakterien und Bakteroiden aus einem Wurzelknöllchen von *Vicia sativa*.

700fache Vergr. Nach Beyerinck.

Frage, ob ausser bei den erwähnten Pflanzen noch bei andern der freie atmosphärische Stickstoff durch die Vermittlung von Mikroorganismen in irgend einer Form nutzbar gemacht werden könne. Man hat vielfach die Anschauung vertreten, dass die Stickstoffassimilation mittels Symbiose zwischen Bakterien oder Fadenpilzen und höheren Pflanzen in der Natur sehr verbreitet sei. Besonders die von Frank zuerst beobachtete, von ihm als Mykorrhiza bezeichnete Umhüllung der feinen Wurzeln vieler Waldbäume, des Heidekrautes u. s. w. soll eine derartige Symbiose sein, bei welcher das Verhältnis zwischen Pilz und höherer Pflanze ähnlich sei dem von Knöllchenbakterien und Leguminosenpflanzen. Einwandfreie, diese hochinteressante Frage in positivem oder negativem Sinne sicher entscheidende Untersuchungen liegen zur Zeit leider nicht vor.

Man hat versucht die stickstoffsammelnden Bakterien in Reinkultur zu züchten und den Boden damit zu impfen. Nitragin und Alinit stellen solche Bakterienkulturen vermischt mit ihren Nährböden dar. Das Nitragin, welches Nobbe und Hiltner seinen Namen und seine Anwendung verdankt, ist eine solche Reinkultur von Knöllchenbakterien; sie soll die bereits erwähnte Impferde ersetzen und den Anbau von Leguminosen in Böden, wo diese sonst nicht gedeihen, ermöglichen. Das Alinit sind die Sporen einer Reinkultur eines von Caron aus dem Boden seines Gutes Ellenbach gezüchteten Stäbchenbakteriums, vermischt natürlich mit dem Nährboden, das die Fähigkeit der Stickstoffbindung besitzen soll. Die damit gemachten Erfahrungen sind widersprechend. Neuerdings hat die chemische Fabrik Bayer & Co. in Elberfeld, welche die Darstellung des Impfdüngers betreibt, zur Erhöhung der Wirksamkeit des Alinit einen Alinit-Bacillus β in den Handel gebracht, der zugleich mit dem erwähnten, als Alinit-Bacillus α bezeichneten stickstoffbindenden Stäbchenbakterium dem Boden eingimpft wird und der eine ähnliche Rolle spielen soll, wie nach Beyerincks Auffassung *Azotobacter chroococcum* gegenüber *Granulobacter*-Arten und *Radiobacter* oder auch umgekehrt. Die Frage, ob die Alinitbakterien als selbständige Art aufzufassen sind oder nicht, hat zahlreiche Untersuchungen veranlasst, die vor allem das wenig erfreuliche Resultat hatten, zu zeigen, wie überaus schwierig zur Zeit noch die sichere Bestimmung vieler Bodenbakterien ist. Heinze, der sich in letzter Zeit mit dieser

Frage beschäftigt hat, gelangt, wie vor ihm Kolkwitz, zur Ansicht, dass die Alinitbakterien auf Grund ihres morphologischen und physiologischen Verhaltens als selbständige Art *Bacillus Ellenbachensis* α Caron in die Gruppe der Heubacillen einzurechnen seien. Es verdient hier noch erwähnt zu werden, dass die Bestrebungen in der Bodenbakteriologie neuerdings auch darauf gerichtet sind, das bei andern Pflanzen mit so gutem Erfolge angewandte Züchtungsprinzip auch bei den stickstoffbindenden Bakterien in Anwendung zu bringen, um auf diese Weise Rassen mit erhöhter Leistungsfähigkeit zu erhalten.

Der Stickstoff, den die bisher behandelten Bakterien in den organischen Kreislauf einführen, ist nach dem Stande unserer pflanzenphysiologischen Kenntnisse unseren Kulturpflanzen mit Ausnahme der Leguminosen oder der andern Wirtspflanzen von Knöllchenbakterien nicht direkt zugänglich. Die ersteren beziehen ihre Stickstoffnahrung in erster Linie und fast ausschliesslich in Form von Nitraten, deren Bildung aus organischen stickstoffhaltigen Substanzen die nächsten drei Bakteriengruppen vollziehen.

In der Form des Ammoniumsalzes ist zwar der Stickstoff unsern Kulturgewächsen zugänglich, jedoch ist diese Form nicht die gewöhnliche. Sehr interessante Beobachtungen über die Stickstoffernährung des Schimmelpilzes *Aspergillus niger*, die hier aus Rücksicht für das Interesse, das sie für unsere Ausführungen über die Eiweisszersetzung haben, teilweise kurz erwähnt sein mögen, hat Czapek veröffentlicht, der auf diesem Wege der Eiweiss-synthese der Pflanze näher zu kommen sucht. Ausser den ersten Eiweisspaltungsprodukten haben sich vor allem die Aminosäuren, sowie die leicht in solche übergehenden Amide und Diamide als zum Aufbau des Eiweissmoleküls geeignete Substanzen erwiesen. Es folgen dann die Ammoniumsalze der Oxyfettsäuren; weniger geeignet sind die Säureamide bis zum Buttersäureamid, welches selbst bereits wie seine höheren Homologen unbrauchbar ist. Nur sehr wenig geeignet sind die Säurenitrile und die Ammoniumsalze der Fettsäuren. Czapek hat diese Skala nach den Gewichtsverhältnissen des bei Ernährungsversuchen mit den erwähnten Substanzen geernteten und getrockneten Pilzes aufgestellt.

Das Ausgangsprodukt für die Salpeterbildung im Boden ist das Ammoniak, das seinerseits das Produkt der sogenannten ammoniakbildenden Bakterien ist.

Bei diesen unterscheiden wir zwei Gruppen:

1. Bakterien, die amidartige Stickstoffverbindungen, deren wichtigste Vertreter der Harnstoff, die Harnsäure und die Hippursäure sind, unter Bildung von Ammoniumsalzen zu zersetzen vermögen. (Harnstoffvergäher.)

2. Bakterien, welche die kompliziert zusammengesetzten Eiweisskörper und deren Spaltungsprodukte unter Ammoniumbildung abbauen. (Peptonisierende Bakterien.)

Geringe Ammoniummengen können auf biologischem Wege dann noch bei dem später zu behandelnden Denitrifikationsvorgang aus dem Oxydationsprodukt des Ammoniaks, dem Nitrat, zurückgebildet werden, was der Vollständigkeit halber hier erwähnt sei. In der Regel entweicht bei dem erwähnten Prozess der Stickstoff in elementarer Form, doch kann die Reduktion auch bis zur Bildung von Ammonium gehen.



Fig. 8.
Micrococcus
ureae Cohn.
Nach Migula.

Die ammoniumbildenden Bakterien sind in der Natur sehr verbreitet; dem Ackerboden werden sie ausserdem bei der Düngung mit tierischen und menschlichen Auswurfstoffen stets in reicher Menge zugeführt. Beim Lagern des Düngers können dieselben durch ihre Tätigkeit dessen Wert bedeutend schädigen, indem das von ihnen gebildete Ammoniumkarbonat sich sehr leicht in Ammonium und Kohlensäure dissoziiert. Die längst bekannte, als ammoniakalische Harnsäure bezeichnete Zersetzung des Harnstoffs, dieses Endproduktes des menschlichen und tierischen Stoffwechsels, wurde als ein chemischer Vorgang angesehen, dessen Wesen in der Aufnahme von Wasser und in der Umlagerung der Atome zu Ammoniumkarbonat bestehe. Im Jahre 1862 erkannte Pasteur, dass die Harnstoffgärung ein biologischer Prozess ist, als dessen Erreger er einen Micrococcus entdeckte. Cohn hat diesen später Micrococcus ureae (vgl. Fig. 8) genannt.

Miquel zeigte dann, dass die Fähigkeit der Harnstoffvergärung gegen 60 verschiedenen, zum Teil sehr verbreiteten Bakterienarten und sogar einigen höheren Pilzen zukommt. Die Leistungsfähigkeit der einzelnen Arten ist sowohl was die Gärungsgeschwindigkeit als auch was die Masse des vergärten Harnstoffs betrifft, sehr verschieden. In beiden Beziehungen steht der allenthalben anzutreffende Urobacillus Pasteurii (Fig. 9) oben an, welcher in einer

zweiprozentigen Harnstoffpeptonbouillon 3 g Harnstoff in der Stunde vergärt. Er vermag bis 140 g Harnstoff im Liter in Ammoniumkarbonat überzuführen. Der Vorgang wird durch ein von den Bakterien ausgeschiedenes, äusserst empfindliches Enzym, das Miquel als Urase bezeichnet hat, ausgelöst. Seine Existenz





Fig. 9.

Urobacillus Pasteurii Miquel.

In der Mitte und oben rechts sind die Cilien in ihrer wahrscheinlichen Gestalt am lebenden Bakterienkörper dargestellt. Alles übrige genau nach dem Leben. Rechts unten sechs vereinzelte kugelige Sporen. 2580fache Vergr. Nach Beyerinck.

und Wirkung hat zuerst Musculus im Jahre 1874 in dem Harn eines an Blasenkatarrh erkrankten Menschen beobachtet. Die Überführung des Harnstoffs in kohlensaures Ammonium möge folgende Formel veranschaulichen:



Auch die Harnsäure und ihre Verwandten sowie die Hippursäure liefern bei der Zersetzung durch Bakterien Ammoniumkarbonat. Am schnellsten erfolgt dessen Bildung beim Harnstoff,

weniger schnell bei der Harnsäure und am langsamsten bei der Hippursäure, die unter Wasseraufnahme zuerst in ihre beiden Komponenten Benzoësäure und Glycocoll zerfallen soll.

Wenden wir uns nun zur zweiten, noch sehr wenig erforschten Gruppe unserer Ammoniakbildner, deren Vertreter das grosse Eiweissmolekül zu spalten vermögen. Diese Spaltung scheint ein überaus komplizierter Prozess zu sein, dessen Produkte von der Art des Eiweisskörpers, den spezifischen Eigenschaften der einzelnen Bakterien, der Anwesenheit oder dem Mangel von Sauerstoff, der Zusammensetzung des Nährbodens überhaupt, der Temperatur u. s. w. abhängig sind. Schon der grosse Liebig hat das Problem der bakteriellen Eiweisspaltung zur Erforschung der Konstitution des Eiweissmoleküls zu lösen versucht. Er und sein Schüler Popp erhielten auf diese Weise als Zersetzungsprodukte des Eiweiss Leucin, freie Fettsäuren, Phenol, Tyrosin, Indol, Scatol, Schwefelwasserstoff und Ammoniumsulfhydrat. Viele Forscher haben solche Versuche, aber nur wenige mit Reinkulturen, angestellt. Ausser den bereits erwähnten Spaltungsprodukten seien noch folgende erwähnt: Valeriansäure, Ortho- und Parakresol, Scatolessigsäure, Hydrocumarsäure, Methylmercaptan: als letzte gasförmige Produkte treten Kohlensäure, Wasserstoff, der bereits erwähnte Schwefelwasserstoff und das uns hier am meisten interessierende Ammoniak auf. Auch müssen wir hier noch an die Ptomaine, Toxine und Toxalbumine erinnern. Betreffs der die Eiweisspaltung auslösenden Bakterienarten liegen bis jetzt verhältnissmässig wenig sichere Beobachtungen vor. Auch die Frage, ob die einzelnen Arten die Eiweisspaltung bis zur Mineralisierung durchführen oder ob mehrere Arten daran beteiligt sind, ist noch nicht mit wünschenswerter Sicherheit gelöst. Es scheint, dass die Fähigkeit der Eiweisszersetzung, die man auch als Fäulnis bezeichnet hat, sehr vielen Bakterienarten zukommt.

Früher hat man die sogenannten Fäulnisbakterien unter dem die verschiedensten Arten vereinigenden Kollektivnamen *Bacterium termo* zusammengefasst. Zu den bekanntesten eiweiss-spaltenden Bakterien gehört der verbreitete *Proteus vulgaris* (Fig. 10), eine noch nicht genügend untersuchte Sammelspezies. *Tyrothrix*, der das Kasein spaltet und der bei dem Reifungsprozess des Käses eine wichtige Rolle spielt, *Bacterium coli commune* (Fig. 11), der bekannte Bazillus der Darmfäulnis. Die

Spaltung des Eiweissmoleküls, die Nencki als eine Hydratation bezeichnet, erfolgt durch die von Bakterien erzeugten sogenannten proteolytischen Fermente.

Sehr wenig bekannt sind bis jetzt die bakteriellen Zersetzungen der Glycoside, die als ebenfalls kompliziertere Stickstoffverbindungen hier erwähnt sein mögen; das Indican, das Glycosid der Indigopflanzen, soll durch Bakterien in Zucker und Indigoweiss gespalten werden.

Durch die Bildung des Ammoniaks aus den stickstoffhaltigen organischen Stoffen ist das Ausgangsmaterial für die als Nitrifi-




Fig. 10.

Proteus vulgaris Hauser.
(*Bacillus vulgaris* Migula.)

Faden und einzelne Zellen. 500fache Vergr.
Nach Migula.






Fig. 11.

Bacterium coli commune Escherich.

730fache Vergr.
Nach Weichselbaum.

fikation bezeichnete Salpeterbildung im Boden geschaffen, welche die beiden nächsten Bakteriengruppen vollziehen. Chemisch betrachtet ist die Nitrifikation ein durch Mikroorganismen zur Energieerzeugung ausgelöster Oxydationsvorgang, dessen Verlauf durch folgende hypothetische Formel angedeutet sei:



Die längst bekannte Nitrifikation hielt man für einen rein chemischen Oxydationsvorgang, bis im Jahre 1873 Alexander Müller die Vermutung aussprach, dass dieselbe ein biologischer Prozess sei. Seine Ansicht wurde vier Jahre später durch die Versuche von Schlössing und Müntz bestätigt, die auch bereits zeigten, dass das Minimum der Nitrifikation bei 5°, das Maximum bei 55° und das Optimum bei 37° liegt. Dass die Nitrifikation im sterilisierten Boden ausbleibt, hat zuerst Plath festgestellt. Allerdings gelang es den drei Forschern, wie manchen andern

trotz aller Anstrengungen nicht, die beteiligten Mikroorganismen zu züchten. Erst Winogradsky war es nach langem Bemühen und nach Schaffung der uns bereits bekannten elektiven Kultur vergönnt, die Nitrifikationsorganismen in Reinkultur zu erhalten und zu beobachten. Die bedeutenden und epochemachenden Untersuchungen Winogradskys sind in den Jahren 1890—1899 ausgeführt. Dabei bediente er sich der bekannten Kochschen Nährgelatine in ganz besonderer Weise. Die Wahrnehmung, dass in der bei den Züchtungsversuchen angewandten, im folgenden angegebenen mineralischen Nährlösung die Mikroorganismen sich hauptsächlich um die Magnesiumkarbonatteilchen entwickelten, veranlasste Winogradsky, die Nährgelatine mit einer solchen Kultur zu impfen und auf Platten auszugiessen. Er impfte dann wieder gerade von denjenigen Magnesiumkarbonatteilchen, um welche sich keine Keime entwickelt hatten, in die erwähnte mineralische Nährlösung ab.

Winogradsky stellte auf Grund seiner Untersuchungen fest, dass die Oxydation des Ammoniaks im Boden durch zwei von einander verschiedene Bakteriengruppen erfolgt: die Vertreter der einen oxydieren das Ammoniak zu salpetriger Säure, während die Angehörigen der anderen, durch eine grosse Empfindlichkeit gegenüber Ammoniak ausgezeichneten Gruppe die erzeugte salpetrige Säure zu Salpetersäure oxydieren. Winogradsky konstatierte dann ferner die hochwichtige Tatsache, dass die Nitrifikationsorganismen die Oxydation des Ammoniaks bei genügendem Sauerstoffzutritt am besten in einem nur aus anorganischen Substanzen zusammengesetzten Nährmedium vollziehen und dass selbst Spuren organischer Substanzen von den Bakterien sehr schlecht vertragen werden. Diese Beobachtung brachte Winogradsky auf den Gedanken, die Kochsche Nährgelatine, deren Anwendung bei den vielen Züchtungsversuchen der Nitrifikationsorganismen natürlich nicht zum Ziele führen konnte, in der angedeuteten Weise zur Erzielung von Reinkulturen anzuwenden. Da die an den Magnesiumkarbonatteilchen befindlichen Nitrifikationsorganismen in der Gelatine wegen ihrem Gehalt an löslichen organischen Stoffen sich nicht entwickeln konnten, so durfte man die gesuchten Bakterien an scheinbar keimfreien Partikeln des Magnesiumsalzes ohne Verunreinigung erwarten. Winogradsky bediente sich zur Reinkultur der zuerst von W. Kühne angegebenen Kieselsäure-

gallerte, die er bei den Nitritbildnern, die wir zuerst betrachten wollen, mit folgender Nährlösung tränkte: 1,0 Ammoniumsulfat, 1,0 Dikaliumorthophosphat, 5,0 Magnesiumkarbonat, 1 l Züricher Seewasser. Später hat Beyerinck die schwierig darzustellende Kieselsäuregallerte durch Agar ersetzt, der durch eine besondere Behandlung von allen löslichen organischen Bestandteilen befreit ist. Winogradsky hatte Agar bereits vorher zur Reinkultur der gegen lösliche organische Stoffe nicht in dem Grade, wie die Nitrosobakterien empfindlichen Nitrobakterien in Anwendung gebracht. Später bediente sich Omeliansky mit mineralischer Nährlösung getränkter Gipsmagnesiumplatten mit gutem Erfolg. Neuerdings hat der gleiche Forscher ebenfalls mit einer solchen Lösung angefeuchtetes Filtrierpapier, das er nach dem Vorgang von Beyerinck von löslichen Stoffen befreit, mit Erfolg zur Reinkultur des Nitritfermentes benutzt.

Die Nitritbildner oder Nitrosobakterien sind im Boden sehr

verbreitet. In Europa fand Winogradsky überall die gleiche Art, von ihm *Nitrosomonas europaea* (Fig. 12) genannt. Der Organismus stellt kurze, dicke, schwärmende oder zu festen Zoogloeen vereinigte Stäbchen von $1\ \mu$ Breite und $1,5\text{--}2\ \mu$ Länge mit einer kurzen, polaren Geißel dar. Sporenbildung ist bisher noch nicht beobachtet worden. Auf den festen Nährböden bilden die Bakterien sehr langsam wachsende kleine weissliche Kolonien. Sehr ähnlich, wenn nicht mit *Nitrosomonas europaea* identisch, sind die aus japanischen (Tokio) und nordafrikanischen (Tunis, Algier) Böden gezüchteten Nitritbildner. Bedeutend kleiner wie sein europäischer Kollege und mehr kugelig ist die aus javanischer




Fig. 12.

Nitrosomonas europaea Winogradsky
aus Züricher Erde.

1. Mikroben in Minerallösung kultiviert. 2. Mikroben im
Schwärmzustande. 3–5 Zoogloeenformen.

1, 2, 3, 5: 1000fache Vergr., 4: 125fache Vergr.
Nach Winogradsky.

Erde erhaltene *Nitrosomonas javanensis* (Fig. 13); die Zellen haben einen Durchmesser von $0,5\text{--}0,6\ \mu$, besitzen dagegen eine sehr lange Geißel, die oft die Länge von $30\ \mu$ erreicht. Die aus südamerikanischen und aus australischen Böden isolierten Nitrosobakterien sind unbegeißelte, keine Zoogloeen bildende Coccen, von Winogradsky als *Nitrosococcus* bezeichnet, von $1,5\text{--}2\ \mu$ Durchmesser. Es ist wohl anzunehmen, dass es im Boden ausser den angeführten, mehr als biologische, systematisch nicht ein-

heitliche Arten zu betrachtenden Nitrosobakterien noch andere Ammoniak zu salpetriger Säure oxydierende Bakterien gibt.

Die von den Nitrosobakterien erzeugte, in freiem Zustande unbeständige und giftige salpetrige Säure, die in den Kulturen durch das zugesetzte Magnesiumkarbonat, im Boden hauptsächlich durch Calciumkarbonat zu Nitriten abgesättigt wird, oxydieren die Nitrobakterien weiter zu Nitraten. Diese von Winogradsky als *Bacterium Nitrobacter* zusammengefassten Organismen finden sich in allen kultivierten Böden, und zwar nach der Angabe des Forschers stets in der




Fig. 13.

Nitrosomonas javanensis Winogradsky
aus Erde von Java.

1. Mikroben aus einer nitrifizierenden Flüssigkeit.
 2. Mikroben im Schwärmszustande. 3. Zoogloea im Zustand des Zerfalls. 1000fache Vergr.
- Nach Winogradsky.

gleichen Art. Es sind ausserordentlich kleine, mit den gewöhnlichen Farbstoffen sehr schwer färbbare, geißel- und sporenlose, unbewegliche, länglich ovale, öfters linsenförmige Bakterien von $0,5\ \mu$ Länge und $0,15\text{--}0,25\ \mu$ Breite, die in einen zarten Schleim eingebettet sind. Winogradsky gibt folgende Nährlösung an: 2,0 reines Natriumnitrit, 1,0 wasserfreies Natriumkarbonat, eine Messerspitze Kaliumphosphat, 1000 ccm Flusswasser. In dieser Kulturflüssigkeit bilden die Bakterien dünne, schleimige, den Gefässwandungen fest ansitzende Häutchen. Auf Kieselsäuregallerte oder auf Nitritagar bilden sie ganz ausser-

ordentlich kleine, erst bei stärkerer Vergrößerung sichtbare Kolonien. Zur Züchtung der Nitratbildner geht man nach Winogradsky am besten in der Weise vor, dass man von einer Erdprobe mehrere Agarplatten, und zwar mit verschiedenen Bodenmengen, herstellt und dieselben etwa vier Wochen in der feuchten Kammer bei etwa 30° hält. Ist nach dieser Zeit das Nitrit in Nitrat verwandelt, was sich leicht nachweisen lässt, so impft man von den typischen Kolonien in die angegebene mineralische Nährlösung ab, um dann weiter in der oben beschriebenen Weise vorzugehen.

Die Nitrifikationsbakterien sind ausserordentlich wichtige und in wissenschaftlicher Beziehung hochinteressante Organismen. Wichtig, weil sie das Ammoniak in die für die Pflanzenernährung so wichtige Nitratform überführen. Dabei kann keine Gruppe die andere vertreten (im Boden sind stets beide Gruppen nebeneinander vorhanden), die Nitrosobakterien vermögen das Ammoniak nur bis zur salpetrigen Säure zu oxydieren, während die Nitratbildner gegen Ammoniak sehr empfindlich und nur im stande sind, Nitrite in Nitrate überzuführen. Die oxydierende Wirkung der Organismen ist eine ganz spezifische und erstreckt sich nur auf die angegebenen Verbindungen des Stickstoffs. So vermögen die Nitratbildner nach den Untersuchungen von Omeliansky weder phosphorige noch schweflige Säure weiter zu oxydieren. Eine ganz besondere Stellung, die bis jetzt vielleicht nur bei den Schwefel- und Eisenbakterien, auf die wir später noch zurückkommen werden, ein Analogon hat, nehmen die Nitrifikationsorganismen in ernährungsphysiologischer Beziehung ein. Wir haben bereits gesehen, dass sie organische Verbindungen, stickstoffhaltige nicht ausgeschlossen, verschmähen und sich wie chlorophyllbesitzende Pflanzen vollständig von mineralischen Substanzen ernähren. Des Chlorophylls entbehren sie und assimilieren die Kohlensäure im Dunkeln ohne die Energie der Sonnenstrahlen zu benützen. Die Energie liefert ihnen gerade die Oxydation des Stickstoffs, der vermutlich in oxydierter Form zugleich ihren eigenen Stickstoffbedarf deckt. Den zum Aufbau des Zelleibes nötigen Kohlenstoff entnehmen sie, wie wir durch die Untersuchungen von Godlewski wissen, der atmosphärischen Kohlen-



Fig. 14.
Bacterium
Nitrobacter
Winogradsky.
1000fache Vergr.
Nach Winogradsky.

säure. Diese Kohlensäureassimilation steht in einem bestimmten Verhältnis zur Stickstoffoxydation, der Energiequelle. Nach Winogradskys Untersuchungen genügt im Mittel die Oxydation von 35,4 mg Stickstoff zur Assimilation von 1 mg Kohlenstoff. Dabei entweicht ein Teil des Stickstoffs in elementarer Form, wobei es sich wahrscheinlich um eine chemische Umsetzung der Stickstoffoxydationsprodukte mit Ammoniak handelt. Über den Mechanismus der bakteriellen Stickstoffoxydation sind wir noch vollständig im Dunkeln. Die Frage, ob die Bakterien vielleicht ein oxydierendes Ferment, eine Oxydase ausscheiden, wurde von Omeliansky bei den sich den Nitratbildnern gegenüber durch ihr energisches Oxydationsvermögen auszeichnenden Nitritbildnern mit negativem Erfolge geprüft. Auch die Möglichkeit, dass mehrere Oxydationsstufen aufweisende Schwermetalle eine Rolle bei der Oxydation spielen, fand Omeliansky bei seinen Versuchen nicht bestätigt. Es ist bekannt, dass solche Schwermetalle an der Oxydation von komplizierten organischen Verbindungen beteiligt sein können, wie man z. B. auch dem Eisen im Hämoglobin eine derartige Wirkung zuschreibt. Omeliansky ging bei seinen Untersuchungen von einer Beobachtung Gabriel Bertrands aus, der bei der Lackase einen engen Zusammenhang zwischen dem Grade der oxydierenden Wirkung und ihrem Gehalte an Aschenbestandteilen, besonders an Mangan, das auch Omeliansky in seinen Versuchen benützte, erkennen liess.

Die Nitrifikationsbakterien führen, wie wir gesehen, den Ammoniakstickstoff in die zur Aufnahme durch den Organismus der grünen Pflanzen geeignetste Nitratform über. Aber nicht immer kommt aller im Boden vorhandene Salpeter wirklich den Pflanzen zu gut. Die fünfte Gruppe unserer Bakterien, die sogenannten Denitrifikationsbakterien, reduzieren das Nitrat unter Bildung von freiem Stickstoff und während wir bisher Organismen kennen gelernt haben, welche bei ihrem Stoffwechsel entweder den elementaren, atmosphärischen Stickstoff festlegen, ihn in den organischen Kreislauf einführend, oder solche, welche bereits gebundenen Stickstoff bei ihrer Lebenstätigkeit weiter verwenden und für seine Brauchbarmachung zur Pflanzenernährung tätig sind, haben wir uns jetzt mit solchen Organismen zu beschäftigen, die Nitrate reduzieren oder auch den Salpeterstickstoff ganz frei machen, ihn in die Atmosphäre zurücksendend und so den Kreislauf des Stickstoffs schliessend.

Der Vorgang der Denitrifikation ist bereits längere Zeit bekannt, wurde aber ebenso, wie die bereits behandelten, anderen biologischen Vorgänge im Boden für einen ohne jede Mithilfe von Organismen verlaufenden, rein chemischen Reduktionsprozess gehalten. Erst im Jahre 1882 wurden durch Gayon und Dupetit bestimmte Bakterien als spezifische Erreger der Denitrifikation ermittelt. Durch die Beobachtung von Paul Wagner im Jahr 1895, dass bei Versuchen mit künstlicher Stickstoffdüngung die gleichzeitige Anwendung von Stalldünger den Effekt bedeutend verminderte, wurde die Denitrifikation als ein wissenschaftlich hoch interessanter, für unsere Landwirtschaft aber schädlicher Vorgang vielfach Gegenstand der Untersuchung. Dabei zeigte es sich, dass es zahlreiche und darunter gemeine und verbreitete Bakterien gibt, die entweder für sich oder gemeinschaftlich mit andern Spaltpilzen die Stickstoffentbindung hervorrufen können. Aber nicht nur im Boden, auch im Wasser und im Meere hat man derartige Organismen tätig gefunden, wie man auch Nitrifikationsbakterien im Grunde des Meeres beobachtet hat. So hat Erwin Bauer bei seinen auf Veranlassung der Kommission zur Untersuchung der deutschen Meere ausgeführten Forschungen zwei Denitrifikationsbakterien aus der Ostsee isoliert und als neue Arten *Bacterium Aktinopelte* und *lobatum* beschrieben. Als Kulturflüssigkeit verwandte Bauer Muschelbouillon aus frischen Miesmuscheln mit 2% Pepton und 0,25% Calciumnitrit. *Bacterium Aktinopelte* ist nicht im stande, für sich allein in reiner Nitritbouillon zu denitrifizieren, sondern nur in Gegenwart von andern Bakterien, oder nach deren Abtöten durch Sterilisation in Anwesenheit ihrer Stoffwechselprodukte, sowie in Nitritbouillon, der bestimmte Kohlehydrate zugesetzt wurden. Der Organismus vermag unter diesen Bedingungen sowohl Nitrate wie Nitrite unter starkem Aufschäumen und unter Bildung von elementarem, gasförmigem Stickstoff zu zerlegen. Kulturen, die längere Zeit rein gezüchtet wurden, verloren allmählich die Fähigkeit Nitrat zu Nitrit zu reduzieren, konnten aber noch Nitrit zerlegen, wenn auch in verschieden hohem Grade. *Bacterium lobatum* vermag überhaupt nur Nitrit zu zersetzen und auch diese Fähigkeit soll es in der Reinkultur nach wenigen Wochen fast stets verlieren. Das Optimum liegt für beide Organismen zwischen 20—25°.

Interessante Beobachtungen über das Vorkommen von deni-

trifizierenden Bakterien im Meerwasser liegen ferner von Gran aus Beyerincks Laboratorium vor.

Wie bereits betont wurde, finden sich die Denitrifikationsorganismen in grosser Verbreitung; man fand sie in der Luft, im Wasser, im Boden, am Stroh, im Stalldünger, besonders im Pferdekot, kurz allenthalben und manchmal kann ihre Gegenwart und ihre Tätigkeit recht lästig werden. So hat F. Schönfeld als Ursache des sogenannten „chlorigen“ Geruches des Bieres solche nitratreduzierende Bakterien ermittelt, die sich aber natürlich nur dann entwickeln können, wenn das Brauwasser Nitrate enthält. In der Melassebrennerei sind sie verschiedentlich als die Erreger der sogenannten Salpetersäuregärung aufgetreten, wobei an der Luft sich zu rotbraunen Dämpfen von NO_2 oxydierendes Stickoxyd entweicht. Die Rübenmelasse enthält bekanntlich stets geringere Mengen Nitrate. Im Stalldünger und im Boden kann die Entbindung des für die Ernährung unserer Kulturpflanzen so wichtigen Nitratstickstoffs unter den Denitrifikationsorganismen zusagenden Bedingungen bedeutenden Schaden anrichten. Doch kann man wohl sagen, dass die diesbezüglichen, auf Grund von Versuchen ausgesprochenen Befürchtungen glücklicherweise zu weit gingen, da speziell bei Versuchen in Kulturgefässen leicht gerade die Tätigkeit von salpeterreduzierenden Bakterien begünstigende Verhältnisse sich vorfinden, die denen in einem richtig bearbeiteten Ackerboden nicht ganz entsprechen. Die Frage, ob die im Stalldünger und im Boden sich vorfindenden Denitrifikationsbakterien identisch sind und ob die letzteren auch in ungedüngtem Boden längere Zeit sich zu erhalten vermögen, ist öfters mit verschiedenem Resultat geprüft worden. So ist Künnemann der Meinung, dass die denitrifizierenden Bakterien des Bodens verschieden seien von denen des Stalldüngers. H. Jensen vertritt die gegenteilige Ansicht, dass die Organismen mit dem Stalldünger auf das Feld gebracht werden und dass sie in ungedüngtem Boden nicht längere Zeit leben können. Als Beweis dieser Behauptung führt Jensen an, dass er nur mit gedüngter Erde Denitrifikation erhalten konnte. Karl Höflich, der neuerdings diese Frage einer Prüfung unterzogen hat, spricht sich dahin aus, dass die im Boden vorhandenen Denitrifikationsbakterien sich auch ohne alljährliche Düngung lebensfähig erhalten können und

dass die Bakterien des Bodens die gleichen sind, wie die des Stalldüngers.

Die Zahl der Bakterienarten, die den Salpeter zu reduzieren vermögen, ist sehr gross. Wir haben hier mit Absicht den Ausdruck reduzieren gebraucht. Wenn wir unter der Erscheinung der Denitrifikation eigentlich nur die Vorgänge zu besprechen haben, die mit der Entbindung von freiem Stickstoff abschliessen, so müssen wir bei dieser Gelegenheit doch auch der Tätigkeit derjenigen Bakterien gedenken, die Nitrat nur bis zum Nitrit zu reduzieren vermögen.

Unter diesen salpeterreduzierenden Bakterien gibt es nun also solche, die nur Nitrate zu Nitriten desoxydieren können, dann solche, die nur Nitrite unter Stickstoffentbindung reduzieren. Diese letzteren können also nur in Symbiose mit den ersteren oder mit Angehörigen der folgenden Gruppe den Salpeterstickstoff in Freiheit setzen. Als dritte Klasse gibt es dann noch Bakterien, die den Salpeter vollständig reduzieren können. Die Reduktion des Salpeters kann unter Umständen bis zur Ammoniakbildung gehen; mitunter entweicht der Stickstoff aber auch in Form von Stickoxyd.

Eine grosse Zahl von Mikroorganismen hat in letzter Zeit Albert Maassen auf ihre Fähigkeit, Salpeter zu reduzieren, untersucht. Von 109 zur Prüfung herangezogenen Arten besaßen 85 die Fähigkeit, Nitrat zu Nitrit, 50 das Vermögen, Nitrit zu Stickstoff zu reduzieren. Die Leistungsfähigkeit der einzelnen Arten ist bei beiden Gruppen sehr verschieden. Unter den salpeterreduzierenden Bakterien sind sehr bekannte gemeine und auch pathogene Arten: *Bacterium coli commune*, der vielseitige Darmfäulniserreger (vergl. Fig. 11), der Typhusbacillus, der Cholera bacillus, der Erreger des blauen Eiters (*Bac. pyocyaneus*), die Erreger der Hühnercholera (*Bac. cholerae gallinarum*), des Rotzes (*Bac. mallei*), der Schweineseuche (*Bac. suisepeticus*), der gelatinverflüssigende, fluoreszierende Bacillus (*Bac. fluorescens liquefaciens*), die gelbe Sarcine (*Sarcina flava*), der Wurzelbacillus (*Bac. mycoides*) u. s. w. Wie bereits erwähnt wurde, sind die salpeterreduzierenden Bakterien fakultative Anaërobionten; doch vermögen die meisten derselben die Desoxydierung des Nitrats bei Gegenwart von andern aërobiotischen Bakterien in Symbiose mit denselben auch bei Sauerstoffanwesenheit zu vollziehen. Es sei hier

als Beispiel das *Bacterium coli commune* genannt. Neben ihm findet sich in den Pferdefaeces regelmässig ein von Burri und Stutzer als *Bacillus denitrificans* I bezeichneter Spaltpilz (Fig. 15). Wird nun *Bacterium coli commune* allein in nitrathaltigen Nährsubstraten bei Luftabschluss gezüchtet, so vermag es den Salpeter nur bis zum Nitrit zu reduzieren. Wird der Organismus aber mit dem obligat aeroben *Bacillus denitrificans* I im gleichen Nährmedium bei Luftzutritt kultiviert, so tritt bei dieser Symbiose energische Entbindung von elementarem Stickstoff unter Aufschäumen auf.

Das Optimum der denitrifizierenden Tätigkeit der Bakterien ist bei den einzelnen Arten verschieden; bei dem sehr energisch



Fig. 15.
Bacillus denitrificans I.
1000fache Vergr.
Nach Burri.

wirkenden *Bacillus pyocyaneus* z. B. liegt es zwischen $35-37^{\circ}$, bei dem *Bacillus fluorescens liquefaciens* zwischen $26-30^{\circ}$, im allgemeinen zwischen $30-40^{\circ}$. Fördernd auf die Tätigkeit der salpeterreduzierenden Bakterien wirken Kohlehydrate, mehrwertige Alkohole, die Salze organischer Säuren, besonders die der Milchsäure und die Gegenwart geringer Mengen von Alkali. Salzmann, der auf Veranlassung von A. Stutzer die zwei denitrifizierenden Bakterien *Bacillus Stutzeri* und *Hartlebi* in dieser Beziehung untersucht hat, fand,

dass die Organismen in 0,5% Peptonlösung bei Zusatz von 1% Milchsäure in Form des Kaliumsalzes 98% des gebotenen Salpeters unter Stickstoffentbindung reduzierten und A. Maassen beobachtete, dass manche Bakterien überhaupt nur bei Gegenwart der erwähnten chemischen Verbindungen die Fähigkeit der Salpeterreduktion zeigen. Hemmend auf den Denitrifikationsvorgang wirkt reichliche Sauerstoffzufuhr.

Über den Chemismus der Denitrifikation sind die Ansichten zurzeit noch geteilt. Zwei grundsätzlich verschiedene Theorien stehen sich gegenüber, nach der einen sind es Stoffwechselprodukte der Bakterien, welche die Stickstoffreduktion bewirken, nach der andern entreissen die Bakterien den Sauerstoff den ihn enthaltenden Molekülen, um ihn für sich zu benutzen analog dem Vorgang der intramolekularen Atmung. Die erstere Ansicht glaubt Curt Wolf dadurch bewiesen zu haben, dass er Analysen über den Sauerstoffverbrauch von denitrifizierenden Bakterien aus

der in den Kulturgefässen zur Verfügung stehenden Luft beim Vorhandensein und bei Abwesenheit von Salpeter ausführte. Dabei soll in beiden Fällen der Sauerstoffverbrauch derselbe sein, während bei Gegenwart von Nitraten weniger Sauerstoff aus der Luft entnommen sein müsste, wenn die Bakterien ihren Sauerstoffbedarf aus dem Salpeter decken würden. Man hat besonders die Hypothese vertreten, dass der bei vielen Bakterien als Stoffwechselprodukt auftretende Wasserstoff die Salpeterreduktion bewirke.

Die Annahme, dass die Reduktion der Nitrates zu freiem Stickstoff auf direkte Sauerstoffentnahme zurückzuführen sei, haben bereits Gayon und Dupetit ausgesprochen; H. Jensen, H. Weissenberg und andere Forscher sind dieser Auffassung beigetreten. Weissenberg sagt: „Die denitrifizierenden Bakterien besitzen die Fähigkeit, bei Mangel oder erschwerter Aufnahme von atmosphärischem Sauerstoff diesen aus Nitraten des Nährsubstrates zu entnehmen, so das Nitritmolekül zu spalten, was sich unter Entweichen von Stickstoff als Gärung zu erkennen gibt.“

Wir ersehen aus dem über den chemischen Vorgang der Denitrifikation Angeführten, dass dieses Problem trotz der vielen über dasselbe ausgeführten Untersuchungen in seinem Wesen noch sehr wenig aufgeklärt ist. Es ist nicht als ausgeschlossen zu betrachten, dass eine Stickstoffentbindung aus dem Salpeter auf verschiedene Weise zu stande kommen kann. Auch die Reaktion des Nährsubstrates ist von grosser Bedeutung für den Verlauf der chemischen Prozesse. So hat Curt Wolf bei saurer Reaktion mit den verschiedensten Spalt-, Spross- und Schimmelpilzen die Zerstörung von Nitraten bei Zuckerzusatz beobachtet. Er meint deshalb, dass bei jeder Gärung, gleichviel durch welche Organismen dieselbe hervorgerufen werde, das in der Zuckerlösung vorhandene Nitrat zerstört werde. Indess handelt es sich nach den Ausführungen von H. Weissenberg hierbei nur um ganz geringe Salpetermengen, die auf diese Weise unter Stickstoffentbindung reduziert werden. Ganz anders verhalten sich aber die Bakterien, welche wir als denitrifizierende bezeichnet haben. Diese vermögen auch bei Gegenwart von Alkali die Salpeterreduktion zu bewirken und die Alkaleszenz nimmt im Verlauf des Vorgangs noch erheblich zu. Ferner bedürfen sie nicht absolut eines Zuckerzusatzes zur Auslösung der Stickstoffentbin-

dung und vermögen, wie wir gesehen haben, ganz bedeutende Nitratmengen zu zerstören.

Mit der Denitrifikation ist der Kreislauf des Stickstoffs beendet; der Stickstoff kehrt in das unerschöpfliche Luftmeer zurück, um von neuem seine Wanderung zu beginnen. Das Werk der Bakterien aber ist es, dass das Verhältnis von freiem und gebundenem Stickstoff auf unserem Planeten in ewigem Gleichgewicht erhalten wird.

Aber nicht nur bei dem Kreislauf des Stickstoffs sind die Bodenbakterien tätig, sondern auch bei der steten Wanderung der in den organischen Verbindungen in erster Linie vertretenen Elemente des Kohlenstoffs, Sauerstoffs und Wasserstoffs sind sie beteiligt; im Boden und im Wasser fällt ihnen auch hierbei der Hauptanteil der Arbeit zu. Wir haben bisher bei der Betrachtung des Stickstoffkreislaufes die diesbezüglichen Leistungen der Spaltspilze nur nebenbei berücksichtigt und wollen wir jetzt deshalb zur näheren Orientierung die bakteriellen Zersetzungen der stickstofffreien * organischen Verbindungen verfolgen. Hier steht infolge des massenhaften Auftretens der Cellulose die Gärung der Cellulose oben an.

Im Jahre 1850 beobachtete Mitscherlich, dass beim Weichen von Kartoffeln in Wasser die Zellhüllen zerstört werden, während die Stärke sich am Boden des Gefäßes ansammelt. Als Ursache dieser Erscheinung glaubte er Vibrionen, die massenhaft im Substrat vorhanden waren, ansehen zu müssen. Über die Bacillenformen bei der Maceration pflanzlicher Gewebe veröffentlichte im Jahre 1865 Trécul eine Untersuchung; die Bakterien besaßen alle die Eigenschaft, durch Jod blau gefärbt zu werden; Trécul bezeichnete sie deshalb als *Amylobacter*-Arten. Diesen widmete sodann van Tieghem in den letzten Jahren des 8. Decenniums des vergangenen Jahrhunderts verschiedene Studien; er schrieb ihnen als hervorragendste Eigenschaft die Fähigkeit zu, Cellulose zu zersetzen, eine Schlussfolgerung, die sich für die van Tieghemschen Bakterien nicht aufrecht erhalten liess, indem dieselben gerade nicht im stande sind, auf sogenannte typische Faser-cellulose einzuwirken.

* Eine Zusammenstellung der wichtigsten Tatsachen der hier in Betracht kommenden bakteriellen Gärungen hat O. Emmerling gegeben. (Emmerling, O., Die Zersetzung stickstofffreier organischer Substanzen durch Bakterien. Braunschweig, F. Vieweg u. Sohn, 1902.)

Vom rein chemischen Standpunkte ohne Rücksicht auf die dabei tätigen Bakterienarten wurde sodann die Cellulosegärung von Popoff, Tappeiner und Hoppe-Seyler näher verfolgt, die bei ihren Untersuchungen zum Teil schwedisches Filtrierpapier, also reine Cellulose verwandten. Als wichtigstes Resultat dieser Arbeiten ist die Erkenntnis anzusehen, dass bei der Cellulose zwei verschiedene Gärungen, eine Wasserstoffgärung und eine Methan-gärung auftreten. Das Zerfallen von Zellwänden unter der Einwirkung von Mikroben aus Flusschlamm beobachtete im Jahre 1890 zuerst van Sensus direkt unter dem Mikroskop. Seit dem Jahre 1895 hat sich Omeliansky, ein Schüler Winogradskys, in einer Reihe von Arbeiten mit der Cellulosegärung und ihren Erregern eingehend beschäftigt. Wir verdanken diesem Forscher wichtige Aufschlüsse über die letzteren und die durch dieselben ausgelösten Vorgänge. Mit bestem Erfolg bediente sich Omeliansky bei seinen Untersuchungen der von Winogradsky geschaffenen, uns bereits bekannten elektiven Kultur. Zur Impfung diente frischer Pferdekot und Flusschlamm. Die bereits erwähnten chemischen Untersuchungen über die Cellulosegärung, insbesondere diejenige von Hoppe-Seyler, liessen keinen Zweifel darüber, dass es sich bei der Cellulosegärung um eine typische anaërobe Gärung handelt und dass diese letztere jahrelang in einem an löslichen organischen Substanzen äusserst armen Medium veranstaltet werden kann. Diese Beobachtung diente Omeliansky als Fingerzeig für die elektive Kultur. Als Cellulosesubstrat benützte er Filtrierpapier, als Nährlösung eine solche von folgender Zusammensetzung:

Kalium phosphoricum 1,0, Magnesium sulfuricum 0,5, Ammonium sulfuricum oder phosphoricum 1,0, Natrium chloratum Spuren, destilliertes Wasser 1000,0 und Kreide im Überschuss, um die bei der Gärung entstehenden Fettsäuren zu neutralisieren, da sie sonst schliesslich die Bakterien vernichten würden. Die Kulturen wurden entsprechend der Tatsache, dass es sich um eine anaërobe Gärung handelt, vorsichtig vor Luft geschützt. Omeliansky beobachtete nun, dass bei gleicher Aussaat bald Methan-, bald Wasserstoffgärung auftrat. Es zeigte sich aber bald, dass sich das Einsetzen der einen oder der andern Gärung durch äussere Einwirkung bestimmen lässt. Nimmt man die Abimpfungen ohne Erwärmung vor, so setzt sich als Regel in der folgenden

Generation die Methangärung fest. Erhitzt man dagegen bei einer der ersten Abimpfungen die Kultur 15 Minuten lang auf 75°C , so sind hierdurch Bedingungen zur Entwicklung der Wasserstoffgärung geschaffen. Die Inkubationszeit beträgt bei der Methangärung in der Regel eine Woche, bei der Wasserstoffgärung dagegen drei bis vier Wochen. Wir wollen nun zuerst den Erreger der letzteren betrachten. Der Cellulose-Wasserstoffvergärer (Fig. 16), ein sporenbildender Bazillus, ist ein Beispiel eines Mikroorganismus mit streng spezialisierter Funktion, welche sich in bemerkenswerter Weise auf die Zersetzung eines unlöslichen, in chemischer Beziehung besonders widerstandsfähigen




Fig. 16.

Bazillus der Cellulose-Wasserstoffgärung von W. Omeliansky.

a. Junge Stäbchen, b. Trommelschlegelform zur Zeit der Sporenbildung, c. Sporen.
1000fache Vergr.

Die Figuren sind nach den Photogrammen Omelianskys gezeichnet.

Stoffes beschränkt und sich nicht auf die von der grossen Mehrzahl der Organismen gesuchten Nährstoffe erstreckt. Der Bazillus färbt sich mit den gebräuchlichen Anilinfarben gut, dagegen bringt Jod in keinem Entwicklungsstadium eine Blaufärbung hervor; es hat also dieser Spaltpilz nichts mit dem Amylobacter van Tieghems (vergl. Fig. 17) gemein. Über die Produkte der Wasserstoffgärung gibt der nachstehende Versuch Omelianskys Aufschluss. 3,3471 g Cellulose lieferten:

2,2402 g Fettsäuren (Essigsäure, Buttersäure,
Spuren von Valeriansäure),
0,9722 g Kohlensäure,
0,011388 g Wasserstoff.

Vergleichen wir hiermit die Produkte der zweiten Art der bakteriellen Cellulosezersetzung, der Methangärung. Es lieferten z. B. 2,0065 g Cellulose:

1,0223 g Fettsäuren (Essigsäure und Buttersäure),
 0,8678 g Kohlensäure,
 0,1372 g Methan.

Der Erreger dieser Gärung ist dem *Bacillus* der Wasserstoffgärung morphologisch ausserordentlich nahe verwandt und lässt sich nur durch seine physiologische Leistung mit Sicherheit von seinem Kollegen unterscheiden. Im allgemeinen ist der Methanvergärer etwas kleiner, ebenso seine Sporen. In der Natur verlaufen die beiden Cellulosegärungen wohl in der Regel nebeneinander.

Wenden wir unsern Blick jetzt auf die übrigen in der Natur verbreiteten Kohlehydrate, sowie auf die ihnen chemisch sehr nahe stehenden mehratomigen Alkohole. Wenn auch speziell bei der Zersetzung dieser Verbindungen Hefe- und Schimmelpilze eine bedeutende Rolle im Boden spielen, so ist doch die Tätigkeit der Bakterien auch in dieser Beziehung eine sehr wichtige und vielseitige. Schon bei der Besprechung des *Clostridium Pasteurianum* wurde erwähnt, dass dieser Organismus Dextrose, Lävulose, Rohrzucker, Inulin, Galactose und Dextrin unter Bildung von Buttersäure, Essigsäure, Kohlensäure und Wasserstoff zu spalten vermag. Die Produkte der bakteriellen Gärung der Kohlehydrate und der mehratomigen Alkohole, deren Erreger sich in der Natur in ausserordentlicher Verbreitung finden, sind je nach der chemischen Natur dieser Körper, nach der Art der auf sie einwirkenden Bakterien, nach der Temperatur, nach dem Zutritt oder dem Mangel der Luft, nach der Anwesenheit anderer Substanzen etc. verschieden, worauf ebenfalls bereits bei den physiologischen Leistungen des *Clostridium Pasteurianum* hingewiesen wurde. Mehratomige Alkohole werden mitunter durch die Bakterien zuerst durch Oxydation in die nahverwandten Zuckerarten übergeführt. Die wichtigsten Zersetzungsprodukte sind fette Säuren, besonders Ameisensäure, Essigsäure, Propionsäure, Milchsäure, Buttersäure, Valeriansäure, Bernsteinsäure, ferner Kohlensäure und Wasserstoff; weniger häufig treten einatomige Alkohole, wie der Aethylalkohol, Propylalkohol, Butylalkohol, Amylalkohol, ferner Aceton auf. Wir bezeichnen eine solche Gärung nach dem in grösster Menge dabei auftretenden Zersetzungsprodukt als Essigsäuregärung, als Milchsäuregärung u. s. w. Die häufigsten und wichtigsten der bakteriellen Gärungen der Kohlehydrate und der mehratomigen

Alkohole sind die Milchsäure- und die Buttersäuregärung. Milchsäure entsteht durch eine ganze Reihe von Bakterien aus Milchsucker, Rohrzucker, Glucose, Lävulose, Galactose, Maltose, Stärke, Dextrin, Raffinose, Trehalose, Melecitose, Mannit, Sorbit, Inosit, Dulcit und Glycerin. Das oft erwähnte vielseitige Bacterium coli (vergl. Fig. 11) z. B., das übrigens nicht zu den sogenannten typischen Milchsäurebakterien gehört, spaltet nach A. Harden die Glucose im Sinne folgender Gleichung:





Fig. 17.

Bacillus amylobacter van Tieghem (*Clostridium butyricum* Prazmowski).


I. Dauersporenbildung. a. b. c. Stäbchen vor, d. e. während, f. g. h. nach der Sporenbildung.

II. Keimung der Dauersporen.

1020fache Vergr. Nach Prazmowski.

Die Buttersäuregärung, die wir bei der Bindung von elementarem Stickstoff durch Bakterien im Boden schon kennen gelernt haben, tritt ebenfalls sehr häufig auf. Ihre bekanntesten und verbreitetsten Erreger sind ausser dem *Clostridium Pasteurianum* (Fig. 2) der *Bacillus amylobacter* van Tieghem (Fig. 17), von Prazmowski *Clostridium butyricum* genannt, *Bacillus butylicus* Migula identisch mit Beyerincks *Granulobacter butylicum* und *Bacillus butyricus* Hueppe. Auch pathogene Arten besitzen die Fähigkeit der Buttersäureerzeugung, wie z. B. der Erreger des malignen Ödems und des blauen Eiters. Die Buttersäurebakterien sind meist fakultative Anaërobionten, doch gibt es auch

solche, die nur bei Sauerstoffanwesenheit zu gedeihen vermögen. Buttersäure wird durch Bakterien erzeugt aus Glucose, Rohrzucker, Milchzucker, Stärke, Glycogen, Glycerin, Mannit, Erythrit, Quercit, Sorbinose, Arabinose; einige Bakterienarten vermögen auch milchsauren und glycerinsauren Kalk in Buttersäure überzuführen. Die Spaltung der Glucose z. B. geht bei den meisten sie vergärenden Bakterien in der Hauptsache im Sinne folgender Gleichung vor sich:



Manche Bakterien erzeugen indes aus bestimmten der hier in Betracht kommenden Nährmedien so grosse Mengen von Butylalkohol oder Isobutylalkohol, dass man z. B. bei der Maltosegärung durch *Bacillus butylicus* Migula von einer Butylalkoholgärung spricht. Dass Beyerinck den typischen Buttersäurebakterien im Boden ganz allgemein das Stickstoff-Fixationsvermögen zuschreibt, wurde schon früher erwähnt.

Die bei der Spaltung der Kohlehydrate und der mehratomigen Alkohole auftretenden fetten Säuren und Alkohole teilen im Boden das Schicksal der in Fetten und Ölen vertretenen, in der Regel mehratomigen Fettsäuren und mehratomigen Alkohole. Es sind allerdings verhältnissmässig wenig Untersuchungen über die Zerstörung von Fetten und Ölen im Boden bis jetzt ausgeführt worden. Zu erwähnen sind vor allem die zwölfjährigen grundlegenden Versuche Rubners über die Spaltung und Zersetzung von Fetten und Fettsäuren im Boden und in Nährlösungen, wobei allerdings die dabei tätigen Arten nicht näher berücksichtigt sind. In sterilisiertem Boden trat wohl eine geringe Fettspaltung, aber keine Fettgärung ein. Unter natürlichen Bedingungen wird das Neutralfett im Boden gespalten und dann unter sehr schnellem Verschwinden des Glycerins aufgezehrt und zu Kohlensäure und Wasser verbrannt. Dabei sind neben Bakterien auch Schimmelpilze in ganz hervorragender Weise beteiligt. Beschleunigt wird die Fettzersetzung durch das Vorhandensein passender Bakteriennährstoffe, sowie durch Zugabe von Kalk. Von den Bakterien, welche imstande sind, Fette und Öle zu spalten, sind nach den Untersuchungen von Duclaux, Krüger, Riemann, Reissmann, O. Laxa, Orla Jensen u. a. *Bacillus fluorescens liquefaciens*, *Bacillus fluorescens non liquefaciens* und *Bacillus prodigiosus* die verbreitetsten.

Ausser den Bakterien sind es dann besonders *Oidium lactis*, *Cladosporium butyri*, sowie *Mucor*- und *Penicillium*-Arten, deren Tätigkeit hier in Betracht kommt. Neuerdings hat J. König im Verein mit A. Spickermann und W. Brenner anschliessend an die Arbeiten von Hebebrand, Welte und Scherpe, Reitmayer, von Rothausen und Baumann die Fettzersetzung und Fettzehrung durch Mikroorganismen in Futtermitteln beim Aufbewahren näher verfolgt. Die dabei beobachteten Spaltpilze gehören sämtlich zur Gruppe der Heu- und Kartoffelbazillen. Bei einem Wassergehalt unter 14% trat keine Fettzehrung ein, bei einem solchen zwischen 14% und 30% entfalteten die Mycelpilze eine rege Tätigkeit, während bei einem Wassergehalt von über 30% die Bakterien die Oberhand bei der Fettzerstörung gewannen. Die der Fettzehrung, wie es scheint, stets vorausgehende Spaltung in Glycerin und freie Fettsäuren wird durch Enzyme, die sogenannten Lipasen, ausgelöst.

Es erübrigt uns jetzt noch, der Tätigkeit der Bodenbakterien bei der Zersetzung der Knochen kurz zu gedenken. In dieser Beziehung hat Stoklasa einige Beobachtungen mit Knochenmehl angestellt. Er verwandte zu seinen Versuchen *Bacillus megatherium*, *fluorescens liquefaciens*, *proteus vulgaris*, *butyricus Huetpe*, *mycoides* und *mesentericus*. Er konstatierte einen bedeutenden Unterschied bei den einzelnen Arten betreffs ihrer Energie bei der Transformation des in den Knochen enthaltenen Stickstoffs in die Amidform und bei der Auflösung der Phosphorsäure. Am raschesten arbeitete *Bacillus megatherium*, den Stoklasa irrtümlicherweise für identisch mit dem *Alinitbazillus* hält; sodann *Bacillus mycoides*. Von deutlichem beschleunigendem Einfluss auf die knochenzersetzende Tätigkeit der hier in Betracht kommenden Bodenbakterien ist nach Stoklasa die Gegenwart von Kohlehydraten.

Bisher haben wir bei der Betrachtung der Bakterientätigkeit beim organischen Kreislauf nur die Elemente Stickstoff, Kohlenstoff, Sauerstoff und Wasserstoff berücksichtigt. Die Arbeit der Bodenbakterien erstreckt sich indes dank der staunenswerten Vielseitigkeit der Spaltpilze in ihren physiologischen Leistungen auch auf die für das organische Leben wichtigen Elemente des Schwefels und Eisens und wir können auch hier von einem Kreislauf dieser Elemente sprechen, der durch die sogenannten Schwefel-

resp. Eisenbakterien ausgelöst wird. Die hier in Betracht kommenden chemischen Verbindungen Schwefelwasserstoff und Ferrobicarbonat können natürlich sowohl tellurischen wie organischen Ursprungs sein. Die Schwefel- und Eisenbakterien leben zwar fast ausnahmslos in schwefel- resp. eisenhaltigen Wässern, doch können sie zum Teil, wie wir später noch sehen werden, unter bestimmten Umständen auch in gewissen Böden vorkommen.

Die Schwefelbakterien stellen eine aus den verschiedensten Arten zusammengesetzte physiologische Gruppe dar, die wir be-




Fig. 18.

Verschiedene Schwefelbakterien.

- A. *Spirillum sanguineum* (Ehrenb.) Cohn. Eine Purpurschwefelbakterie mit Schwefelkörnern. 1000fache Vergr. Nach Migula.
- B. *Pseudomonas Okenii* Cohn. Eine Purpurschwefelbakterie mit Schwefelkörnern. 660fache Vergr. Nach Warming.
- C. *Beggiatoa alba* (Vauch.) Trev. a. Lebender Faden mit Schwefelkörnern, b. Faden nach Behandlung mit Schwefelkohlenstoff. 300fache Vergr. Nach Migula.

reits bei der Einteilung der Spaltpilze kurz kennen gelernt haben (vergl. Fig. 18 A, B und C). Sie besitzen die auffallende Eigenschaft, des sonst sehr giftigen Schwefelwasserstoffs als unentbehrlichen Nährstoffs zu bedürfen. Dieser findet sich, abgesehen von natürlichen Schwefelwässern, überall da, wo Eiweisstoffe zersetzt werden. Die Schwefelbakterien verbrennen, vermutlich zur Energiegewinnung, den Schwefelwasserstoff zunächst zu Schwefel, der in Form von Körnern oder Tröpfchen in den Zellen aufgespeichert, sodann aber weiter zu Schwefelsäure oxydiert wird; diese wird ausgeschieden und durch anwesende Karbonate der alkalischen

Erden zu Sulfaten abgesättigt, die wiederum von den Pflanzen bei ihrer Ernährung verwendet werden.

Die zur Gruppe der Scheidenbakterien gehörenden, den Wassertechnikern genügsam bekannten Eisenbakterien oxydieren, wahrscheinlich ebenfalls zur Energieerzeugung, Ferrobikarbonat zu Ferrihydroxyd, das sich in den Scheiden ablagert. Das Ferrobikarbonat findet sich ausser in den sogenannten natürlichen Eisenwässern, besonders in sumpfigen und stehenden Gewässern, wo organische eisenhaltige Stoffe zersetzt werden.

Gleichfalls zu den Scheidenbakterien, deren Bau die Figuren 19 und 20 erläutern mögen, gehören einige Organismen, deren hier noch gedacht sei: der von Kullmann entdeckte und beschriebene Erreger des Erdgeruches *Streptothrix odorifera* und einige der sogenannten thermophilen Bakterien. P. Salzmann, welcher in letzter Zeit der *Streptothrix odorifera* eine physiologisch-chemische Studie gewidmet hat, beobachtete, dass dieser eigentümliche Geruch nur beim Vorhandensein bestimmter chemischer Verbindungen auftritt. Während die Salze der Oxalsäure, der Mono- und Monoxycarbonsäuren überhaupt nicht verwendet werden, benützt der Organismus zwar




Fig. 19.

Scheidenbakterien.

B. Festhaltende Fäden von *Streptothrix epiphytica* Migula.

F. Conclienbildender Faden von *Streptothrix fluitans* Migula.

500fache Vergr. Nach Migula.

die Dikarbonsäuren, welche neben den beiden Karboxylgruppen noch die CH_2 oder CH OH -Gruppe enthalten, wie die Bernsteinsäure, Apfelsäure, Weinsäure, Citronensäure, der charakteristische Geruch tritt jedoch nur bei den drei letzten Säuren auf.

Die sogenannten thermophilen Bakterien, von denen, wie soeben erwähnt, ein Teil gleichfalls zu den Scheidenbakterien gehört, finden sich sehr verbreitet in den oberflächlichen Bodenschichten. Sie besitzen die Eigentümlichkeit, noch bei Temperaturen von $50-70^\circ$ zu gedeihen; sie sind nicht pathogen, meist fakultativ anaërob und sporenbildend.

Nachdem wir die Bodenbakterien in ihren Leistungen im Boden selbst kennen gelernt haben, wollen wir zum Schluss noch die hygienische Bedeutung der Bodenbakterien streifen.

Bekanntlich schreibt man dem Boden vielfach eine bedeu-

tende Rolle für das Zustandekommen und die Verbreitung von Epidemien zu. Aber so vielfach diese Frage auch studiert worden ist und wie viele Theorien über die Beziehung des Bodens zu den Infektionskrankheiten aufgestellt worden sind, das überaus wichtige Problem harret noch einer befriedigenden Lösung.

Die bemerkenswerte Tatsache, dass manche Bakterien unter ungenügend bekannten Umständen, im Boden plötzlich in grosser Menge auftreten, um ebenso rasch wieder zu verschwinden, wurde bereits früher erwähnt. Für die pathogenen Bakterien scheint der Boden indes im allgemeinen mehr als Konservierungs- wie als Vermehrungsstätte in Betracht zu kommen. In grosser Verbreitung finden sich in gedüngter Erde die Erreger des malignen Ödems und des Tetanus, während andere pathogene Bakterien, denen man im Boden einmal ausnahmsweise begegnet, bei Versuchen nach kürzerer oder längerer Zeit im Boden schliesslich zu Grunde gingen. Eine Ausnahme machen hier, wie wir aus verschiedenen Tatsachen schliessen müssen, bis jetzt nur der Typhus —, Rauschbrand — und Milzbrandbazillus und wahrscheinlich auch der Choleravibrio. So hat man z. B. schon öfters die Wahrnehmung gemacht, dass unter Arbeitern, die mit Erdarbeiten in als verseucht zu betrachtenden Böden beschäftigt waren, Abdominaltyphus ausgebrochen ist. Ferner wissen wir von dem Milzbrandbazillus, dass er als fakultativer Parasit auch ausserhalb seines lebenden Wirtes unter gewissen Umständen auf saprophytische Weise von toten Stoffen sich ernähren und eventuell sogar vermehren kann. Sporen bildet er überhaupt nur bei der letzteren Lebensweise. So kommt es, dass bestimmte Weiden z. B. immer wieder Milzbrand erzeugen können, da die Tiere mit dem Futter die Milzbrandbazillen oder Milzbrandsporen in sich aufnehmen. Ähnlich liegen die Verhältnisse bei dem Rauschbrandbazillus. In letzter Zeit hat man




Fig. 20.

A. *Cladothrix dichotoma* Cohn.

Spitze eines gonidienbildenden Fadens (s),
g. die aufgelockerte Scheide, c. die Gonidien mit Geisseln.

1000fache Vergr. Nach Alfred Fischer.

B. *Crenothrix polyspora* Cohn.

Gonidienbildung.

300fache Vergr. Nach Migula.

beobachtet, dass auch niedere Tiere im Boden von Infektionskrankheiten betroffen werden. So beschreibt Cavara ein Bakterium, das die Larven der Saateule *Agrotis segetum* infiziert, bis zur Mumifikation durchwuchert und deformiert. Die getöteten Larven werden braun und brüchig.

Wenden wir uns jetzt noch zu den phytopathogenen Bakterien des Bodens. Die Existenz von pflanzeninfizierenden Bakterien ist vielfach bestritten worden. Wir kennen jetzt aber mit Sicherheit verschiedene bakterielle Pflanzenkrankheiten, die man als Bakteriosen bezeichnet, so z. B. die Nassfäule der Kartoffeln, der Rotz der Hyazinthen, die Bakteriosis der Kohlrabi, der weissen Rüben und der Möhren u. s. w. Auch die dem Boden anvertrauten Samen und Früchte können durch manche noch nicht genügend bekannte Bakterien und andere Mikroorganismen unter Umständen getötet werden, wie dies Hiltner für Leguminosensamen nachgewiesen hat.

Neuerdings hat man beobachtet, dass bei solchen Pflanzenkrankheiten gemeine, sonst nicht pathogene Arten sich beteiligen können. Es führt uns diese Tatsache zu der ganz allgemein überaus wichtigen Frage, welche gemeinen saprophytischen Bakterien vermögen eventuell parasitäre Eigenschaften anzunehmen und unter welchen Umständen tun sie dies? E. Laurent gibt an, dass *Bacterium coli commune* und *Bacillus fluorescens putidus* durch eine Reihe von Passagen auf Kartoffeln und Möhren diesen und andern Knollengewächsen gegenüber parasitäre Eigenschaften erlangen, die durch künstliche Verminderung der Acidität des Zellsaftes sichtlich gefördert werden. Dasselbe hat L. Lepoutre für *Bacillus fluorescens liquefaciens*, *B. mycoides* und *B. mesentericus* behauptet. Er bemerkt noch, dass die mineralische Ernährung eine deutliche Einwirkung auf die Widerstandsfähigkeit knolliger Gewächse gegenüber der Bakterieninfektion habe. So prädisponierte bei seinen Versuchen mit Steckrüben und Karotten ein Übermass von Stickstoff oder Kalkdüngung zur bakteriellen Fäulnis, während die Phosphate den Widerstand dieser Pflanzen gegenüber den virulenten Bakterien erhöhte.

Über das Verhalten des Heubazillus (*Bac. subtilis*) und des zur Gruppe der Kartoffelbakterien gehörenden *Bacillus vulgatus* als Pflanzenparasiten hat C. J. J. van Hall eine Studie veröffent-

licht. Darnach sollen diese Spaltpilze bei höherer Temperatur sehr toxische Eigenschaften für viele Pflanzen annehmen und als virulente Fäulnisserreger auftreten. Bei dem Heubazillus soll dies bei Temperaturen über 23°, bei der Kartoffelbakterie bei solchen über 30° der Fall sein.

Eine bekannte Erscheinung ist es auch, dass auf manchen Böden bei fortwährender oder zu oft wiederholter Kultur derselben Pflanzen diese nicht mehr gedeihen; wir sprechen z. B. von Leguminosenmüdigkeit, Rebenmüdigkeit, Zuckerrübenmüdigkeit des Bodens. Auch hierfür hat man vielfach die bakteriellen Verhältnisse der betreffenden Böden verantwortlich gemacht. Auch die sogenannten Wurzelfäuleböden, wie sie besonders in den Tropen bei den Zuckerrohrfeldern auftreten, sollen durch Bakterien bedingt sein. Kamerling hat einen solchen typischen Wurzelfäuleboden untersucht und in diesem Eisenbakterien, die in gesunden Böden nicht angetroffen werden, in grosser Verbreitung gefunden, während Schimmelpilze dabei sehr zurücktraten. Die Ursache der untersuchten Wurzelfäule sieht Kamerling in durch anaerobe Bakterien ausgelösten Reduktionsprozessen, die zur Bildung von Eisenoxydul und Schwefelwasserstoff führen.

Auch die Frage, ob für Menschen und Tiere pathogene Bakterien als Pflanzenparasiten auftreten können, ist von eminenter Wichtigkeit. Denn auf diesem Wege könnten sie dann leicht zu Infektionen Veranlassung geben. Die bisherigen diesbezüglichen Untersuchungen haben zu widersprechenden Resultaten geführt. Doch scheint es, dass die Gefahr in dieser Beziehung glücklicherweise nicht sehr gross ist.

Überblicken wir zum Schlusse nochmals unsere Ausführungen über die mannigfaltige teils nützliche, teils schädliche Tätigkeit der Bodenbakterien, so sehen wir, dass es wichtige und bedeutungsvolle Probleme sind, welche die Bodenbakteriologie schon gelöst hat und noch zu lösen hat. Aber bunt und verworren ist das Leben und Treiben der Mikroorganismen im Boden und wenn auch das Auge des Forschers manches in diesem wechselvollen Treiben geschaut und beobachtet hat, so gibt es doch noch so manche dunkle Ecke in dessen weitem Bereich, deren Aufhellung für Wissenschaft und Praxis von grossem Nutzen sein würde.

Aber gerade dieser Umstand ist es, der das Studium der Bodenbakteriologie trotz der grossen Schwierigkeiten zu einem besonders reizvollen und genussreichen macht. Gibt es doch keine höhere Befriedigung für die wissenschaftliche Forschung, als das erhabene Bewusstsein, Hand in Hand mit der Praxis für das Wohl der Menschheit tätig zu sein.

Jean Lamarck.

Von Walther May,

Privatdozent der Zoologie an der Technischen Hochschule.

Es ist eine interessante Erscheinung, dass in der zweiten Hälfte des achtzehnten und der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts in Deutschland, England und Frankreich drei Naturphilosophenschulen auftraten, die ganz unabhängig von einander im wesentlichen dieselben Gedanken über die Entstehung der organischen Wesen entwickelten. In Deutschland waren Oken, Treviranus und Goethe, in England Erasmus Darwin, in Frankreich Lamarck und Geoffroy Saint Hilaire die Häupter dieser Schulen. Als der bedeutendste von ihnen gilt gewöhnlich Jean Lamarck, ja er wird vielfach als der erste wissenschaftliche Begründer der Deszendenztheorie und als der Vater der Lehre von der Entstehung der Arten durch Vererbung funktioneller Abänderungen gefeiert. Dies ist insofern nicht ganz richtig, als Erasmus Darwin, der Grossvater des grossen Reformators der Biologie, schon mehrere Jahre früher diese Lehre begründet hat. Jedenfalls nimmt Lamarck aber eine hervorragende Stellung in der Geschichte der Deszendenztheorie ein, und sein Leben und Streben im Dienste denkender Naturforschung ist von hohem Interesse.

Jean Lamarck wurde im Jahre 1744 in einem kleinen Orte der Pikardie als elftes Kind eines angesehenen, aber wenig begüterten Edelmannes geboren. Sein Vater schickte ihn auf die Jesuitenschule, deren geistigem Zwang er sich durch die Flucht entzog. Er wurde Soldat, zeichnete sich aus, avancierte zum Offizier, musste aber dann wegen einer Halswunde den Abschied nehmen. Er warf sich jetzt auf das Studium der Botanik, veröffentlichte eine ausgezeichnete Flore française und wurde infolgedessen Mitglied der Pariser Akademie und Professor am Jardin des Plantes. Als solcher hatte er über die Naturgeschichte der wirbellosen Tiere zu lesen. Er arbeitete sich gründlich in das neue Fach ein und legte die Resultate seiner Studien in einem

grossen Werk über die wirbellosen Tiere nieder. In späteren Jahren geriet er mit seiner zahlreichen Familie in grosse Not und starb im Jahre 1829 in äusserst dürftigen Verhältnissen, nachdem er viele Jahre vorher gänzlich erblindet war.

Lamarck verdankte seinen Ruf als Naturforscher zunächst nicht seinen naturphilosophischen, sondern den eben erwähnten systematischen Schriften. Die naturphilosophischen Arbeiten waren eher dazu angetan seinen wissenschaftlichen Ruf zu beeinträchtigen. Erst nach Darwins glänzender Neubegründung der Deszendenzlehre ist Lamarcks naturphilosophisches Hauptwerk, die im Jahre 1809 erschienene Philosophie zoologique, wieder ans Licht gezogen worden und hat auch eine deutsche Übersetzung durch Arnold Lang, den verdienten vergleichenden Anatomen, erfahren.

Lamarck war wie Erasmus und Charles Darwin eine universale Natur: Philosoph, Geolog, Botaniker und Zoolog in einer Person. Seine philosophischen Ansichten hat er in der 1830 erschienenen Schrift: „Système analytique des connaissances positives de l'homme“ niedergelegt. Darin fragt er zunächst, auf welchem Wege wir zu sichern Erkenntnissen gelangen und beantwortet diese Frage dahin, dass alle sichern Erkenntnisse aus der Beobachtung entspringen. Damit meint er nicht nur die direkte Beobachtung, sondern auch das Ziehen richtiger Konsequenzen aus ihr. Die direkten Beobachtungen sind vollständig sicher und exakt, die daraus gezogenen Konsequenzen nähern sich der Wahrheit mehr oder weniger.

Weiter fragt Lamarck, was der Beobachtung zugänglich, was beobachtbar ist. Beobachtbar sind die Stoffe und Körper, die Bewegungen, Veränderungen und Eigenschaften dieser Stoffe und Körper und die Gesetze, nach denen diese Bewegungen und Veränderungen vor sich gehen.

Alle Körper sind in steter Veränderung und Bewegung begriffen, nirgends herrscht absolute Ruhe. Daraus folgt, dass eine allgemeine Macht existiert, die die Ursache aller Veränderungen und Bewegungen ist: die Natur.

Die Natur ist etwas Immaterielles. „Die Materie ist dem, was wir unter Natur verstehen, vollständig fremd!“ Die Natur wirkt blind, notwendig, mechanisch, ohne Absichten und Zweck. Sie ist weder selbstbewusst, noch vernünftig, keine Intelligenz,

abhängig und beschränkt. Ihr einziger Wirkungsbezirk ist die Materie. Sie verändert die Materie beständig und bringt so alle Körper und Erscheinungen hervor. Die Summe aller dieser Körper ist das Universum. Das Universum ist also das notwendige, mechanische und natürliche Produkt der Natur und der Materie.

Die Materie ist durchaus passiv, träge, ohne eigene Bewegung und Tätigkeit, sie hat nur Eigenschaften, keine Fähigkeiten. Nur durch die Natur kann sie in Bewegung versetzt werden. Wir haben hier einen vollendeten Dualismus von Natur und Materie, der aber mit Mechanismus verbunden ist.

Alle Erscheinungen werden durch mechanische, natürliche Ursachen hervorgebracht und sind durchaus gesetzlich und notwendig. Das Zustandekommen der Natur und der Materie selbst können wir uns aber nicht mehr aus natürlichen mechanischen Ursachen erklären. Für ihre Entstehung nimmt Lamarck eine ausser- und übernatürliche Ursache, einen Gott an. Er ist also Dualist und Deist, zugleich aber Mechanist.

Als Mechanist wendet er sich gegen die teleologische Erklärung der organischen Erscheinungen:

„Hauptsächlich bei den Organismen“, sagt er, „und ganz speziell bei den Tieren glaubte man in den Verrichtungen der Natur einen Zweck zu erblicken. Ein solcher Zweck ist indes hier, wie anderswo, bloss Schein, nicht Wirklichkeit. Die Wirklichkeit hat bei jeder besonderen Organisation unter diesen Naturkörpern eine durch natürliche Ursachen und stufenweise zu stande gekommene Ordnung der Dinge, durch eine fortschreitende, von den Umständen bedingte Entwicklung von Teilen das herbeigeführt, was nur Zweck erscheint und was in Wirklichkeit reine Notwendigkeit ist. Das Klima, die Lage, die Medien, in denen die Organismen leben, die Mittel zum Leben und zur Selbsterhaltung, kurz, die spezifischen Verhältnisse, in denen jede Art lebte, haben die Gewohnheiten dieser Art herbeigeführt, diese haben die Organe der Individuen umgemodelt und angepasst. Die Folge davon ist, dass die Harmonie, die zwischen der Organisation und den Gewohnheiten der Tiere existiert, uns als vorbedachtes Resultat erscheint, während sie bloss ein notwendig herbeigeführtes Resultat ist.“

An die Erörterung der philosophischen Ansichten Lamarcks schliessen wir die seiner geologischen. In seiner 1801 erschienenen

Hydrogeologie wirft er vier Hauptfragen auf. Die erste bezieht sich auf die natürlichen Folgen des Einflusses und der Bewegungen des Wassers auf der Erdoberfläche. Lamarck glaubt, dass durch die Bewegungen des süßen Wassers die ausserordentliche Mannigfaltigkeit in der Bodengestalt der Kontinente entstand: Berge, Thäler, Hochebenen etc.

Die zweite Frage lautet: Warum hat das Meer beständig ein Becken und bestimmte Grenzen, die es von den immer über es hervorragenden trockenen Teilen der Erdoberfläche trennen? Darauf antwortet Lamarck, dass die Bewegungen des Meeres, Wellen, Meeresströmungen u. a. eine beständige Aushöhlung des Meeresbeckens bewirken und so dessen Verflachung durch die fortwährend von den Flüssen zugeführten festen Bestandteile verhindern. Diese werden an den Küsten durch das Meer wieder ausgeworfen.

Trotz der Aushöhlung durch die Meeresbewegungen würden sich aber die Meeresbecken mit der Zeit anfüllen, wenn sich die Lage der Meere nicht veränderte. Dies ist Gegenstand der dritten Frage.

Die Meere müssen zunächst aus allgemeinen physikalischen Gründen ihre Lage verändern. Das Wasser der Meere dreht sich von Westen nach Osten um die Erdachse. Da das Wasser wegen der leichten Verschiebbarkeit seiner Teile der Anziehungskraft des Mondes eher gehorchen kann als die trockenen und festen Teile der Erdrinde, so muss es etwas langsamer rotieren als diese. Daraus ergibt sich mit bezug auf das Festland eine langsame Bewegung des Meeres nach Westen. Die Wassermassen des Meeres prallen infolgedessen beständig gegen die östlichen Küsten der Kontinente und überfluten sie immer mehr, während die westlichen Küsten vom Meere verlassen werden.

Es lassen sich aber auch tatsächliche Gründe dafür anführen, dass Teile des jetzigen Festlands wirklich früher vom Meere bedeckt waren. Solche Gründe bieten die fossilen Tiere und Pflanzen, vor allem die Muscheln auf dem Festland und auf hohen Bergen. Lamarck bestreitet entschieden, dass sie durch grosse Katastrophen dahin gelangt seien. Sie haben vielmehr an denselben Orten gelebt, an denen wir sie jetzt finden. Denn die Tatsache, dass bei den Muscheln gewöhnlich noch beide Schalen vorhanden sind, verträgt sich nicht mit der Annahme allgemeiner Katastrophen.

Da man nun überall auf dem Festland Meeresfossilien antrifft, so muss das Meer in seiner Bewegung von Osten nach Westen wenigstens einmal um die ganze Erde herumgewandert sein.

Lamarcks vierte und letzte geologische Frage bezieht sich auf den Einfluss der Organismen auf die Stoffe der Erdkruste und die allgemeinen Resultate dieses Einflusses. Er schliesst aus den Korallenriffen, Muschelbänken und Steinkohlenlagern, dass aller Kalk auf der Erdoberfläche durch tierische, alle Kohle durch pflanzliche Tätigkeit entstanden sei. Ja, er geht noch weiter und meint, dass überhaupt sämtliche Mineralien und Felsarten, mit Ausnahme des Quarzes, als direkte oder indirekte Produkte organischer Tätigkeit zu betrachten seien.

Wir sehen aus diesen geologischen Ansichten Lamarcks, dass er zur Erklärung aller geologischen Erscheinungen nur die heute noch wirksamen Kräfte annimmt und die Katastrophenlehre ablehnt, also das Lyellsche Prinzip des Aktualismus antizipiert. Daher konnte er auch die Entstehung der Organismen unter diesem Gesichtspunkt betrachten.

In bezug auf die Erforschung der organischen Natur betont Lamarck wiederholt, dass der Naturforscher nicht nur darauf ausgehen solle, neue Arten zu entdecken, genau zu beschreiben, abzubilden und in ein System zu bringen, sondern dass er bestrebt sein solle, die innere Organisation zu erkennen und die Beziehungen der Organismen zu einander und zu andern Naturkörpern.

„Man weiss“, sagt er, „dass jede Wissenschaft ihre Philosophie haben muss. Nur dann macht sie wahre Fortschritte. Vergebens werden sonst die Naturforscher ihre ganze Zeit darauf verwenden, neue Arten zu beschreiben, alle Nüancierungen und die geringsten Eigentümlichkeiten ihrer Abänderungen aufzufinden, um die ungeheure Liste der verzeichneten Arten zu vermehren.“

In diesem Sinne untersucht Lamarck vor allem das Verhältnis der organischen zur anorganischen Natur. Linné hatte Mineralien, Pflanzen und Tiere als drei gleichwertige Naturreiche gegenübergestellt: *Lapides crescunt, plantae vivunt et crescunt, animalia vivunt et crescunt et sentiunt*. Diese Einteilung wird von Lamarck bestritten. Er unterscheidet nur zwei Hauptreiche: anorganische Körper und Organismen. Erst die letzteren zerfallen wieder in zwei grosse Abteilungen: Tiere und Pflanzen.

Lamarck bestreitet ferner die Ansicht, dass sich alle Natur-

körper in eine einzige ungeteilte Reihe bringen lassen: Mineralien — einfachste Pflanzen bis vollkommenste Pflanzen — einfachste Tiere bis vollkommenste Tiere. Er leugnet das Vorhandensein von Übergängen zwischen Pflanzen und Mineralien. Die Welt der Organismen ist durch eine grosse Kluft von der Welt der Anorgane getrennt. Doch behauptet er nicht eine absolute Verschiedenheit beider Reiche. Der Unterschied ist zwar sehr gross, aber nur relativ. Es gibt keinen besondern Lebensstoff und keine besondere Lebenskraft. Das Leben ist eine ganz natürliche, den allgemeinen Naturgesetzen unterworfenene Erscheinung.

„Die Natur kompliziert ihre Mittel niemals, wenn es nicht nötig ist; wenn sie alle Erscheinungen der Organisation mit Hilfe der Gesetze und Kräfte, denen alle Körper allgemein unterworfen sind, hat hervorbringen können, so hat sie dies ohne Zweifel getan und hat nicht, um einen Teil ihrer Erzeugnisse zu regieren, Gesetze und Kräfte geschaffen, die denen, die sie anwendet, um den andern Teil zu regieren, entgegengesetzt sind.“

Um über das Wesen des Lebens ins klare zu kommen, müssen wir die einfachsten Organismen untersuchen.

„Man kann in der Tat erst nach der Untersuchung der einfachsten Organisation wissen, was wirklich für die Existenz des Lebens in einem Körper wesentlich ist; denn bei einer komplizierten Organisation ist jedes hauptsächliche innere Organ für die Erhaltung des Lebens notwendig, wegen seiner innigen Verknüpfung mit allen andern Teilen des Organsystems und weil dieses System nach einem Plan gebildet ist, der diese Organe erfordert. Daraus folgt aber nicht, dass diese Organe für die Existenz des Lebens in jedem Organismus notwendig sind.“

Auf Grund dieser Untersuchung der einfachsten Lebewesen kommt Lamarck zu dem Resultat, dass das Leben eine Summe bestimmter, sehr komplizierter Bewegungen der Bestandteile eines Organismus ist, die auf die physikalische und komplizierte chemische Beschaffenheit des materiellen Substrats der Organismen zurückzuführen sind.

Mit dieser Auffassung steht seine Lehre von der Urzeugung im Einklang. Er hält diese für eine erwiesene Tatsache, da es rein unmöglich sei, dass so zarte Organismen wie die Infusorien Sporen erzeugen können, die den Winter überdauern. Er verwirft aber die Entstehung hochorganisierter Tiere und Pflanzen

durch Urzeugung und hält nur die Bildung der allereinfachsten Wesen aus anorganischer Materie für möglich.

Wie zwischen Organismen und Anorganen so stellt Lamarck auch einen Vergleich zwischen Pflanzen und Tieren an. Er protestiert gegen die Ansicht, dass sich die Tiere von den Pflanzen durch Empfindung und willkürliche Bewegung absolut unterscheiden. Doch glaubt er, dass zwischen beiden Reichen ein durchgreifender Unterschied besteht und bestreitet, dass das Pflanzenreich irgendwo in das Tierreich übergeht. Denn die Zoophyten oder Pflanzentiere sind durchaus echte Tiere, die mit den Pflanzen nichts gemein haben als die Stockbildung. Wenn die Pflanzen mit den Tieren zusammenhängen, so könnte dies nur bei denen der Fall sein, deren Organisation am einfachsten ist. Wenn hier ein Übergang vorhanden wäre, so müssten Pflanzen und Tiere zwei am Grunde wie die beiden Striche eines V verbundene Zweige darstellen. Lamarck glaubt jedoch, dass auch hier kein Zusammenhang existiert, sondern dass jeder Zweig vom andern am Grunde getrennt ist. Durch Urzeugung entstehen sowohl einfachste Tiere als einfachste Pflanzen. Aus den einfachsten Tieren entsteht das Tierreich, aus den einfachsten Pflanzen das Pflanzenreich. Damit gelangen wir zur Erörterung der Lamarckschen Deszendenztheorie.

Die ersten Keime dieser Theorie finden wir bereits 1801 in der Hydrogeologie, die erste ausführliche Darstellung 1802 in den „Recherches sur l'organisation des corps vivans“. 1809 folgt die Hauptdarstellung in der „Philosophie zoologique“, 1815 eine Wiederholung in anderer Form, aber dem Inhalt nach unverändert in der Einleitung zur „Histoire naturelle des animaux sans vertèbres“.

Lamarck geht in seiner Deszendenzlehre von dem Gedanken aus, dass der Naturforscher innerhalb der Naturwissenschaft das, was der Kunst angehört, zu unterscheiden habe von dem, was der Natur eigen ist. Gattungen, Familien, Ordnungen und Klassen sind künstliche, allerdings unentbehrliche Hilfsmittel des Menschen. Die Grenzen dieser Gruppen sind willkürlich und ergeben sich aus unserer mangelhaften Kenntnis der Lebensformen, die auf der Erde existiert haben und noch existieren. Würde man all diese Formen kennen, so würde man überall Übergangsformen finden.

„Die Natur“, sagt Lamarck, „hat in Wirklichkeit in ihren Erzeugnissen weder konstante Klassen, Ordnungen, Familien und

Gattungen, noch auch konstante Arten gebildet, sondern nur Einzelwesen, die aufeinander nachfolgen und die denen gleichen, die sie hervorgebracht haben.“

Wenn man sämtliche Organismen nach ihren natürlichen Beziehungen aneinander reiht, so finden wir, dass sich in beiden Reichen zwischen den niedrigst und höchst organisierten Formen stufenweise Übergänge vorfinden, eine stetig zunehmende Komplikation der Organisation. Diese besteht aber nur in bezug auf die Hauptgruppen, diese allein bilden eine einfache linienförmige Stufenleiter, die Arten, Gattungen und Familien sind dagegen seitliche Abzweigungen dieser Hauptlinie.

Als Kriterium der Vollkommenheit eines Organismus betrachtet Lamarck die Organisation des Menschen. Der Mensch ist das vollkommenste Tier weil er die komplizierteste Organisation und die meisten Fähigkeiten hat. Je mehr daher ein Organismus mit dem menschlichen übereinstimmt, desto vollkommener ist er und umgekehrt. Da z. B. das Skelett als Hauptbestandteil zum Organisationsplan des menschlichen Körpers gehört, so besitzen alle mit einem Skelett ausgestatteten Tiere eine ausgebildeter, vollkommener Organisation als die, denen es fehlt. Deshalb sind die wirbellosen Tiere unvollkommener als die Wirbeltiere.

Wenn man immer weiter in der Tierreihe zurückgeht, so wird ein Organsystem nach dem andern immer einfacher und verschwindet schliesslich ganz, endlich auch das letzte und allgemeinste Organ: der Nahrungskanal. Der Körper des einfachsten Tieres ist ein Organismus ohne Organe.

Die Betrachtung der allgemeinen Abstufung der Organisation von den unvollkommensten bis zu den vollkommensten Tieren und Pflanzen führt Lamarck auf den Gedanken, dass die Tiere unter sich und die Pflanzen unter sich in genetischem Zusammenhang stehen. So sagt er im Vorwort zur „Philosophie zoologique“: „Wie hätte ich auch die eigentümliche Abstufung, die sich in der Organisation der Tiere von den vollkommensten bis zu den unvollkommensten zeigt, betrachten können, ohne nach der Ursache einer so positiven, so wichtigen und durch so viele Beweise verbürgten Tatsache zu fragen? Musste ich nicht annehmen, dass die Natur die verschiedenen Organismen nacheinander in der Weise hervorgebracht habe, dass sie vom Einfachen zum Komplizierten überging, da sich ja doch die Organisation in der tierischen

Stufenleiter von den unvollkommensten Tieren an stufenweise auf höchst bemerkenswerte Weise kompliziert?“

Wenn diese Ansicht richtig ist, so müssen die Tier- und Pflanzenarten veränderlich sein. Lamarck untersucht daher zunächst den Artbegriff und bemüht sich die Veränderlichkeit der Art zu beweisen. Die Arten müssen veränderlich sein, weil die Existenzbedingungen sich ändern. Wollte man die Konstanz der Arten dartun, so müsste man beweisen, dass die Existenzbedingungen seit Beginn des organischen Lebens dieselben geblieben sind. Ferner müsste man annehmen, dass die Individuen einer Art niemals mit den Individuen einer andern Art in geschlechtliche Verbindung treten können. Die Beobachtung zeigt aber das Gegenteil. Selbst Linné hat die Wichtigkeit dieses Einwurfs später erkannt.

Für die Veränderlichkeit der Art spricht ferner die Schwierigkeit, nahe verwandte Arten zu unterscheiden. Viele Arten grosser Gattungen gehen so ineinander über, dass man die Grenzen nur mit grosser Willkür bestimmen kann. Je weiter die Kenntnis der Tier- und Pflanzenwelt fortschreitet, desto grösser wird die Zahl der Übergangsformen.

Auch die Unmöglichkeit, Rassen, Varietäten und Arten scharf zu trennen, kommt hier in Betracht. Gewisse Individuenkomplexe werden häufig von dem einen Forscher als Arten, von dem andern als Varietäten bezeichnet.

Endlich verweist Lamarck auf die Veränderungen, die durch Domestikation hervorgerufen werden. Die Hunderassen sind seiner Ansicht nach durch Domestikation aus einer einzigen wilden wolfsähnlichen Art hervorgegangen, und mit Rücksicht darauf fragt er: „Wo findet man in der Natur die verschiedenen Rassen von Hunden, die wir durch die Domestikation hervorgebracht haben, die Doggen, Windhunde, Pudeln, Wachtelhunde, Bologneserhündchen u. s. w., Rassen, die untereinander grössere Verschiedenheiten darbieten als die sind, die man bei den Tieren einer Gattung, die frei in der Natur leben, für spezifisch hält?“

Wenn nun die Arten veränderlich sind, so ist es auch durchaus berechtigt, anzunehmen, dass sämtliche heute lebenden Tier- und Pflanzenarten durch Umwandlung aus andern Arten, die früher gelebt haben, hervorgegangen sind.

Von diesem Standpunkt aus weist Lamarck die Unnatürlich-

keit und Unrichtigkeit der Methode nach, die die vollkommensten Tiere an den Anfang, die unvollkommensten an das Ende des Systems stellt. „Die natürliche Ordnung der Tiere“, sagt er, „ist die, in der diese Organismen ursprünglich gebildet worden sind.“

Lamarck betrachtet die Tiere daher in folgender Reihenfolge: 1. Unterste Tiere: mit Verdauungsorganen, ohne Nerven und Gefässe; 2. niedere Würmer und Strahltiere: ohne Längsnervensmark und Zirkulationssystem; 3. höhere Wirbellose: mit Gehirn, Längsnervenstrang, Arterien und Venen; 4. Wirbeltiere.

Auch über die Ursachen der Artveränderungen dachte Lamarck nach. Er stellte zwei Prinzipien auf, um die Entwicklung der Spezies zu erklären. Das Hauptprinzip ist die Wirksamkeit organischer Bildungsgesetze. Jedes lebende Wesen hat eine innere Kraft, die es notwendig zur Fortentwicklung treibt. Dadurch wird die Stufenreihe der Hauptklassen verursacht. Wäre dieses Prinzip das einzige, so wäre die Fortentwicklung durchaus regelmässig. Es gibt aber noch ein zweites Prinzip, das Störungen dieser regelmässigen Reihe bedingt: der Gebrauch und Nichtgebrauch der Organe.

In dem Masse als sich die Tiere auf der Erdoberfläche ausbreiteten, gelangten sie in neue Verhältnisse, wurden ihre Existenzbedingungen andere. Dadurch änderten sich auch die Bedürfnisse. Um die neuen Bedürfnisse zu befriedigen, musste das Tier andere Tätigkeiten ausführen, andere Gewohnheiten annehmen. Infolgedessen wurden Organe, die früher mehr gebraucht wurden, weniger gebraucht und umgekehrt. Der häufige und dauernde Gebrauch eines Organs entwickelte und vergrösserte es, der konstante Nichtgebrauch liess es schwächer werden. Alles, was die Tiere durch Gebrauch oder Nichtgebrauch erwarben oder verloren, wurde auf die Nachkommen vererbt.

Auf diese Weise ist z. B. der lange Hals der Giraffe entstanden. „Es ist bekannt“, sagt Lamarck, „dass dieses von Gestalt höchste aller Säugetiere in Innerafrika wohnt und in Gegenden lebt, wo der beinahe immer trockene und kräuterlose Boden es zwingt, das Laub der Bäume abzufressen und sich beständig anzustrengen, es immer höher hinauf zu erreichen. Aus dieser seit langer Zeit angenommenen Gewohnheit hat sich ergeben, dass bei den Individuen ihrer Rasse die Vorderbeine länger als

die Hinterbeine geworden sind und dass ihr Hals sich dermassen verlängert hat, dass die Giraffe, ohne sich auf ihren Hinterbeinen aufrecht zu erheben, mit aufgerichtetem Kopfe eine Höhe von sechs Metern erreicht.“

Nach demselben Prinzip erklärt Lamarck die Schwimmhäute an den Füßen der Schwimmvögel, die langen Läufe der Watvögel, die lange Zunge der Spechte, die Flügel der Fledermäuse und ähnliche Charaktere.

Auf Nichtgebrauch sind dagegen die sog. rudimentären Organe zurückzuführen: die verkümmerten Augen der Blindmaus und des Olms, die zahnlosen Kiefer der Wale, der Mangel der Extremitäten bei den Schlangen, die verkümmerten Flügel bei gewissen Insekten.

Für die Pflanzen gelten nicht ganz dieselben Prinzipien, hier wird die Umwandlung hauptsächlich durch die direkte Einwirkung der Agentien der Aussenwelt, Nahrung, Klima etc. bedingt.

Auch den Menschen hat Lamarck zum Gegenstand seiner Betrachtungen gemacht. Der Mensch ist mit Rücksicht auf die Organisation unstreitig ein Tier, und zwar ein Wirbeltier. Unter den Wirbeltieren gehört er zu den Säugetieren, unter diesen steht er den Affen am nächsten. In bezug auf die Affen schrieb Lamarck schon 1802: „Anstatt alle auf demselben Niveau der Vollkommenheit zu stehen, zeigen sie untereinander ebensogrosse und sogar noch grössere Verschiedenheiten als die sind, die zwischen den vollkommensten von ihnen und dem Menschen existieren“.

Er hat aber doch nicht ganz den Mut, die Abstammung des Menschen vom Affen offen und ohne Rückhalt zu behaupten, sondern schlägt einen indirekten Weg ein, um seine Ansichten zu verraten. Er zeigt, welche Modifikationen eine der höchst entwickelten Affenarten erleiden muss, wenn sie zu gewissen neuen Gewohnheiten gezwungen wird. Durch Aufgeben des Baumlebens und Kletterns erfolgt Angewöhnung an den aufrechten Gang, dadurch Veränderung der Gliedmassen, die Hinterfüsse verlieren die Entgegenstellbarkeit der grossen Zehe, die Unterschenkel erhalten Waden, die Hände erlangen immer grössere Kunstfertigkeit und werden zur Konstruktion von Waffen geschickt. Infolge des Gebrauchs künstlicher Waffen wird das Gebiss nicht mehr als Waffe benutzt, die Kiefer werden kleiner und treten zurück, die Zähne bekommen senkrechte Stellung. Mit Hülfe der Waffen erlangt

der Affe die Oberherrschaft über alle anderen Tiere und breitet sich über die ganze Erde aus. Zur Aufrechterhaltung seiner Herrschaft vereinigt er sich zu grösseren Gesellschaften, die Beziehungen der Individuen werden verwickelter, die Sprache entsteht, und das Gehirn bildet sich immer vollkommener aus.

„Dies“, meint Lamarck, „würden die Reflexionen sein, die man anstellen könnte, wenn der hier als die fragliche Rasse betrachtete Mensch sich von den Tieren nur durch seine Organisationscharaktere unterscheiden würde und wenn sein Ursprung nicht von dem ihrigen verschieden wäre.“

Irgend welche Anklänge an Darwins Selektionstheorie finden wir bei Lamarck nicht. Doch würdigt er die Bedeutung des Kampfes ums Dasein in folgenden Sätzen:

„Die Tiere fressen einander auf, ausgenommen die, die von Pflanzen leben. Man weiss, dass die stärkeren und besser bewaffneten die schwächeren auffressen und dass die grossen Arten die kleineren verschlingen. Die Vermehrung der kleinen Tierarten ist so bedeutend, dass diese kleinen Arten den anderen den Platz auf dem Erdboden versperren würden, wenn die Natur nicht ihrer verschwenderischen Vermehrung eine Grenze gesetzt hätte. Weil sie aber einer Menge anderer Tiere zur Beute dienen, weil ihre Lebensdauer sehr beschränkt ist und das Sinken der Temperatur sie zu Grunde richtet, so hält sich ihre Menge immer in den richtigen Grössenverhältnissen für die Erhaltung ihrer und für die der andern Arten. Was die grössern und stärkern Tiere anlangt, so würden sie notwendig vorherrschend werden und der Erhaltung vieler andern Arten schaden, wenn ihre Vermehrung zu grosse Dimensionen erlangen könnte. Aber ihre Arten verschlingen sich gegenseitig, sie vermehren sich nur langsam, was auch in dieser Beziehung das nötige Gleichgewicht aufrecht erhält.“

Fragen wir nun zum Schluss nach dem Einfluss der Lamarckschen Lehren auf Darwin, so ist dieser ein rein negativer zu nennen. In Briefen an Lyell und Hooker stellt Darwin Lamarcks Philosophie zoologique als ein wertloses Buch hin, das ihm nicht den geringsten Nutzen brachte. Er sucht Lyell zu überzeugen, dass die Entstehung der Arten nicht als blosser Modifikation der Lamarckschen Lehre aufzufassen sei.

„Ich glaube“, schreibt er an den grossen Geologen, „diese Art den Fall darzustellen, ist für die Annahme der Ansicht sehr

schädlich, da sie meine Ansicht in enge Verbindung mit einem Buche bringt, das ich nach zweimaligem überlegten Lesen für ein erbärmliches Buch halte und aus dem ich nichts gewonnen habe.“ Und an Hooker berichtet er: „Lamarck ist die einzige Ausnahme, deren ich mich erinnern kann, eines sorgfältigen Beschreibers von Spezies, der nicht an beständige Spezies geglaubt hat; er hat aber mit seinem widersinnigen, wenn schon geschickten Buche dem Gegenstand geschadet“.

Wenn Darwin sich so ausspricht, so dürfen wir es Lamarcks Zeitgenossen nicht allzusehr verübeln, wenn sie seine Tat nicht zu würdigen wussten und wenn Cuvier in seiner Gedenkrede in bezug auf Lamarcks Lehre schreiben konnte: „Ein System, das sich auf solche Grundlagen stützt, kann wohl die Einbildungskraft eines Dichters amüsieren, ein Metaphysiker kann daraus eine ganze Reihe neuer Systeme ableiten, aber es kann auch nicht einen Augenblick die Prüfung jemandes aushalten, der eine Hand, ein Eingeweide, ja nur eine Feder zergliedert hat“.

Darwin und Cuvier, die beiden grössten Biologen des neunzehnten Jahrhunderts, begegnen sich hier in ihrem Urteil über Lamarcks Werk, obwohl sie von entgegengesetzten Gesichtspunkten ausgingen, sie vermissten beide bei Lamarck das, worauf sie ihre Ideen aufbauten: Tatsachen!

